





سجل الرسائل العلمية التي منحتها جامعة اسيوط



رسائل الماجستير ٢٠٠٢م





مُتَكَمِّمَات

من منطلق حرص جامعة أسيوط على ما تقدمه للباحثين والمهتمين بالبحث العلمى فإنها تولى جل إهتمامها استمرار صدور سجل الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه. ويسعد الجامعة أن تقدم العدد السادس عن عام ٢٠٠٢م لسجلى الماجستير والدكتوراه اللذان يتضمنان البيانات الأساسية للباحثين والمشرفين على الرسائل وملخص باللغة العربية والإنجليزية للرسائل المجازة في مختلف التخصصات التى تضمها أقسام الجامعة.

ويأتى إعداد هذا العدد ليؤكد حرص الجامعة والتزامها بالاستخدام الأمثل لمعطيات البحث العلمى وذلك بنشر المعلومات والأبحاث التى تضمنتها الرسائل العلمية في شتى التخصصات.

ولعل من بين ما يقف عليه القارئ للعدد السادس تنوع موضوعات البحث وراثها وارتباطها بقضايا تطوير التخصصات العلمية المختلفة فضلا عن تنامى دور المرأة في المشاركة في مجالات البحث العلمى بكليات الجامعة ، حيث بلغت نسبة تمثيلها على مستوى رسائل الماجستير ٣٤,٨% ممثلة فى ٨٤ رسالة من بين ٢٤١ رسالة ماجستير ، كما بلغ نسبة تمثيلها في رسائل الدكتوراه ٣٣% ممثلة في ٣٤ رسالة من بين ١٠٣ رسالة دكتوراه.

وانتهز هذه الفرصة لأتقدم بإسمى وبإسم جامعة أسيوط بشكر وتقدير
بالغين للقيادة السياسية لدعمها المتواصل للجامعات ومراكز البحوث بها ،
ونعاهدها دوماً أن تظل جامعة أسيوط منارة للعلم والتطوير لخدمة قضايا
التنمية المستدامة تحت قيادة راعي نهضتنا الرئيس محمد حسنى مبارك
سدد الله على طريق الحق خطاه.

رئيس الجامعة

أ.د./ محمد رأفت محمود

تهنئة

يسعدني أن أقدم بأسمى وبأسمى جامعة أسيوط للسادة الباحثين سجل الرسائل العلمية حيث أنه يعتبر من الإصدارات الهامة التي تصدرها الجامعة وذلك استكمالاً لإصداراتها في الأعوام السابقة .

وأننا نأمل أن يكون هذا الإصدار عوناً للباحثين المصريين ونظراءهم في الدول العربية الشقيقة وإن وجدوا فيه قيمة علمية مضافة .
إسهاماً في حركة التقدم العلمي التي يعيشها وطننا في هذه الفترة المزدهرة لتحقيق مستقبل أفضل.

نائب رئيس الجامعة

لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ. د. / مجدى عباس العقاد

المحتويات

٢	البيــــــــــــان		الماجستير
	الكليــــــــة	الأقســــــــام	
	من	إلى	
١	العلوم	الرياضيات	٢٩
٢		الفيزياء	٣٧
٣		الكيمياء	٤٥
٤		الجيوولوجيا	٤٩
٥		علم الحشرات	٦١
٦		علم النباتات	٦٩
٧	الهندسة	الهندسة المدنية	٨٩
٨		الهندسة الميكانيكية	١١٠
٩		الهندسة الكهربائية	١٣٥
١٠		الهندسة المعمارية	١٤٠
١١	الزراعة	أراضي ومياه	١٤٨
١٢		أمراض نباتات	١٥٢
١٣		الاقتصاد الزراعي	١٥٦
١٤		الألبان	١٦٠
١٥		الإنتاج لحيواني	١٦٣
١٦		إنتاج دواجن	١٧٦
١٧		بساتين { خضر }	١٨٠
١٨		بساتين { فاكهة }	١٨٣
١٩		المجتمع الريفي والإرشاد الزراعي	١٩٢
٢٠		المحاصيل	٢٠٠
٢١		الوراثية	٢٠٥

٢	البريد		الماجستير
	الكتاب	الأقسام	
		من	إلى
٢٢	الطب	٢١٧	٢٣٩
٢٣		٢٤٢	٢٤٩
٢٤		٢٥٢	٢٥٩
٢٥		٢٦٢	٢٧٢
٢٦		٢٧٥	٢٧٨
٢٧		٢٨١	٢٨٣
٢٨		٢٨٦	٢٩٤
٢٩		٢٩٧	٣٠٩
٣٠		٣١٢	٣٢٧
٣١		٣٣٠	٣٣٣
٣٢		٣٣٦	٣٤٠
٣٣		٣٤٣	٣٤٤
٣٤		٣٤٧	٣٥٢
٣٥		٣٥٥	٣٧٦
٣٦		٣٧٩	٣٨٠
٣٧		٣٨٣	٣٨٦
٣٨		٣٨٩	٣٩٠
٣٩		٣٩٣	٣٩٤
٤٠		٣٩٧	٤٠٠
٤١		٤٠٣	٤٠٦
٤٢		٤٠٩	٤١١
٤٣		٤١٤	٤١٥
٤٤		٤١٨	٤١٨

م	البيــــــــــــان		الماجستير	
	الكاتبــــــــة	الأقــــــــــدم	من	إلى
٤٥	الطب	الباثولوجيا	٤٢١	٤٣١
٤٦		الفارماكولوجيا	٤٣٤	٤٣٥
٤٧		الهستولوجيا	٤٣٨	٤٣٩
٤٨		الميكروبيولوجيا	٤٤٢	٤٤٤
٤٩	الصيدلة	العقاقير	٤٥١	٤٥٤
٥٠		الصيدلة الصناعية	٤٥٧	٤٦٠
٥١		كيمياء حيوية	٤٦٣	٤٦٩
٥٢		كيمياء صيدلة طبية	٤٧٢	٤٧٣
٥٣	الطب البيطري	ميكروبيولوجيا	٤٨١	٤٨٣
٥٤		باثولوجيا الحيوان	٤٨٦	٤٨٩
٥٥		تغذية الحيوان	٤٩٢	٤٩٣
٥٦		الرقابة الصحية علي اللحوم	٤٩٦	٤٩٧
٥٧		الرقابة الصحية علي الألبان	٥٠٠	٥٠١
٥٨		إمراض باطنة وتشخيص معملی	٥٠٤	٥١٣
٥٩		إمراض أسماك	٥١٦	٥١٨
٦٠		إمراض دواجن	٥٢١	٥٢٧
٦١	التجارة	إدارة الأعمال	٥٣٥	٥٣٨
٦٢	التربية	أصول التربية	٥٤٥	٥٥٤
٦٣		علم نفس تعليمي	٥٥٧	٥٧٤
٦٤		المناهج وطرق التدريس	٥٧٧	٥٩٥
٦٥	التمريض	إدارة التمريض	٦٠٣	٦٠٧
٦٦		التمريض الباطني والجراحة	٦١٠	٦١١
٦٧		تمريض النساء والتوليد	٦١٤	٦٢٠

	البريد		الماجستير	
	الكتاب	الأقسام	من	الي
٦٨	التمرير	تمرير الأطفال	٦٢٣	٦٢٤
٦٩		تمرير نفسي وعقلي	٦٢٧	٦٣٠
٧٠	التربية الرياضية	المواد الصحية	٦٣٧	٦٣٩
٧١		أصول التربية الرياضية والترويح	٦٤٢	٦٤٣
٧٢		المناهج وطرق التدريس والتدريب	٦٤٦	٦٤٨
٧٣		الألعاب	٦٥١	٦٦٥
٧٤		مسابقات الميدان والمضمار	٦٦٨	٦٧٤
٧٥		المنازلات الرياضية والمائية	٦٧٧	٦٨٣
٧٦		التمرينات والجمباز	٦٨٦	٦٩٣
٧٧	الآداب	اللغة العربية	٧٠١	٧٠٨
٧٨		اللغة الإنجليزية	٧١١	٧١٤
٧٩		اللغة الفرنسية	٧١٧	٧١٩
٨٠		التاريخ	٧٢٢	٧٢٧
٨١		علم الاجتماع	٧٣٠	٧٣٤
٨٢		الأعلام	٧٣٧	٧٤٢
٨٣		الوثائق والمكتبات والمعلومات	٧٤٥	٧٥٤
٨٤	معهد دراسات وتكنولوجيا صناعة السكر	الشعبة الزراعية	٧٦١	٧٦٣
٨٥	التربية بالوادي الجديد	مناهج وطرق تدريس	٧٧١	٧٧٥


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلليات جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢

درجة الماجستير			بيان الكلية / المعهد
أجمالي	طالبه	طالب	
١٩	٣	١٦	كلية العلوم
٢٠	٣	١٧	كلية الهندسة
١٨	٣	١٥	كلية الزراعة
٩٨	٤٢	٥٦	كلية الطب
٧	٠٠	٧	كلية الصيدلة
١٢	٩	٣	كلية الطب البيطري
٢	٢	٠٠	كلية التجارة
٢٠	٨	١٢	كلية التربية
٩	٩	٠٠	كلية التمريض
١٧	٠٠	١٧	كلية التربية الرياضية
١٦	٤	١٢	كلية الآداب
١	٠٠	١	معهد دراسات وتكنولوجيا صناعة السكر
٢	١	١	كلية التربية بالوادي الجديد
٢٤٢	٨٦	١٥٣	الإجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكميات
جامعة أسيوط عن عام ٢٠٠٢





حلیة العلوم

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير


بكلية العلوم جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢

درجة الماجستير			البيان
أجمالي	طالبة	طالب	
٦	١	٥	الرياضيات
٢	٠٠	٢	الفيزياء
٣	١	٢	الكيمياء
١	٠٠	١	الجيولوجيا
٤	١	٣	علم الحاسوب
٣	٠٠	٣	علم النباتات
١٩	٣	١٦	الإجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية العلوم جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢



قسم

الرياضيات

مقدم الرسالة :	حنان حامد محمود البغدادي
موضوع الرسالة :	"الأحصاءات المرتبة والسجلات وتطبيقاتها" Order Statistics, Records and their Applications
الكلية والقسم :	كلية العلوم - قسم الرياضيات
تاريخ المنع :	٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د. عصام خلف الحسيني د. محمد عادل محمد على د. عبد الباسط عبدالله احمد

ملخص الرسالة

تميز التوزيعات على درجة كبيرة من الأهمية في الإحصاء وفي الإحتمالات . وفي هذه الرسالة هدفنا هو تمييز عائلة من التوزيعات المتصلة . والتي أقترحها أ.د. الحسيني (١٩٩٩). هذه العائلة تحتوي على توزيعات مهمة في مجالات اختبارات الحياة وغيرها مثل توزيع وايل الأسى ورايلي كحالات خاصة وتوزيع وايل المركب (أو توزيع بير الثاني عشر ذو البارامترات الثلاثة) (لوماكس ورايلي المركب كحالات خاصة) وباريتو وبيتا وجومبيرتر وجومبيرتر المركب. لقد أوجدنا بعض العلاقات التكرارية لدوال توليد العزوم والعزوم نفسها في حالة الإحصاءات المرتبة وحالة الإحصاءات المسجلة لهذه العائلة في الحالة المبتورة من الطرفين ثم خصصنا النتائج للحالات : المبتورة من اليسار والمبتورة من اليمين وغير المبتورة ، وأعطينا أمثلة لهذه العلاقات التكرارية لعدد من أفراد هذه العائلة . كذلك أستخدما هذه العلاقات التكرارية ، لدوال توليد العزوم والعزوم نفسها في حالة الإحصاءات المرتبة وحالة الإحصاءات المسجلة . لتمييز عائلة التوزيعات المتصلة المفروضة في الحالة المبتورة من الطرفين . شروط التمييز التي حصلنا عليها خصصناها للحالات : المبتورة من

اليسار والمبتورة من اليمين وغير المبتورة، وأعطينا أمثلة لهذه الشروط لعدد من أفراد هذه العائلة .

Summary of Thesis

Characterization problems are interesting and important in statistics and probability. Our aim in this research is to characterize a class R of continuous distributions, suggested by Al- Hussaini (1999). This class includes, among others, the Weibull (exponential and Rayleigh as special cases), Compound Weibull (or three- parameter Burr type (XII) (compound exponential or Lomax and compound Rayleigh as special cases), Pareto, beta, Gompertz and compound Gompertz distributions. Recurrence relations for the moment generating functions and product moments of order statistics and record values in the doubly truncated case for the class R are established. Such recurrence relations are obtained when the underlying population has a left, right or non-truncated distribution for the class R . The results are then specialized to single and product moments (for only two variables) and some illustrative examples for members of the class R are given. The class R is then characterized by using the recurrence relations based on moment generating functions and product moments of order statistics and record values in the doubly truncated case. The results are then specialized to characterize the left, right and non-truncated versions of R . Furthermore,

characterizations of conditional left, right and non-truncated class of distributions are established. Particular members of the class R are characterized in illustrative examples.

المقدم الرسالة :	المسيد احمد السيد أبو طبل
موضوع الرسالة :	دراسة عن التوبولوجى الرقمى A Study on Digital Topology
الكلية والقسم :	كلية العلوم - قسم الرياضيات
تاريخ الجرم :	٢٠٠٢/ ٩/ ٢٩ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ محمد عزت عبد المنصف أ.د/ نصار حسن عبد العال د. عبد المنعم محمد فوزع

ملخص الرسالة

لقد ظهر موضوع التوبولوجى الرقمى على يد Rosenfeld في الستينات ، ومن دراستنا لهذا الموضوع هو صنفنا مراحل تطور التوبولوجى الرقمى الى أربع مراحل هى : ١- مرحلة استخدام نظرية المخططات ، ٢- مرحلة محاولة علاج عدم التوافق ، ٣- مرحلة كاليمسكى ، ٤- مرحلة تعميم فراغات كاليمسكى في الفصل الأول : توضح مفاهيم الإتصاق في المستوى والفراغ والتعارضات الناتجة عند تطبيق نظرية المنحنى المغلق لجوردان في المستوى وبعض المحاولات لحل هذه التعارضات . الفصل الثانى يفيد أساس الرسالة وفيه درسنا التوبولوجى الرقمى وعلاقته بالتوبولوجى العام وهذا الإتجاه من الدراسة سمي بالإتجاه التوبولوجى في الفصل الثالث : عرضنا ودرسنا عددا من مسلمات الفصل ما بين T_0, T_1 نظرا لأن البنية التوبولوجية على الفراغات متباعدة العناصر تقع بين T_0, T_1 وهذه البنية هى التى يعتمد عليها اساس التوبولوجى الرقمى . في الفصل الرابع : درسنا العمليات الثنائية على التوبولوجى العام ، أيضا درسنا العمليات على مجموعة كل المجموعات الجزئية من مجموعة ما ، وطبقنا ذلك على الخط الرقمى .

Summary of Thesis

The digital topology has arisen for the study of geometric and topological properties of digital images. The subject has been studied since the late 1960's when it was introduced by Rosenfeld. From our study, we classified the development of digital topology to the following four stages. The stage of use of the graph theory. The stage of treatment of the uncomputability. The stage of Khalimsky. The stage of application of Khalimsky spaces. Chapter I clarified the adjacency concepts in the plane and space and the resulted problems in the Jordan curve theorem and some trials to solve these problems. Chapter II : introduces a comprehensive study for the Alexandroff and Khalimsky spaces, which considered as the foundations of digital topology "topological approach". Chapter III is devoted to give a study of the digital line and separation axioms between T_0 and T_1 space. In Chapter IV, the fundamental concept of bioperation on topological space and operation on the power set are presented. And apply them in the digital line.

مقدم الرسالة :	شريف فاروق نيازى على
موضوع الرسالة :	"حول تنبؤات بيز لنموذج جمبرتز" On Bayesian Prediction Under the Gompertz Model
الكلية والقسم:	كلية العلوم - قسم الرياضيات
تاريخ المقدم :	٢٠٠٢/١٠/٢٧ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ عصام خلف الحسنى أ.د/ محمد عادل محمد على موسى

ملخص الرسالة

تستكون هذه الرسالة من ثلاثة أبواب : الباب الأول يحتوى على بعض المفاهيم والتعاريف الأساسية المستخدمة فى هذه الرسالة . كذلك يحتوى على سرد تاريخى لبعض الدراسات التطبيقية والنظرية التى أجريت على توزيع جمبرتز (الفا ، بيتا) منذ بداية تكوينه إلى آخر ما تم نشره من أبحاث . أخيرا يحتوى هذا الباب على وصف المشكلة تحت الدراسة . الباب الثانى خصص لإيجاد فترات التنبؤ للقراءات المرتبة المستقبلية التى تتبع توزيع جمبرتز (الفا ، بيتا) على أساس بيانات مراقبة من النوع الثانى . وقد تم اعتبار حالتين الحالة الأولى عندما تكون المعلمة الفا معطومة والمعلمة بيتا مجهولة وتخضع لتوزيع قبلى معين . كذلك التنبؤ للقراءات المرتبة المستقبلية فى حالة ما إذا كانت المعلمتان الفا ، بيتا مجهولتين . أيضا فقد تم اعتبار التنبؤ فى حالة عينة واحدة والتنبؤ فى حالة عينتين مستقلتين فى كلا الحالتين السابقتين . ثم أعطينا بعض الأمثلة العددية المختلفة كما تم عمل دراسة باستخدام طريقة المحاكاة للنتائج التى توصلنا إليها فى هذا الباب . الباب الثالث تم فيه إيجاد فترات التنبؤ للقيم القياسية المستقبلية العليا التى تتبع توزيع جمبرتز (الفا ، بيتا) وذلك بفرض المعلمة الفا معطومة

بينما المعطمة بيتا مجهولة. وكذلك إيجاد فترات التنبؤ للقيم القياسية المستقبلية العليا إذا كانت معلمتان الفا وبيتا مجهولتين ، ثم أعطينا بعض الأمثلة العددية للحالات المستخدمة في هذا الباب ،

Summary of Thesis

This thesis consists of three chapters : In Chapter 1, some basic concepts used through out this thesis are presented . Literature of the Gompertz distribution and its applications are reviewed. Finally, an out line of this thesis is given. Chapter 2 is devoted to the Bayesian prediction intervals for future observation under the Gompertz model, With the two parameters α and β based on Type-II censored (informative) sample. The one and two-sample schemes are considered. Two different cases are considered. In the first case, the parameter a is assumed to be known while B has some marginal prior distribution, In the second case , it is assumed that both parameters α and β are unknown and have a bivariate prior distribution. Numerical illustrations for the given procedures and a simulation study are given Bayesian prediction intervals for future upper records based on the past” informative” Upper Record values from the Gompertz population are demonstrated in Chapter 3 . The one-and two-parameter cases are considered. Finally, numerical results for the given methodologies are presented.

طارق محمد عبد القادر إبراهيم	مقدم الرسالة :
دراسة عن صلاحية البرمجيات A Study of Software Reliability	موضوع الرسالة :
كلية العلوم - قسم الرياضيات	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١٠/٢٧ « ماجستير »	تاريخ المحم :
أ.د/ صلاح الدين عبد السلام الجندى د/ عادل أبو المجد سويسى محمد د. /محمد سعيد سليمان	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول ، تضمن الفصل الأول المقدمة وقد اشتملت على نبذة تاريخية عن نشأة نماذج الصلاحية وتطورها ، أما في الفصل الثانى فقد نوقشت صلاحية البرمجيات المتنامية المبنية على عملية بواسون غير المتجانسة بصفة عامة ، وتقدير متوسط عدد الأخطاء الابتدائى الموجود في البرمجيات والزمن اللازم للوصول إلى الصلاحية المطلوبة والتكلفة اللازمة لذلك ، ولقد اقترحنا نموذج جديد وحسبنا له القياسات السابقة. أما في الفصل الثالث فقد تم التركيز على طريقة Yamada testing effort ولقد اقترحنا نموذج جديد وحسبنا له القياسات السابقة .

أخيراً تضمن الفصل الرابع ملخصاً لنتائج هذه الدراسة ، الاقتراحات الخاصة بالعمل المستقبلى .

Summary of Thesis

The thesis consists of four chapters. In chapter 1, we present the need for reliable software and the history of software reliability growth models. We describe in chapter 2 the behavior of the counting, Process $\{N(t), t \geq 0\}$, the number of failures by time t , it is shown that $N(t)$ can be well described by a non-homogenous Poisson process (NHPP). Several measures, such as the number of failures by some pre-specified time, the number of errors remaining in the system at future time, and software reliability during a mission, the suitable time to release the software and the cost of the software. We modify a new model and study the above items in the new case. In chapter 3 we focus on the case of the Yamada testing effort model. Also, we modify a new model using first the exponential curve and then the Rayleigh curve in the second case. Finally, conclusions about this thesis and future work are given in chapter 4.

أحمد حسين سليمان محمود	مقدم الرسالة :
دراسة على نظريات التقارب والاستقرار لبعض الطرق التكرارية A Study on the Convergence Theorems and the Stability of some Iterative Procedures	موضوع الرسالة :
كلية العلوم - قسم الرياضيات	الكلية والقسم :
٢٠٠٢/١١/٢٤ م « ماجستير »	تاريخ المنسم :
أ.د. / نصار حسن عبد العال	لجنة الإشراف :
د. / محمد عبد الرحمن احمد	

ملخص الرسالة

الهدف من الرسالة هو دراسة التقارب والاستقرار لمتتابعات ذات تكرارات معينة مثل تكرار مان وتكرار اشيكافا وتكرار فى الباب الثالث ، ثم دراسة الاستقرار لبعض الطرق التكرارية. وأستخدمت طريقة مختلفة عن طريقة شيدم لدراسة التقارب لتكرار مان وتكرار اشيكافا ، ولتنفيذ ذلك قمنا ببرهان تمهيدية جديدة ، وهذه النتائج تجيب على السؤال الذى طرحه راهونز وأخيرا قمنا ببرهان نظرية تقارب لتكرار مان ذات الخطأ وتكرار اشيكافا ذات الأخطاء. وهذه النتائج تعميم لبعض نظريات كيوهو وشيدم واوزيليك. كذلك تم وضع طريقة تكرارية ، واستخدمنا هذه الطريقة لتعميم بعض النظريات ، كما قدمنا تعليقات على بعض النتائج. كما تم دراسة الاستقرار لطريقتى مان ذات الخطأ واشيكافا ذات الأخطاء وذلك للرواسم التضاغية من نوع $quasi$ -contractive ومن نوع ϕ -hemicontractive.

Summary of Thesis

The study proved that certain sequences of points which are iteratively defined converge always to a unique fixed point of a quasi-contractive mapping in function spaces. We establish the convergence of Mann and Ishikawa iterative processes for a continuous quasi-contractive mappings in l_p spaces, $1 < p \leq 2$. The convergence of Mann and Ishikawa iterative with errors in uniformly smooth Banach space of power type $q > 1$ was studied. These theorems generalize earlier works of Chidume and Osilike and Qihou. Also the study deals with the convergence of a sequence of new iterates for quasi-nonexpansive mappings in normed spaces. Our results generalize some theorems of Petryshyn and Williamson and study the stability and almost stability of Mann and Ishikawa iterative procedures with errors for mapping in a uniformly smooth Banach spaces. Discuss the stability of Mann and Ishikawa iterations with errors for a continuous quasi-contractive mapping T under different conditions. Our main results in this section improve and generalize the main results of Osilike. Moreover, the almost stability of such iterations are studied for the important class of ϕ -hemi-contractive mappings. The results are the extensions of some theorems in Huang. Finally, we give an application of the almost stability of the iterative procedures to the solution of non-linear equations.

مقدم الرسالة :	محمد سعد محمد عبد الرحيم
موضوع الرسالة :	'برمجيات طرق التقريب مع تطبيقات' Software for Methods of Approximations with Applications
الكلية والقسم:	كلية العلوم - قسم الرياضيات
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/ ١١/ ٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ صلاح الدين عبد السلام الجندي أ. د/ حسن محمد حسن الهواري د. /محمد سعيد سليم

ملخص الرسالة

هذه الرسالة تتكون من أربعة أبواب في الباب الأول : تم عرض ملخص لبعض طرق الاستكمال والتقريب والتقريبات القياسية للدوال وأيضا تم عرض بعض حزم البرامج المشهورة في التحليل العددي وفي نهاية هذا الباب تم عرض بعض التعريفات الأساسية لواجهة المستخدم الرسومية وكذلك أهمية استخدام واجهة المستخدم الرسومية في تصميم حزمة البرامج ، في الباب الثاني : تم دراسة بعض طرق التقريبات القياسية للدوال المتصلة ومنها طريقة بادى وطريقة شيبشيف - بادى وطريقة Minimax rational approximation وتحويل الدوال القياسية إلى صيغة الكسور المتتالية - Continued fraction from ، وأيضا تمت دراسة حزم برامج التقريبات القياسية في كل من Maple. Mathematica ، في الباب الثالث : قدمنا دراسة جديدة عن التقريبات القياسية للدوال المتقطعة ، وقدمنا طريقة جديدة سميت تقريب شيبشيف - بادى للدوال المتقطعة Discrete Chebyshev-Pade approximation ومن مميزات هذه الطريقة أنها تمكننا من حساب تقريب قياسي لمعكوس الدالة ، في الباب الرابع: تم تقديم حزمة من البرامج مصممة بإسلوب واجهة المستخدم الرسومية لحساب التقريبات القياسية للدوال المتصلة والمتقطعة وهذا يمكن

المستخدم من عمل مقارنات بين الطرق المختلفة • وإن يرى النتائج بشكل تخطيطي أو رقمي ويلاحظ ميول ونتائج التغيرات مما يساعده في اختيار أفضل الطرق •

Summary of Thesis

This thesis consists of four chapters: In chapter 1, we present a review of interpolation, approximation theory and approximation by rational functions. A summary of some better-known numerical analysis software packages. Also, we introduce some primary definitions, discussion of the different kinds of user interface tools (UITs) and graphical user interfaces (GUIs) and its classification. In Chapter II, we present study in the rational approximation of continuous functions (pade, Chebyshev- Pade and minimax rational approximation) and reduction of rational approximation to continued fractions (CFs) from. We present also, study involving the numerical approximation packages in Mathematica and Maple, which contain various procedures for developing rational approximation and continued fractions of continuous functions. In Chapter III, we present a recent method for rational approximation of discrete functions, namely, discrete Chebyshev-Pade approximation. This method is useful for approximation of inverse functions. In chapter IV, we present new graphical user interface (GUI) package for rational approximation of discrete and continuous functions. It enables users to make a good comparison among different methods to achieve the best method.

قسم

الفيزياء

مقدم الرسالة :	حسن أحمد حسن خاطر
موضوع الرسالة :	'دراسات تركيبية وكهربية وطيفية لبلورات أحادية من رباعي كلوروزنكات البوتاسيوم' Structural, Electrical and Spectroscopic Studies on Putanassium Terachlorozincate {K ₂ ZnCl ₄ } Single Crystals
الكلية والقسم:	كلية العلوم - قسم الفيزياء
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/ ١١/ ٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ محمود أحمد حفنى أ.د/ عبد العزيز أبو الفضل عبد العزيز

ملخص الرسالة

تنتمى بلورات رباعي كلوروزنكات البوتاسيوم إلى العائلة الفيروكهربية (β -) K_2SO_4 التى تتميز بالفيروكهربية المرتبطة بوجود سلسلة من التحولات الطورية عند درجات حرارة مذكورة من الطور الطبيعى (مجموعة فراغية pnam) في درجات الحرارة العالية إلى الطور غير المتوافق ثم إلى الطور المتوافق (مجموعة فراغية Pna_2) وقد تم إتمام هذه البلورات باستخدام طريقة التبخير البطيء من المحاليل المشبعة عند ٣٢ درجة مئوية في الحالة النقية وأيضاً بعد إضافة نسب مختلفة من أيونات الكوبالت والصوديوم والحديد . تم ذلك بإضافة كلوريد البوتاسيوم إلى كلوريد الزنك بالنسبة المولية ٢ إلى ١ وقد ظهرت معظم البلورات عديمة اللون باستثناء تلك المشابهة بالكوبالت حيث اكتسبت اللون الأزرق . تم اختبار التركيب البلورى باستخدام حيود الأشعة السينية للمسحوق في درجة حرارة الغرفة . تم أيضاً تحرى درجة حرارة التحول الطورى عن طريق قياس سماحية العزل والتوصيل الكهربى وخواص التيار-

مجال ، وقد أثبتت تلك القياسات وجود تحول طورى بين الطورين المتوافق وغير المتوافق عند درجة ٤٠٣ كلفن وأثبت وجود تخلف في معظم تلك القياسات بين التسخين والتبريد أن هذا التحول من الرتبة الأولى ، تمت قياسات الامتصاص الضوئى للأشعة فوق البنفسجية على البلورات المنماة بقياس النفاذية النسبية كدالة في الطول الموجى للفوتون الضوئى وتم حساب معامل الامتصاص وطاقة الفجوة الضوئية ووجد اعتمادها على نوع المادة الشائبة وكذلك تركيزها ، وقد لوحظ أيضا اعتماد طاقة الفجوة الضوئية على درجة الحرارة حيث تقل بزيادة درجة الحرارة .

Summary of Thesis

Potassium tetrachlorozincate (KTZC) crystals belongs to the (B-K₂SO₄) ferroelectric family characterized by a sequence of phase transitions from the high temperature Normal phase (Space Group Pnam) to Incommensurate then to Commensurate phase (Space Group Pna²₁) at reported temperatures. These crystals were grown in the pure state and doped with different concentrations of Cobalt (Co²⁺), Sodium (Na⁺) and Iron (Fe²⁺) ions using the slow evaporation technique from saturated aqueous solutions at 32°C. The starting materials were KCl and ZnCl₂ with the molar ratio 2:1. Most of the grown crystal structures were examined using powder technique of X-ray diffraction at room temperature. The lock in phase transition was investigated by measurement of the dielectric susceptibility, electrical conductivity and J-E characteristics. These measurements revealed the existence of a lock in phase transition at 403 K. The appearance of a

thermal hysteresis in most of these measurements have been performed on the grown crystals by measurements of the optical transmittance against the photon wavelength, the absorption coefficient and the Optical band gap were evaluated and found to change with the concentration and kind of dopant. The optical band gap was found to exhibit negative temperature dependence.

مقدم الرسالة :	منصور عبد الستار سيد محمد
موضوع الرسالة :	<p>بعض الدراسات الفيزيائية لبلورات أحادية نقية ومطعمة ببعض الشوائب المعدنية من رباعي كلوروزنكات الأمونيوم</p> <p>Studies on Some of the Physical Properties of Pure and Metal Ions Doped Ammonium Terachlorozincate $\{(NH_4)_2ZnCl_4\}$ Single Crystals</p>
الكلية والقسم:	كلية العلوم - قسم الفيزياء
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/ ١٢/ ٢٩ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ عبد العزيز أبو الفضل عبد العزيز
	د. جلال عبد الصادق محمد

ملخص الرسالة

وتتناول هذه الرسالة بعض الدراسات الفيزيائية لبلورة من بلورات عائلة A_2BX_4 الفيروكهربية وقد تم اختبار مادة رباعي كلوروزنكات الأمونيوم والتي تكتب باختصار (ATZC) وتعتبر هذه البلورة من البلورات الهامة التي تركزت الدراسة والأبحاث عليها في الأونة الأخيرة لما لها من خواص فيروكهربية متميزة وقد تم تحضيرها بطريقة المحلول المائي المشبع وذلك لعينات نقية بنسب تركيب كيميائية 1:1 بأضافة كلوريد الأمونيوم إلى كلوريد الزنك وقد تم تطعيم العينات بتركيزات مختلفة من شوائب السحاس والكوبالت والنيكل ومن ثم فقد قيست جودة العينات باستخدام حيود الأشعة السينية من المسحوق وتم حساب أبعاد الشبكة البلورية وكذلك الكثافة للعينات النقية والمطعمة وقد وجد أن هذه الحسابات تتفق مع النتائج التي حصل عليها باحثون آخرون .

إن دراسة الثوابت الضوئية لبلورات رباعي كلوروزنكات الأمونيوم (ATZC) لها أهمية كبيرة نظرا لاستخدام هذه البلورات في التطبيقات الضوئية . وقد أظهرت النتائج

أن الثوابت الضوئية تتأثر بإضافة الشوائب إلى البلورة النقية وقد لوحظ من قياسات ثابت العزل الكهربى خلال محور (b) للبلورات النقية والمطعمة وجود قمة واسعة عند نقطة الانتقال من الطور الثابت إلى الطور المخطط ، وقيست الموصلية الكهربائية للعينات النقية والمطعمة في دورتي التسخين والتبريد الأولى والثانية خلال الثلاث محاور البلورية ولوحظ من خلال قياس الموصلية أثناء التبريد والتسخين وجود قمم عريضة عند نقطة الانتقال الطورى ، من قياسات ميكانيكية التوصيل الكهربى (J-E) لوحظ أن الشوائب المضافة إلى بلورة رباعى كلوروزنكات الأمونيوم تؤثر على العلاقة بين كثافة التيار الكهربى J، وشدة المجال الكهربى E المطبق على البلورة ،

Summary of Thesis

The present work is concerned with the study of properties of ferroelectric $A_2 BX_4$ crystals. The crystal chosen for the study is ammonium tetrachlorozincate (ATZC). The samples used were prepared by using the technique of slow evaporation from supersaturated solution . The dopant ions were Cu^{2+} , Co^{2+} and Ni^{2+} . The study of the optical constants of single crystals is interesting for the use of crystals in optical applications. The optical constants γ , ϵ_i , ϵ_r , E_o , E_d , M_{-1} and M_{-3} were measured for pure and doped . The dielectric measurements reveal that virgin and doped samples show distinct anomaly around 363 K on the 1st run at the lock- in transition. The measurements of the electrical conductivity were carried out during heating and cooling runs at a rate of 1 °C/min . A continuous increase of σ_{dc} with temperature was noticeable. We

found that samples showed an abroad peaks in the heating and cooling runs around the temperatures 364 K and 406 K . J-E characteristics study is used to understand the nature of conduction mechanisms operating in measured crystals. The observed relation between the current density and electric field strengths, $\log J$ vs. $E^{1/2}$ for doped ATZC crystals for different concentrations at different temperature points to a conduction mechanism in which the charge carriers released by thermal activation over a columbic barrier that is decreased by the applied electric field.

قسم

الاجتماع

مقدم الرسالة :	أسامة محمود على حبيب
موضوع الرسالة :	دراسات على تخليق مركبات الثيازولوتريازولات والترايازولو-ثياديازينات وبعض المركبات المنتمية اليها Studies on Synthesis of Thiazolotriazoles Triazolothiadiazines and Some Related Compounds
الكلية والقسم:	كلية العلوم - قسم الكيمياء
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/ ٤/ ٢٨ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ عبدالله محمد محمود أ.د/ حسن احمد حسن الشريف أ.د/ عبد الوارث عبد الحليم عثمان

ملخص الرسالة

تحضير مركبات جديدة تحتوى على حلقة الترايازول وتقدير النشاط البيولوجى لعينات مختاره منها - ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام ٣-بنزيل -s- ترايازول-٥(HI) وكذلك ٣- بنزيل-٤- فينيل-s- ترايازول -٥- ثيول كمفاعلات أولية لتحضير مركبات الثيازولو [3,2-b]-s- ترايازول والثيازولو [2,3-c]-s- ترايازول والترايازولو ثياديازينات وكذلك تخليق مركبات أخرى بحولقة مشتقات الثيوسيمى كازبايد .

Summary of Thesis

Synthesis of some new heterocyclic compounds containing s- triazole moiety and evaluation of the biological activities of some

selected ones, for this purpose 3-benzyl-s-triazole- 5 (1H) thiol and 3-benzyl-4- phenyl-s- triazole-5- thiol are used as starting materials for synthesis of thiazolo-[3,2-b] -s- triazoles, thiazolo [2,3-c]-s- triazoles, triazolothiadiazines and some related compounds by cyclizing of thiosemicarbazide derivatives.

شوكت محمد بيومي على	مقدم الرسالة :
مترابكات انتقال الشحنة لبعض مركبات الأزول والأزين مع المستقبلات الإلكترونية * Charge Transfer Complexes of Some Azoles and Azines with Electron Acceptors	موضوع الرسالة :
كلية العلوم - قسم الكيمياء	الكلية والقسم :
٢٠٠٢/٥/٢٦ م « ماجستير »	تاريخ الجلم :
أ.د/ محمد رأفت محمود	لجنة الإشراف :
أ.د/ ماهر محمد احمد حامد	

ملخص الرسالة

تختص هذه الرسالة بدراسة المترابكات الجزيئية من نوع انتقال الشحنة لبعض مركبات الأزول (البيرازول والأوكسازول والبنزأوكسازول) والأزين مع المستقبلات الإلكترونية من نوع سيجما (O) وتلك التي من نوع باي (r) مثل : ٢و٣ - ثنائي كلورو-٥و٦ - ثنائي سيانو -٤و١- بنزوكينون (DDQ) ورباعي سيانواثيلين (TCNE) والكلورائيسل (CHL) . وتتضمن هذه الدراسة فحص الخواص الطيفية للمترابكات المختلفة المتكونة وتحديد طبيعتها وتعيين ثوابت تكوينها وقيم الامتصاص الجزيئي لها عند درجات حرارة مختلفة ، بالإضافة الى ذلك تشمل الرسالة دراسة تفصيلية لتأثير كل من التركيب الجزيئي للمركبات الماتحة للإلكترونات وتلك المستقبلية لها وكذلك تأثير طبيعة المذيب العضوي على ثبات المترابكات الناتجة ، كما أمكن أيضا من هذه الدراسة حساب جهود التأين للمدارات الجزيئية العالية الطاقة والممتلئة بالإلكترونات لمركبات الأزول والأزين تحت الدراسة ، وكذلك حساب قيم ثوابت الديناميكا الحرارية المصاحبة لتكوين المترابكات المتكونة .

Summary of Thesis

The general scope of the present thesis is a systematic investigation on the charge-transfer molecular complexes of some azoles such as pyrazoles, oxazoles, benzoxazoles and azines (triazines) with o -electron acceptor (iodine) and with r- electron acceptors viz., p-chloranil (CHIC) tetracyanoethylene (TCNE) and 2,3-dichloro-5,6- dicyanobenzoquinone (DDQ) . In the present thesis the electronic spectral characteristics of the different formed charge-transfer complexes are examined and discussed. Ionization potentials of the highest filled molecular orbitals of the different donors are determined from their CT energies and compared with the literature values. The formation constants and molar extinction coefficient values of the produced CT complexes are determined spectrophotometrically making use of both Scott and Benesi-Hildebrand methods at various temperatures. Moreover, effects of the molecular structure of donor and the nature of the electron acceptor as well as of solvent polarity on the stability of the formed CT complexes are investigated and discussed. Additionally, thermodynamic parameters of the CT complex formation (ΔH° , ΔS° , ΔG°) And $(b/a)^2$ are determined and discussed.

مقدم الرسالة :	الهام عبد الرحمن عبدالله الطائفي
موضوع الرسالة :	تخليق وتفاعلات بعض المركبات الجديدة غير متجانسة الحلقة المنتمية الى مشتقات البيريدين Synthesis and Reactions of Some New Heterocyclic Compounds Related to Pyridine Derivatives
الكلية والقسم :	كلية العلوم - قسم الكيمياء
تاريخ المزم :	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د. عبد السيد محمد عبد الرحمن د. عطيفي عبد الغفار بخيت

ملخص الرسالة

استهدفت هذه الرسالة تحضير بعض مركبات البيريدين خماسية الاستبدال ومشتقات الثيوبيريدين المنسوبة لها كمركبات جديدة من المتوقع أن يكون لها أهمية بيولوجية وطبية . وقد تضمن هذا العمل أيضا تفاعلات هذه المركبات مع العديد من الكواشف لتعطى مشتقات أخرى للبيريدين والثينو { ٢ و ٣ -ب } بيريدين بالإضافة إلى أنظمة جديدة غير متجانسة الحلقة ملتحة معها . طريقنا لتحضير المركبات المستهدفة بدأ من تفاعل أريل ميثيلين سيانو ثيو أسيتاميد مع الأسيتيل اسيتون حيث أعطى مخلوط من مشتقات ثنائي هيدروثيوكسوبيريدين ورباعي هيدروثيوكسوبيريدين المقابلة . استخدمت المركبات ٤ - أريل - ٥ - أسيتيل - ٣ - سيانو - ٦ - ميثيل بيريدين - ٢ (ايد) - ثيون كمواولية لتحضير المركبات المطلوبة وعليه فإن تفاعلها مع ٤ - ميثيل فيناسيل بروميد أو كلوروكلات الإيثيل أو كلورواسيتونيتريل أو كلورو أسيتاميد في وجود كمية زيادة من خلاص الصوديوم أعطى مشتقات الثيوبيريدين المقابلة . تسخين هذه المشتقات في ايثانول يحتوى على ايثوكسيد الصوديوم جعلها تسلك تفاعل ثورب - زجلر لتعطى مشتقات الثينو { ٣ ، ٢ -

ب {بيريدين المقابلة والتي استخدمت بدورها كوسائط للحصول على بقية المركبات المستهدفة ، علاوة على ذلك ، فقد تم دراسة النشاط البيولوجي لعدد كبير من المركبات المحضرة كعوامل مضادة للميكروبات .

Summary of Thesis

This thesis involves the synthesis of some new pentasubstituted pyridines and related thieno {2,3-b} pyridines of anticipated biological and medicinal importance. Also , the reactions of the latter compounds with a variety of reagents to produce other derivatives of pyridine and thieno {2,3-b} pyridine as well as their condensed heterocyclic systems are hereby included. The reaction of arylmethylene- cyanothioacetamides with acetylacetone, which gave a mixture of dihydrothioxo- pyridines and the corresponding tetrahydrothioxopyridines 5-Acetyl-4-aryl-3-cyano-6-methylpyridine-2 (1H) -thiones were employed as starting materials. Thus, their reactions with some halo compounds in the presence of sodium acetate gave the corresponding S-substituted thiopyridines. On heating of these compounds in ethanol in the presence of sodium ethoxide, they underwent Thorpe-Ziegler cyclization to give the corresponding thieno {2,3-b} pyridine derivatives, which in turn were used as key intermediates for the rest of the target compounds. Most of the synthesized compounds were tested in-vitro for their antimicrobial activities.

مقدم الرسالة :	احمد مصطفى سيف النصر مصطفى
موضوع الرسالة :	دراسات هيدروجيولوجية لبعض المناطق لمحافظة الوادى الجديد ، الصحراء الغربية ، مصر Hydrogeological Studies on Some Areas in the New Valley Governorate , Western Desert, Egypt
الكلية والقسم :	كلية العلوم - قسم الجيولوجيا
تاريخ المقدم :	٢٠٠٢/٥/٢٦ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د. سمير رياض اسماعيل د. / عبد العظيم محمد ابراهيم أ.د. / بيتر فيثيك

ملخص الرسالة

الدراسة الحالية تمثل إحدى خطوات الجامعة لتحقيق إهتمام الدولة بمشروعات إستصلاح الأراضي والتوسع الأفقى في مناطق متعددة من الأراضي الغير منزرعة بجمهورية مصر العربية ، حيث تلقى هذه الدراسة الضوء على منطقة هامة بالصحراء العربية (جنوب غرب مصر) ، ألا وهى واحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وهى تمثل حوالى ٤٧% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية ، يبلغ مجموع السكان حسب تقديرات ١٩٩٦ حوالى ١٤٠ ألف نسمة ، منها ٦٨٥٨٣ نسمة بواحة الداخلة و ٦٦٧٥٤ بواحة الخارجة ويقطن الباقي بواحة الفرافرة وحيث أن المياه الجوفية تمثل مصدر المياه العذبة الوحيد في منطقة الدراسة ، فأن عمل نموذج رياضى لتوقع أثر كل سياسة مائية في الواحات الداخلة التى تحقق التنمية المتواصلة بها خلال القرن الحالى أصبح أمر في غاية الأهمية ، وتم أستعمال البرنامج المعروف عالميا بالمدفلو لذلك .

كما تم تجميع البيانات الهيدروجيولوجية لكل منطقة الصحرا الغربية في الفترة ١٩٦٠ -

٢٠٠٠ وذلك لاستعمالها في حساب وإدخال المعاملات الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية
للخزان وأستعمالها في عمل صلاحية للنموذج قبل استخدامه في حساب الأثر المستقبلي
للسياسات المختلفة .

Summary of Thesis

A regional groundwater flow model for the Nubian Sandstone Aquifer System in Egypt was developed. Then this model was calibrated using the available hydrogeological data from the observation wells . The validated regional model is then considered as the base model in which the grids can be refined at any oasis to involve the detailed hydrogeological data. Such local scale (or the refined grid) model is then used for the prediction of the impact of a certain water policy in the next hundred years. To achieve this target the following steps were completed before the stage of model development : Hydrogeological data collection, model development and calibration, prediction of groundwater extraction impact on the future hydraulic heads, and model's grid refinement.

قسم

علم الحيوان



إسماعيل احمد إسماعيل عبد الرحيم	مقدم الرسالة :
دراسة مورفولوجية وظيفية للجهاز اللساني لدجاجة الماء" Functional Morphological Study of the Lingual Apparatus of the Common Moorhen. Gallinula Chloropus Meridionalis	موضوع الرسالة :
كلية العلوم - قسم علم الحيوان	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١/٢٠م (ماجستير)	تاريخ المسم:
أ.د. محمد توفيق وهبه د. ناهد أحمد شوقي	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تناولت هذه الرسالة دراسة مورفولوجية وظيفية للجهاز اللساني لدجاجة الماء (فرخة الماء) " Common moorhen " وتعد دجاجة الماء من الطيور المائية حيث تقطن بيئات المياه العذبة أو بالقرب منها وتتغذى على مواد نباتية مثل الحشائش وأوراق النباتات والطحالب الخيطية ، وكذلك على مواد حيوانية مثل بعض القواقع والقشريات ويرقات الحشرات والديدان وكذلك الأسماك الصغيرة . وقد تم عمل دراسة مورفولوجية وتشريحية لكل من الهيكل اللامي للجهاز اللساني وما يتصل به من تراكيب رخوة مثل العضلات والغدد اللعابية والأنسجة الضامة التي تربط هذه التراكيب معا وكذلك تم دراسة الأنسجة الطلائية التي تغطي الجهاز اللساني مع مناقشة كل من التراكيب السابقة من حيث ملائمة التركيب للوظيفة وكذلك علاقات هذه التراكيب معا وتأثرها الوظيفي . وقد استخدمت في هذه الدراسة عدة تقنيات مثل الدراسات التشريحية ، الدراسات النسيجية ، الهستوكيميائية والميكروسكوب الإلكتروني الماسح

وكذلك النافذ ، وذلك للتعرف بشكل دقيق على التراكيب المختلفة للجهاز اللساني والتي
ساعدتنا في معرفة دوره في عملية التغذية وكذلك ميكانيكية عمله ،

Summary of Thesis

The present investigation is concerned with the functional morphology of the lingual apparatus of the common moorhen, *Gallinula chloropus meridionalis* and is performed through studying of the following points :- General morphology of the tongue : A full description of the morphology of the tongue of *Callinula chloropus meridionalis* is given, and from the functional point of view, the following parts are described. Free portion of the tongue. The laryngeal area. The floor of the mouth. The suspended fascia. The lingual epithelium: A full description of the structure of the lingual covering epithelia, which cover the free portion of the tongue, preglottal area and the laryngeal mound , as well as the floor of the mouth was studied from the following points of view : The structure and thickness of the covering epithelium. The presence and appearance of keratinization. Surface structures. Mucosal-submucosal junction. The skeleton : The hyoid skeleton: A full morphological description of the morphology of the skeletal elements of the hyoid and both the type and the structure of the joints that connect these skeletal elements, as well as the articular ligaments that support these joints were studied anatomically, histologically histochemically and

by using scanning electron microscopy. The mandible: A brief description of the mandible is given due to its role in providing sites of attachments for some lingual muscles. The lingual muscles : The lingual muscles are Classified into four groups :- Gular muscles. Extrinsic lingual muscle. Intrinsic lingual muscles. Extrinsic laryngeal muscles. The lingual salivary glands: There are two groups of lingual salivary glands: Paired salivary glands: This group includes five salivary glands, glandula lingualis , glandula arytenoidea, glandula sublingualis, glandula submandibularis ventralis and glandula submandibularis dorsalis. Unpaired salivary glands : This group includes two glands, glandula preglottalis and glandula laryngealis, In the present investigation, glandula arytenoidea of Gallinula Chloropus meridionalis is described for the first time in birds . The results of the histological study of this gland is given and discussed in relation to its function.

مقدم الرسالة :	الهام عبد الصبور عبدالله عبد الصمد
موضوع الرسالة :	تأثير هرمون الثيروكسين على النمو والتميز الخلوي للمتجددات في الطرف الخلفي للعجوز المصري بوفور رجيولارس رس " Effect of Thyroxine on the Development and Cell Differentiation of Regenerates of Hind Limbs in Stages of the Egyptian Toad, <i>Bufo Regularis</i> Reuss
الكلية والقسم:	كلية العلوم - قسم علم الحيوان
تاريخ المضم:	٢٠٠٢/١/٢٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ عبد الفتاح محمود محمد حسنين أ.د. / فرج كرم عزيز

ملخص الرسالة

١ - تم دراسة تأثير هرمون الثيروكسين (بتركيزين ١٠، ٥٠ ميكروجرام لكل لتر) على استعادة القدرة التجديدية في الأطراف الخلفية المبتورة للطور البرقي (طور ٥٤) والطور المتحول (طور ٥٧) للعجوز المصري بوفور رجيولارس رس بعد البتر في مستوى مفصل للركبة ٢ - زادت القدرة التجديدية في الطور (طور ٥٤) المعامل بتركيز ١٠ ميكروجرام لكل لتر من هرمون الثيروكسين عن المعامل بتركيز ٥ ميكروجرام لكل لتر من الهرمون ٣ - زادت القدرة التجديدية في الطور المتحول (طور ٥٧) المعامل بتركيز ٥ ميكروجرام لكل لتر من هرمون الثيروكسين بنسبة ضئيلة عن المعامل بتركيز ١٠ ميكروجرام لكل لتر من الهرمون ٤ - يمكن استنتاج أن زيادة القدرة التجديدية للطور البرقي (طور ٥٤) أما نتيجة التأثير المباشر لهرمون الثيروكسين على خلايا المتجددات ذاتها ، أو تأثيره غير المباشر عن طريق زيادة إفراز هرمون الأنسولين ٥ - من المقترح أن زيادة القدرة التجديدية للطور المتحول (طور ٥٧)

المعامل بهرمون الثيروكسين تكون نتيجة زيادة إفراز هرمون الأنسولين ٦ - وجد أن عدد " أشكال إيبيرث " أقل من الحيوانات المعاملة بهرمون الثيروكسين عن مثيلاتها في المجموعة الضابطة واقترح أن يكون هذا النقص بسبب التأثير الهدمي لهرمون الثيروكسين ٧ - يعزى الاختلاف في عدد وشكل الميتوكوندريا إلى تغيرات النشاط الفسيولوجي للميتوكوندريا خلال مراحل التجدد المختلفة ٨ - زاد التكاثف والنمو في خلايا المتجددات للحيوانات المعاملة بهرمون الثيروكسين ٩ - كانت إعادة تميز الغدد الجلدية في الحيوانات المعاملة بهرمون الثيروكسين أسرع من مثيلاتها في الحيوانات الضابطة .

Summary of Thesis

The effect of thyroxine treatment in the concentration of 5 Hg/L and 10 µg/L on the restoration of the regenerative capacity of the hind limbs of the larval stage (stage 54) and the metamorphic stage (stage 57) of the tadpoles of the Egyptian toad, *Bufo regularis* Reuss was studied after amputation at the knee joint level, Treatment with 10 Hg/L thyroxine in the larval stage (stage 54) enhanced the regenerative power better than the concentration of 5 ug/L. Treatment with 5 Hg/L thyroxine enhanced the regenerative power in the metamorphic stage (stage 57) slightly better than treatment with 10 Ug/L. The effect of thyroxine on enhancing the regenerative power is suggested to be directly either on the cells themselves or indirectly through stimulating insulin production in case of the larval stage (stage 54). The effect of thyroxine is suggested to be indirectly

through stimulating insulin production in the metamorphic stage (stage 57). The number of Figures of Eberth was found to be low in the treated groups compared to that of the control ones, and this is suggested to be due to the catabolic effect of thyroxine. The variation in number and shape of mitochondria is suggested to reflect the physiological activity changes of mitochondria during different phases of regeneration. Thyroxine treatment was found to increase the cellular activities and to enhance the rate of cell proliferation. Thyroxine treatment enhanced redifferentiation of skin glands of the larval and metamorphic treated animals earlier than that of the control one.

مقدم الرسالة :	خالد فؤاد عبد الوكيل أبو العلا
موضوع الرسالة :	تأثير العوامل البيئية والمعادن الثقيلة على توزيع متشابهة الأقدام الأرضية " مفصليات الأرجل - قشريات " في أسبوط ، مصر Effect of Ecological Factors and Heavy Meeclals on the Distribution of Soil Isopoda (Arthropoooda Crustacea) in Assiut, Egypt
الكلية والقسم:	كلية العلوم - قسم علم الحيوان
تاريخ المسم:	٢٠٠٢/١/٢٠ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ محمد احمد حسين أ.د/ زينب عبد الخالق البقرى أ.د/ أزهار حسين محمد

ملخص الرسالة

أجريت الدراسة الحالية كمحاولة لألقاء الضوء على متشابهة الأقدام الأرضية في أسبوط ، وقد أوضحت النتائج أن التداخل بين العوامل البيئية والعناصر الثقيلة في النباتات المتساقطة والسقريه له تأثير على تواجد وتوزيع الثلاث أنواع التي وجدت بالمواقع الأربع محل الدراسة وتم أستنتاج معادلة الارتباط لتواجد كل نوع ، كما تم دراسة التوزيع الموسمي والنسبة الجنسية ومواسم التوالد للنوع المساند برسليونيديس برونوزسس ، وتمت دراسة تركيز الكاديوم والنحاس والرصاص والزنك داخل النوع برسليونيديس ، كما أجريت دراسة مقارنة بين تركيز هذه المعادن في الحيوان والنبات والسقريه حيث وجد أن تركيزها يكون عاليا في الحيوان أكثر من النبات والتريه مما دل على قدرته على تراكم العناصر الثقيلة ، وتم عمل تجربه معملية لدراسة تأثير إضافة العناصر الثقيلة (كاديوم - نحاس - رصاص - زنك) الى الغذاء على التمثيل الغذائي

وكفاءة النمو وتمثيل المعادن لنوع برسلونيديس برونوزيس ، وقد وجد أن الحيوان
تختلف استجابته لاضافة المعادن في الغذاء المقدم له سواء كانت هذه المعادن مقدمه
مفرده أو مختلطة .

Summary of Thesis

The present study is an attempt to through the light on terrestrial isopods in Assiut. 4 different sites have been chosen for study. The effect of some ecological factors and some heavy metals in soil and litter on the abundance and distribution of 3 isopod specie were studied and regression equations were calculated . The seasonal fluctuation, sex ratio and breeding seasons, the effect of ecological factors and heavy metals for the common species *Porcellionides pruinosus* were studied Concentration factor and bioaccumulation of studied metals were calculated to estimate the relationships between metals concentrations in animal with those in litter and soil . In laboratory, isopod responded differently to different metals addition in food, which were offered separately or combined.

محمد عبد المعز محبوب محمد	مقدم الرسالة :
دراسات على نشاط حرشفيات الأجنحة الكبيرة عند ارتفاعين مع العلاقة بتأثير ضوء القمر في المحمية الطبيعية في أسيوط A Studies on Activity of Macrolepidoptera at Two Levels in Relation to Moon-Light in Assiut Protected Area	موضوع الرسالة :
كلية العلوم - قسم علم الحيوان	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/ ٩/ ٢٩ « ماجستير »	تاريخ المزم :
أ.د/ نور الدين فرغلى حمد د. مصطفى حلمى على شافع	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

لقد ظهر استخدام المصائد الضوئية في عملية الجمع للرتب الحشرية المختلفة في الثلاثينيات ، وفي دراستنا هذه استخدمت فيها مصيدتين ضوئيتين على ارتفاعين مختلفين خلال عامين متصلين جمع خلالها ثلاثون نوعا من حرشفيات الأجنحة الكبيرة في منطقة المحمية الطبيعية في أسيوط ، ومن خلالها تمت الدراسة الآتية :- ١ - ترتيب الثلاثين نوعا من حرشفيات الأجنحة الكبيرة في ثمان فصائل مختلفة ٢٠ - دراسة التوزيع الموسمي لكل الأنواع مجتمعة ، وكذلك أربع فصائل مختلفة ٣٠ - دراسة عدد الأجيال لخمسة عشرة نوعا منها ٤ - دراسة التوزيع الليلي للأنواع المختلفة ٥٠ - دراسة تأثير العوامل الجوية المختلفة على نشاط الحشرة وتوزيعها الليلي ٦٠ - دراسة تأثير ضوء القمر على نشاط الحشرة .

Summary of Thesis

It's appeared that the light traps in the surveying of different insects orders for the year 1935. And from our studies in where two light traps at two different levels through two successive years to collect thirty species of Macro lepidoptera in the protected area in Assiut and study the following: The thirty species are arranged to eight different families. Seasonal abundance for all M.-Lep. Collectively and four families. Studying the annual population fluctuation, for fifteen species. Studying the night distribution for all Macro-Lepidoptera. Studying the effect of weather factors on the activity of four species. Studying the effect of moon- light.

قسم

علم النبات

مقدم الرسالة :	عامر على محمد سيف العيسى
موضوع الرسالة :	<p>«التلوث الفطري لحبوب القمح أثناء التخزين وتأثير ذلك على إنتاج السموم الفطرية وجودة الحبوب»</p> <p>Fungal Contamination of Wheat Grains during Storage and its Effect on Mycotoxins Production and Grain Quality</p>
الكلية والقسم:	كلية العلوم - قسم النبات
تاريخ المسم:	٢٠٠٢/٥/٢٦ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	<p>أ.د. أحمد يحيى عبد المالك</p> <p>أ.د. سعد شحاته المراغى</p> <p>أ.د. محمد أحمد عبد الساتر</p>

ملخص الرسالة

١- تم خلال الدراسة جمع ٨٠ عينة من حبوب القمح من ثلاثة مصادر للتخزين
هى : التخزين في الصوامع (٣٧ عينة) ، التخزين في أجولة الحبوب (٨ عينة)
والتخزين في منازل الفلاحين (٣٥ عينة) ٢- أجريت دراسة لمعرفة الحياة الفطرية لهذه
العينات باستخدام طريقة وضع الحبوب مباشرة في الوسط الغذائى الصناعى جلوكوز
شبابكس اجار مضافا اليه ٦٠ جم/لتر كلوريد صوديوم ٣- أجريت دراسة استقصائية
عن السموم الفطرية التى قد توجد طبيعيا في حبوب القمح ودرستسمية العينات
باستخدام الطريقة البيولوجية بالاستعانة ببرقات قشريات الملاحات رخوية الهيكل وتم
التعرف على السموم باستخدام رقائق السليكا وعديد من المذيبات العضوية والكواشف
اللونية ٤ - كذلك تم دراسة إمكانية إنتاج السموم بواسطة العزلات الفطرية (٥٦٣
معزولة) ٥ - وأخيرا تم تتبع بعض صفات الجودة في حبوب القمح المخزنة مثل :

اختبار الوزن النوعي - دليل الحبوب - تقدير النسبة المئوية الدقيق والردة - والنسبة
المئوية للبروتين والجلوتين واختبار فترة التخمر ،

Summary of Thesis

Eighty samples of stored wheat were collected from : bins (37 samples), jute sacks (8 samples) and farmer houses (35 samples). The mycobiota of these samples were investigated using direct plating technique on glucose- C zopek's agar containing 60 g Na C'L. The toxicity and natural occurrence of mycotoxins of these samples were tested using biological assay and TLC technique. Toxicity and mycotoxins Production by 563 cultures of Fungi isolated during this investigation. Some physical and chemical propepties of grain quality were studied. These properties includes: test weight seed index, the percentage of flour and bran, the percentage of protein and gluten in addition to fermentation time test.

مقدم الرسالة :	عبد محمد غالب على الكليبي
موضوع الرسالة :	"الفطريات والسموم الفطرية لثمار البن في اليمن" Mycobiota and Mycotoxins of Coffee Fruits in Yemen
الكلية والقسم:	كلية العلوم - قسم النبات
تاريخ المنح:	٢٧/١٠/٢٠٠٢ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د. / محمد بهي الدين حسن مازن أ.د. / سعد شحاته محمد المراغى أ.د. / أحمد محمد محرم

ملخص الرسالة

يعتبر نبات البن من المحاصيل الاقتصادية الهامة في جمهورية اليمن حيث يعتمد اقتصاده على تجارة البن نظرا للإنتاج الوفير ذات الجودة العالية ، وتستخدم ثمار البن كمشروب منبه حيث يتناوله معظم سكان العالم تقريبا لذلك فهو يعتبر محصول ذات أهمية اقتصادية ، ونظرا لاحتواء ثمار البن البروتين والكربوهيدرات والدهون فهو يعتبر وسط ملائم لنمو بعض الكائنات الدقيقة عليه مثل الفطريات السامة والتي من شأنها تعمل على إفساده مما يضر بإنتاجية المحصول وصحة الإنسان ، لذلك فقد اختار الباحث موضوع حيوى هام ذو أهمية اقتصادية ويرتبط ارتباطا وثيق الصلة بالبيئة والحفاظ عليها في جمهورية اليمن ،

Summary of Thesis

The study represents comprehensive survey of Mycobiota of coffee fruits and beans cultivated in Yemen republic it was extended to follow the changes in the composition and counts of these Mycobiota during storage at different levels of moisture contents and relative humidity. The abilities of coffee borne fungi to produce enzymes were also studied. Moreover, the waterfall occurrences certain fungal isolates to produce toxins in pure culture were evaluated. Finally, the role of moisture content, relative humidity, caffeine and theophylline on vegetative growth and toxins production by certain fungi artificially inoculated in coffee fruits and bean are determined.

Summary of Thesis

During this investigation the incidence of onychomycosis in relation to age and sex of patients in Assiut Governorate was studied. The acetiologic fungal agents were surveyed and identified. Their ability to produce extracellular enzymes was also tested. Finally, the sensitivity of these fungi to some antifungal therapeutic agents and plant extracts was evaluated . Onychomycosis was more common in adults over 21years and the age group 21-50 years comprised 71. 3% of patients. The most effective antifungal agents were those containing econazole, clotrimazole, ketoconazole or terbinafine- HCl.




كلية الهندسة

**بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير
بكلية الهندسة جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠٢**

درجة الماجستير			البيان
أجمالي	طالبة	طالب	
٦	٢	٤	الهندسة المدنية
٦	٠٠	٦	الهندسة الميكانيكية
٧	١	٦	الهندسة الكهربائية
١	٠٠	١	الهندسة المعمارية
٢٠	٣	١٧	الإجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين في درجة الماجستير بكلية الهندسة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢



قسم

الطبيب

أبو الفضل محمد محمد مجاهد	مقدم الرسالة:
'مونة أسمنتية عالية عدم النفاذية لأسطح خزانات المياه' High Impermeable Mortar for Surfaces of Water Tanks	موضوع الرسالة:
كلية الهندسة - قسم الهندسة المدنية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٣/٣ م / « ماجستير »	تاريخ المزم:
أ. د / على جمال على عبد الشافي د / محمود حسين أحمد د / محمد محمد محمود رشوان	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

الغرض من هذا البحث هو دراسة مدى تأثير خاصية نفاذية المونة الأسمنتية بالعوامل المختلفة والمتعلقة بالمواد الداخلة في مكوناتها والمواد المضافة إليها وكذلك دراسة إمكانية تقليل معاملات النفاذية للمونة الأسمنتية باستخدام إضافات مركبة غير تقليدية ومقارنته بإضافات مقترحة محلية (متواجدة بالسوق المصري) وقد أجريت التجارب المعملية على العجينة الأسمنتية وكذلك على مكعبات قياسية ذات أبعاد (١٠×٧×٧ سم) ومنشورات ذات أبعاد (١٦×٤×٤ سم) من المونة الأسمنتية ثم أختبرت تحت تأثير حمل استاتيكي حتى الكسر . وقد أظهرت الاختبارات أن الإضافات العضوية المقترحة تؤدي إلى تحسين الخواص الميكانيكية وكذلك تقليل النفاذية للمونة الأسمنتية مقارنة بالإضافات المحلية الموجودة بالسوق المصري .

Summary of Thesis

This study presents some experimental investigations for the development of performance about the mechanism effect of the suggested and manufactured properties and porous structure formation of the hardened cement mortar. The present work was under taken to compare between the mechanism effect of the suggested admixtures and some of the commercial chemical admixtures in Egypt which are used for reducing the permeability of cement materials to water such as super plasticizer "DM₂" or poly - blast - R. Experimental tests have been carried out on standard cubes (7.071x7.071x7.071 cm) and prisms (4x4x16 cm) from cement mortar composed of (sand cement equal to 3: 1 by weight) and tested under static loading up to failure. The suggested non-traditional admixtures have a good and clear effect on improvement mechanical properties and reducing the permeability of cement mortar hardening in normal conditions compared with the control plasticizing impermeable admixtures.

مقدم الرسالة:	زينب إبراهيم عبد الشافي
موضوع الرسالة:	مساهمة أسياخ الإنكماش في سلوك الكمرات الخرسانية المسلحة تحت تأثير الحمل الاستاتيكي " . Contiribution of Surinkage Bars on the Behaviour of Reinforced Concrete Beams Understatic Loading
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة المدنية
تاريخ المحم:	٢٠٠٢/٣/٣١ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ عبد الرحمن مجاهد أحمد د / يحيى عبد العظيم حسانين د / محمد محمود أحمد

ملخص الرسالة

يسبب إنكماش الخرسانة شروخ شعرية على سطح الخرسانة وهذه الشروخ تقلل من كفاءة الكمرات الخرسانية وللتغلب على هذه الظاهرة توصي معظم الكودات بإضافة تسليح جانبي يتم وضعه في صف واحد أو أكثر من صف وذلك على الجانبي في الكمرات ذات العمق الكبير ويرى الباحثين أنه يمكن الاستفادة من هذا التسليح الجانبي عند تصميم قطاع الكمرات الخرسانية . لهذا الغرض تم إعداد وصب ستة عشر كمرة خرسانية مسلحة ذات تسليح أقل من المتوازن وتم اختبارهم تحت تأثير حمل استاتيكي وفى هذه الدراسة تم أخذ تأثير كل من نسبة مساحة مقطع التسليح الجانبي وأماكنه بالنسبة لحديد الشد وتربيته فى صفوف بالنسبة إلى عمق الكمرة تم قياس عرض الشروخ وشكلها ومكانها وكذلك قياس الانفعالات فى كل من الخرسانة والحديد الرئيسى وحديد الإنكماش وكذلك رصد قيم أقصى هبوط للكمرات وقد أعطيت النتائج فى صورة

منحنيات وجداول وتوصيات للتعرف على سلوك هذا النوع من الكمرات بالإضافة إلى الاستفادة من التسليح الجانبي عند تصميم الكمرات ،

Summary of Thesis

As well known shrinkage of concrete usually accompanied with the formation of undesirable very small internal microcracks or quite large visual cracks. Therefore such phenomenon of concrete usually introduces a characteristic problem in R.C. structural members. Provision of side bars in large size R.C. beams is a common to overcome the defects of shrinkage. From the authors point of view such side bars not to resist shrinkage but also to contribute the overall resistance of such beams. Therefore the aim of this work is to give better understand to the static behavior of the sharing of side bars in the resistance of beam cross-section. For this purpose sixteen R.C. beams were prepared and tested under static transverse loading. The effect of both position and distribution of side bars on the beam cross – section beside the effect of beam width were studied. The cracks widths were measured while the shapes and position of cracks were observed. The strain in the concrete, side bars, main steel and maximum deflection were record. A comparison between the different codes was given. The results were given in shape of tables and curves.

أحمد محمد أحمد عويس	مقدم الرسالة:
"العوامل التي تؤثر على متغيرات إنسيابية المرور في المناطق الحضرية (دراسة حالة شبكة الطرق بمدينة أسيوط)" Investigating the Factors Affecting Traffic Flow Variables in Urban Areas A Case Study: (Assiut City Road Network)	موضوع الرسالة:
كلية الهندسة - قسم الهندسة المدنية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)	تاريخ الـنـم:
د / السيد محمد عبد الله	لجنة الإشراف:
د / حسن يونس أحمد	

ملخص الرسالة

تهدف الدراسة إلى بحث العوامل المتغيرة والمؤثرة على خصائص وكذلك إنسيابية المرور داخل المناطق الحضرية وأيضاً العوامل الأخرى التي تساهم في عرقلة إنسيابية المرور . تم حصر وقياس العوامل التي تؤثر على إنسيابية المرور من خلال دراسة ميدانية مكثفة لوسط مدية أسيوط . أيضاً تم استخدام حزمة برامج رياضية معروفة باسم (Spss) لتوصل إلى نماذج محاكاة رياضية تربط العوامل التي تؤثر على إنسيابية المرور والسرعات الفراغية للمرور وذلك على المحاور المختلفة بوسط مدينة أسيوط .

Summary of Thesis

The study aims to investigate traffic flow variables and traffic flow characteristics in Urban Areas, the factors which would affect

these variables and contribute to traffic problems. A case study of Assiut central business district to determine these characteristics was carried – out through extensive surveys and data collection. Data collected were processed and standard regression. Analysis program was applied for exploring traffic flow variables and traffic space -- speed.

مقدم الرسالة:	هشام عبد الوهاب على
موضوع الرسالة:	تحسين صفات الخلطات الإسفلتية بغرض مقاومة التآكل لتناسب الظروف البيئية بالوجه القبلي (بجمهورية مصر العربية) Improvements of Asphaltic Concrete Mixtures to Resist Rutting Action to Suit Upper Egypt Environmental Conditions
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة المدنية
تاريخ المحرم:	٢٨/٧/٢٠٠٢ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ. د / محمد أحمد عويس د / السيد محمد عبد الله د / حسن يونس

ملخص الرسالة

الستخذ من أهم الظواهر الحادثة بالطرق الإسفلتية في جمهورية مصر العربية وخاصة طرق جنوب الصعيد نظرا لارتفاع درجات الحرارة الشديدة ويهدف هذا البحث لتحسين صفات الخلطات الإسفلتية لمقاومة التآكل باستخدام الخامات المحلية بجنوب مصر وهي استخدام رمل تكسير الكسارات كعنصر بديل للرمل الطبيعي مع أنواع مختلفة من الركام في تصميم الخلطات الإسفلتية ودراسة تأثير هذا العنصر البديل على ثبات الخلطات وبالتالي مقاومة التآكل الحادث بالطرق وقد أثبتت الدراسة بان استخدام رمل تكسير الكسارات في تصميم الخلطات الإسفلتية بها يعطي ثبات للخلطات بنسبة أكبر من تصميم الخلطات بالرمل الطبيعي والذي هو سائد في الاستخدام .

Summary of Thesis

Rutting of asphalt concrete pavements is the permanent deformation of a road surface which may arise because of the high degree of temperature, it is the most important distress mode at asphalt concrete surfacing layer of highways in Upper Egypt. This research aims to improve asphalt concrete mixes by using crushed sand in mixes instead of natural sand. The results attained found that using crushed sand in mixes increase marshal stability and consequently decrease rutting than that use natural sand.

مقدم الرسالة:	منار عبد الشكور أحمد
موضوع الرسالة:	"استكشاف المسارات المتعددة عند نقط تفرع حلول معادلات الاتزان الغير خطية في المنشآت" Detecting Multiple Paths at Bifurcation Points for the Solutions of Nonlinear Equilibrium Equations of Structures
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة المدنية
تاريخ المنع:	٢٤/١١/٢٠٠٢م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د / محمد الشافعي عبد اللطيف أ. د / علي جمال علي عبد الشامي د / يوسف علي عباس

ملخص الرسالة

نتيجة السلوك الغير خطي في الخواص الهندسية وخواص المادة تحكم المنشأ مجموعة من المعادلات الغير خطية هذا السلوك الغير خطي للمنشأ يعرضه أثناء مقاومته للحمل المتزايد عليه إلى حدوث بعض أوضاع عدم الاتزان في المنشأ وعادة ما تكون نقطة عدم الاتزان للمنشأ علي مسار الاتزان بين الحمل والإراحة هي نقطة الحد الأقصى ولكنه في بعض المنشآت ونتيجة لشكل هندسي معين للمنشأ أو لحمل بطريقة معينة على المنشأ - كما تلك دراسته في هذه الرسالة - يتعرض المنشأ قبل وصوله لنقطة الحد الأقصى إلى نقط عدم اتزان يكون قيمة الحمل عندها أقل كثيراً من قيمة الحمل عند نقطة الحد الأقصى للحمل وهذه النقطة يسلك عندها مسار اتزان آخر غير مسار الاتزان الرئيسي المعتاد له يسمى هذا المسار بمسار التفرع وتسمى نقطة عدم الاتزان هذه نقطة تفرع. واستعرضت الدراسة طرق حل المعادلات الغير خطية عند

النقاط العادية والنقاط الحرجة والطرق المختلفة المستخدمة في إيجاد المسارات المستقرة من نقط التفرع على المسار الأصلي بالإضافة إلى الصيغ الرياضية المختلفة لمعادلات الكزازة لتكوين العناصر المحددة للعنصر الجملوني محتوية على الكزازة المرنة والكزازة الهندسية سواء باستخدام موضع النقطة كمجهول أساسي أو باستخدام الزاحة النقطة كمجهول أساسي وقد تم إعداد برنامج كمبيوتر يقوم بتحليل الجملونات الفراغية المعرضة لأزاحات كبيرة وبفرض أن مادته مرنة ويمكن للبرنامج تتبع مسار الاتزان لأي منشأ جملوني ، تم تحليل مثالين للجملونات أحدهما مستوى والآخر فراغي تحت شروط تحميل وإبعاد هندسية مختلفة .

Summary of Thesis

Nonlinearly of the structural problems such as geometric nonlinearly and / or material nonlinearly leads to deal with the bifurcation phenomenon. The nonlinear equations can be solved without expose to the bifurcation analysis, but in fact the importance of the bifurcation analysis arise from that the structure practically does not follow the theoretical path of the perfect structure. In this work, methods of solving nonlinear equations at ordinary or singular points were reviewed, and also different switching techniques to pick the bifurcated paths were presented. Different finite element formulations of the bar the bar element include the elastic as well as the geometric stiffness were presented, once using nodal position as the basic unknown and the others using the nodal displacement as basic unknown. In this present work, a computer program has been

prepared to be able to analyze any truss structure and to deal with the bifurcation phenomenon. Two examples have been completely investigated the first is the two bar truss and the second is a space dome truss.

سيد محمود حسين	مقدم الرسالة:
تطوير برنامج على الكمبيوتر لحل مسائل الموضع والقياس في الهندسة الوصفية	موضوع الرسالة:
Developing a Computer Program to Solve 3-D Position and Metric Problems in Descriptive Geometry	
كلية الهندسة - قسم الهندسة المدنية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١٢/٢٩ م / (ماجستير)	تاريخ المنح:
أ.د / محمد الشافعي عبد اللطيف	لجنة الإشراف:
د / هشام عبد المعز محمد	

ملخص الرسالة

حتى الآن يتم التعامل مع الهندسة الوصفية يدوياً حيث يقوم الطالب بحل المسائل باستخدام الأدوات العادية كالقلم الرصاص والمسطرة ، ولوحة الرسم ، ولكن كل شيء في حياتنا الآن يتجه نحو الكمبيوتر ، لذلك كثير من برامج CAD طورت لترسم الأشكال المختلفة على شاشة الحاسب ومن ثم طباعتها . هذا البحث يهدف إلى تطوير برنامج على الكمبيوتر لحل مسائل الموضع والقياس في الفراغ في الهندسة الوصفية وذلك باستخدام لغة البسكال للبرمجة اعتماداً على الهندسة الوصفية والهندسة التحليلية والهندسة الحسابية ورسومات الكمبيوتر وقواعد البيانات.

Summary of Thesis

This study aims to produce implemented algorithms to solve traditional DG problems using computers. For this purpose, analytic geometry, data structure using PASCAL programming, computational geometry, and CAD features are used. The developed program has a remarkable property that it can be developed further to solve other applications like, surface intersections, cut and fill problems, perspective projection, etc. It is considered unique one in DG problems solving in our Arabic area. The produced program uses normal home computer units. The specifications of these units are Pentium III, 256 KB cache memory, 128 MB RAM, 40 MB hard disk free area, 1.44 MB floppy disk and CD-ROM. The hard copies are produced using HP normal laser printers.

قسم

الطبيب

الطبيب

مقدم الرسالة:	تامر محمد منصور
موضوع الرسالة:	'التحكم الجاسي في موضوع ذراع آلي مرنة' Robust Position Control of a Flexible Robot Arm
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة الميكانيكية
تاريخ الـمـنـح:	٢٠٠٢/٣/٣ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / أحمد عبد المنعم أبو إسماعيل د / أبو بكر نصر د / علي صبري

ملخص الرسالة

تهدف هذه الدراسة إلى تصميم حاكم جاسي بسيط للتحكم في حركة ذراع آلي واحد مرنة مع حمل طرفي جدير بالاعتبار وأيضاً لتحقيق دقة عالية في الموضع عند النقطة الطرفية للذراع صممت تجربة معملية خصيصاً لتحقيق هذا الهدف بتشغيل ذراع آلي واحد مرنة عن طريق موتور يعمل بتيار كهربائي مستمر وتم تحديد وضع معين للذراع لتحقيقه وطبقت سياسة تحكم بتغذية عكسية فعالة عن طريق تغذية وضع وسرعة قاعدة الذراع (المفصل) والحناء نقطة نهاية الذراع (النقطة الطرفية) باستخدام سياسة تحكم تناسبية تكاملية تفاضلية معدلة طبقت ثلاثة سياسات للتحكم وهي تحكم تناسبي وتحكم تناسبي تكاملي وتحكم تناسبي تكاملي معدل للتحكم في الذراع الآلي المرن وقدرت قيم معاملات الحاكمات بناءً على طريقة مطبقة على قاعدة الذراع (المفصل) ونقطة نهاية الذراع (النقطة الطرفية) اختبرت الحاكمات عن طريق إدخال دالة درجيه بـقيم مختلفة لزاوية قاعدة الذراع (المفصل) و اختبرت أيضاً جساءة الحاكمات المستخدمة التناسبية التكاملية والتناسبية التكاملية التفاضلية المعدلة المقترحة بتغيير شروط التحمل عند طرف الذراع أوضحت النتائج المعملية أن الحاكمة التناسبية

التكاملية والتناسبية التكاملية التفاضلية المعدلة المقترحة بتغير شروط التحميل عند طرف الذراع ، أوضحت النتائج العملية أن الحاكمة التناسبية التكاملية التفاضلية المعدلة المقترحة استطاعت أن تزيل الخطأ في وضع قاعدة الذراع (المفصل) عند الاستقرار وأيضاً قللت الانحناء عند نهاية الذراع (النقطة الطرفية) بالإضافة إلى إخماد الاهتزازات بصورة ملحوظة وضعت تتبع جيد من الذراع المرن للذراع الجاسئ وأيضاً للحاكمة التناسبية التكاملية التفاضلية المعدلة المقترحة خاصية الجساءة حيث استطاعت تحقيق دقة عالية في الوضع تحت ظروف شاملة وشروط تحميل مختلفة .

Summary of Thesis

The major target of this thesis is to design a simple robust controller to control the motion of a single flexible robot arm with a considerable payload, and to achieve a high positioning at the arm. An experimental setup is designed specially to achieve this goal by actuating a single flexible robot arm with a Dc – servomotor. The arm is driven to a certain requested position and an effective feedback control policy is implemented by feeding the hub position, speed and tip deflection, subjecting to a modified PID control strategy (MPID). Three controller strategies P,PI and MPID are implemented to the flexible arm position control. The parameters of these controllers are evaluated based on Ziegler–Nicholas tuning methods applied to the arm base (joint) and end point of the flexible arm (tip). The controllers are tested for different step input angles for the joint. The robustness of the proposed controller (MPID) is examined by changing the

loading condition at the tip of the flexible arm. The experimental results indicate that the MPID controller can achieve zero steady state error for the joint motion and a minimum deflection at the tip position with noticeable vibration suppression. The MPID can guarantee a good tracking of the flexible arm motion to rigid arm motion. The MPID controller has a robust characteristic since it is capable to achieve high positioning accuracy under different loading condition and wide working envelope.

مقدم الرسالة:	حمدي أبو علي حسان
موضوع الرسالة:	دراسة عن تبريد العناصر الإلكترونية داخل حيز مغلق A Study on Cooling of Electronic Components in an Enclosure
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة الميكانيكية
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/٣/٢ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / إبراهيم محمد شفيق د / على يوسف ترك د / نبيل يسن عبد الشافي

ملخص الرسالة

في البحث الحالي تم دراسة تبريد شريحة إلكترونية أفقية داخل حيز مغلق بانتقال الحرارة ثلاثي الأبعاد عن طريق الحمل الطبيعي مع الأخذ في الاعتبار تبادل الإشعاع الحراري بين حوائط الحيز وذلك في وجود مصب حراري ذي زعانف ذات مقطع مستطيل خارج الحيز . لقد تم وضع نموذج رياضي كامل في الثلاثة أبعاد في صورة معادلات لا بعدية للحيز المغلق ذي المصب الحراري متناولا جميع المتغيرات السابق ذكرها ، تم تحويل النموذج الرياضي إلى نموذج عددي باستخدام الفروق الدقيقة العددية ولاختبار صحة النموذج العددي تم إجراء تجارب معملية. والجهاز يتكون من حيز من البرسيكس مغطى بمصب حراري ويحوي مصدرا حراريا وقد تم وضع الحيز بجميع أجزائه داخل مجرى مستطيل من البرسيكس. بمقارنة النتائج المعملية ونتائج النموذج الرياضي العددي وجد أن هناك اتفاق معقول بينها مع فروق في حدود ١٩% بين النتيجةين عند الأخذ في الاعتبار الإشعاع بين حوائط الحيز المغلق وعند إهمال تأثير الإشعاع بين الحوائط يزداد الفرق بين النتائج إلى ٢٢% . وباستخدام الدراسة

النظرية ونتائج النموذج الرياضي العددي تم دراسة كثير من العوامل على درجة حرارة الشريحة وكذلك على شكل انتقال الحرارة داخل الحيز المغلق وهذه العوامل هي نسب الأبعاد (نسبة ارتفاع الحيز إلى عرض الحيز) وموقع الشريحة داخل الحيز والطاقة المتولدة من الشريحة و أبعاد المصب الحراري وكذلك معامل التوصيلية الحرارية للعاقد التي تحوي الشريحة .

Summary of Thesis

In the present work, three-dimensional combined natural convection-radiation conjugate heat transfer for cooling of a heat-generating dimensional unsteady mathematical model was set in non-dimensional form for an enclosure with its heat sink. The unsteady state mathematical model was transformed to finite difference numerical technique. To validate the numerical model an experimental set-up was built. It consisted of cubic Perspex enclosure with a heating element topped by a heat sink. The enclosure and its components were set inside a rectangular channel to facilitate a uniform flow of air through the heat sink. Comparisons between the numerical and experimental data show a good agreement when radiation effect is considered. The effects of many parameters on the chip temperature and heat transfer phenomena inside the enclosure were studied using analytical work. These parameters were the ratio of enclosure height to its width-aspect ratio-, chip position, chip power, heat sink characteristics and substrate thermal conductivity.

أحمد محمد رشاد فتح الباب	مقدم الرسالة:
تحليل رمزي ديناميكي عكسي لروبوت متوازي إنتقالي ذي ثلاث درجات حرية باستخدام مبدأ الشغل الافتراضي Symbolic Derivation of the Inverse Dynamics of A Three DOF Translational Parallel Robot by Virtual Work	موضوع الرسالة:
كلية الهندسة - قسم الهندسة الميكانيكية	الكلية والقسم:
٢٨/٤/٢٠٠٢ م (ماجستير)	تاريخ النم:
أ.د / محمد محمد شحاته سلام	لجنة الإشراف:
د / علي صبري أحمد رفعت	

ملخص الرسالة

فى هذه الرسالة تم تعيين شروط التوازن الإستاتيكي لمناول آلي (روبوت) متوازي إنتقالي ذي ثلاث درجات حرية ذلك بتحديد مركز الثقل الكلي للمناول الآلي ليكون ثابتا بغض النظر عن وضعه. يفيد التوازن الإستاتيكي خاصة فى المناولات الآلية المستخدمة كمحاكي للطيران حيث أن معظم عزم المقاومة يكون ناتجا من الحمل الإستاتيكي للمناول الآلى عموما فإن الماكينة المتزنة تعطي خصائصا ديناميكية أفضل وينتج عنها اهتزازات أقل وتوفر مزيداً من الطاقة . تم تطوير طريقة للتحليل الديناميكي العكسي لروبوت متوازي ذي ثلاث درجات حرية إنتقالية (موضعية) وذلك باستخدام مبدأ الشغل الافتراضي الذي يوظف مفهوم " Link Jacobian Matrices " ثم نقوم بعزل العزم المحرك " actuator forces " وذلك بعد أن تمثل كل من القوى الخارجية وقوى القصور الذاتي والاراحات الافتراضية المناظرة لهم فى نظام الإحداثيات الخاص بالسلسلة الفرعية " Limb Coordinate Frame " ثم تمثيل هذه الراحات

الافتراضية بدلالة إحداثيات الرصيف المتحرك {P} عن طريق مصفوفة الجاكوبيات " Jacobian Matrix JP " ثم تم إيجاد الصيغة الرمزية الصريحة وتبسيط الحل باستخدام برنامج " Matlab Symbolic Toolbox " الموصل إلى تسريع وقت الحسابات والذي من شأنه تحسين أداء التحكم للروبوت. تم عمل محاكاة ديناميكية لاختبار الأداء الديناميكي للمنازل الألي تحت تأثير تصغير مقياس كلا من القاعدة الثابتة والرصيف المتحرك كل بالنسبة للآخر . كما أجريت المحاكاة الديناميكية بالنسبة للحالة العادية والتي يساوي بها مقياس كلا من القاعدة الثابتة والرصيف المتحرك وللحالات البيئية التي فيها مقياس القاعدة الثابتة نسبة معطومة من الرصيف أجريت المحاكاة مع مسار مربع للرصيف المتحرك . لوحظ أنه خلال المسار كان يزيد العزم المحرك مع نقصان النسبة (r/c) التي تمثل نسبة (مقياس القاعدة الثابتة / مقياس الرصيف المتحرك) كما تتزايد مقدار الإزاحة الزاوية مع زيادة النسبة (r/c) . ثم تم عمل المحاكاة بعد ذلك في وجود ١٠ ن ، ٥٠٠ إجمالي أستماتيكية أعيد تنفيذ المحاكاة مع مسار دائري للرصيف المتحرك .

Summary of Thesis

In this thesis the conditions for static balancing of the three – dgrrees – of – freedom (DOF) translational parallel robot are determined. Specifying that the global center of mass of the robot is fixed and independent of its configuration. Generally, balanced robots lead to better dynamic characteristics, less vibration caused by motion and more save energy. The invers dynamics of a three degrees of freedom (DOF) translational parallel robot has been developed using

the principle of virtual work, which employs the concept of “link Jacobian matrices “. In this concept, the actuator forces are isolated from the other applied forces for the convenience of derivation. The resultants of the applied and inertia forces and their and their corresponding virtual displacements are expressed in the limb (leg) coordinate frame. Then relating the obtained virtual displacements to a set of independent generalized virtual displacements. For parallel robots the coordinates of the moving platform (P) have been chosen as the generalized virtual displacements and the rest of the virtual displacements have been expressed in terms of them. Specifically the virtual displacements of the actuated joints are related to the virtual displacement of the moving platform by the robot Jacobian matrix. Then the symbolic form is created and simplified by the MATLAB symbolic toolbox to achieve faster computational time. This simplified symbolic form contains 86 additions and 733 multiplications for each of the three actuators torque. An executable time of 0.0044 seconds on P-III 550 MILZ computer compared to 1.19 and 0.45 seconds on SPARCstation IPX computer for Lagrange and Newton – Euler dynamic models per time step respectively. Finally a developed algorithm executes 0.0017 seconds on the P-III 550 MILZ computer has been created. This algorithm avoids calculating the inverse Jacobian matrix symbolically which cause the problem of artificial singularity. This fast computational time is appropriate for real time control. A simulation study of the obtained

robot inverse dynamic model has been presented for different ratios of the fixed base size (r) w.r.t the moving platform size with respect to the fixed base size and vice versa. The simulation is carried out through a rectangular trajectory of the moving platform. It is found that during the specified rectangular trajectory the actuating torque increased when the ratio (r/e) decreased. On the other hand the values of the angular displacement of the actuator joints increased when the ratio (r/e) increased. The work done is computed for each case and also in the case of existence of 10N and 500N payloads. The above simulation work has been also repeated but with circular trajectory of the moving platform. The simulation shows that the work done during any trajectory can be reduced by proper selection of the (r/e) ratio.

مقدم الرسالة:	صالح أبو الفضل أحمد
موضوع الرسالة:	تأثير شكل قناة العادم على أداء المحركات الديزل المشحونة Influence of the Shape of the Exhaust Canal on the Performance of the Exhaust – Turbocharged Diesel Engines
الكلية والقسم:	كلية الهندسة – قسم الهندسة الميكانيكية
تاريخ المسم:	٢٠٠٢/٥/٢٦ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / عبد المنعم محمود إبراهيم أ.د / فايز متري واصف د / عبد المنعم محمود رجب

ملخص الرسالة

البحث الحالي يمثل نموذجاً ثرموديناميكاً نظرياً محاكياً لأداء محرك ديزل مشحون ذو أربعة أسطوانات ، رباعي الأشواط ، حقن مباشر مع نموذج سريان أحادي الأبعاد غير مستقر وقابل للابضغاط خلال مجمعي السحب والعادم ، تم استخدام هذا النموذج في دراسة تغيير بعض خصائص مجمع العادم على أداء المحرك وهذه الخصائص هي: شكل قناة العادم وهي القناة الموجود في رأس كتلة الاسطوانات والموصلة بين صمام العادم ومجمع العادم ، طريقة اتصال المواسير المكونة لمجمع العادم ، أقطار المواسير لمجمع العادم. وتم تصميم قناة العادم كنانثر مع تغيير زاوية رأسه الكلية من صفر إلى ١٨ درجة لدراسة تأثير ذلك على أداء المحرك ، يتكون النموذج من مجموعة من السناماج الفرعية وهي: المواصفات الأساسية للمحرك ومعدل حقن الوقود ومعدل احتراق ونواتج الاحتراق والخواص الثرموديناميكية لمائع التشغيل والاحتكاك وانتقال الحرارة وكيميائية تكوين السخام (الهباب) وأكاسيد النيتروجين والسريان خلال

صمامي السحب والعدم خلال مجعبي السحب والعدم والشاحن ، تم مقارنة نتائج هذا النموذج عند تشغيله كمحرك يعمل بالشفط العادي مع النتائج المعملية لمحرك حلوان _ ١١٤م فى أربعة تجارب مختلفة وأظهرت النتائج تطابقاً جيداً بين النموذج والتجارب المعملية ، كذلك تم مقارنة هذا النموذج عند تشغيله كمحرك مشحون مع نتائج بحث منشور باستخدام نفس مواصفات وظروف تشغيل المحرك مدار بموتور (بدون حقن) مع نتائج بحث منشور باستخدام نفس مواصفات تشغيل المحرك الموجود فى البحث وظهر تطابق جيد بين نتائج النموذج والنتائج المنشورة . تم استخدام أربعة تصميمات مختلفة لمجمع العادم رمز لها بالأنواع ٤،٣،٢،١ وفى كل تصميم منها تم تغيير زاوية الرأس الكلية لقناة العادم من صفر إلى ١٨ درجة مع تثبيت أقطار مواسير المجمع عند ٦٨م وهي قيمة هذه الأقطار لمجمع محرك حلوان _ ١١٤م ثم تغيير أقطار مواسير المجمع من ٦٨ مم إلى ١٣٠ مم مع تثبيت زاوية الرأس الكلية لقناة العادم عند ١٨ درجة . وتم دراسة تأثير ذلك عند مدخل الشاحن فى التصميمات الأربعة عند مختلف الظروف للتوصل إلى أنسب تصميم لمجمع العادم .

Summary of Thesis

A thermodynamic simulation model for the performance of a four cylinders, four stroke, direct injection turbocharged diesel with an unsteady one dimensional compressible flow through both intake and exhaust manifolds is presented. The model is used to investigate the effect of varying some exhaust manifold design parameters (exhaust canals shape, exhaust pipes arrangement and their diameters) on the engine performance. Simulation sub – models are: engine

geometry, combustion products, thermodynamic properties of the working fluid, friction, heat transfer, fuel injection, fuel burning rate, NO_x and soot formation mechanisms, flow rate through valves, intake and exhaust manifolds and turbocharger. Comparison of model predictions with some experimental tests of HELWAN-M114 engine and another published experimental work under similar conditions results in good agreement. A suitable parameters were selected for turbocharging HELWAN- M114 engine. They are: compression ratio = 13.5, excess air factor = 1.72 and intake manifold pressure = 180 kPa. Four different exhaust system configurations, denoted by types 1,2,3 and 4 were used and in each type of them, the exhaust canal is simulated as a diffuser and its total angle is varied from 0.0 to 18 degree, and the collecting pipe diameter is varied from 68 to 130 mm to study their variation effect on the engine performance. Design configuration (type 4) gives minimum pressure, temperature and velocity amplitudes reaches to 16.59 kPa, 20.69 k and 2.66 m/s at canal angle of 18 degree and collecting pipe diameter of 130 mm, respectively, before turbine inlet.

مقدم الرسالة:	محمود فرغلي بادي محمد
موضوع الرسالة:	دراسة تأثير نسبة خليط الايثانول والجازولين على انبعاثات العادم والأداء لمحرك إشعال بالشرارة Study of the Ethanol – Gasoline Blending Ratio on the Exhaust Emissions and the Performance of a Spark Ignition Engine
الكلية والقسم:	كلية الهندسة – قسم الهندسة الميكانيكية
تأريخ المزمع:	٢٠٠٢/٥/٢٦ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / عبد المنعم محمود إبراهيم د / عبد المنعم محمود رجب د / عمر محمد الأنور عبد الحافظ

ملخص الرسالة

أثبتت الدراسات النظرية والعملية أنه بالنسبة لمحركات الاحتراق بالشرارة يكون لتكوين الوقود تأثير ملحوظ على أداء هذه المحركات وانبعاثات العادم منها المتضمن لمكونات الهواء وقد تم في هذا البحث دراسة نظرية وعملية لهذا التأثير ، وقد تم استنتاج نموذج نظري ديناميكي حراري محاكي للأداء وانبعاثات العادم من محرك إشعال بالشرارة رباعي الأشواط يستخدم خلاط وقود من الايثانول والجازولين ، وهذا النموذج مصحوب بمعدل التكوين المتراكب لأول أكسيد الكربون وأكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين والهيدروكربونات وقد اعتمد هذا النموذج في بناؤه على القانون الأول للديناميكا الحرارية وعلى قانون حفظ الكتلة وعلى معادلة الحالة وكذلك على معادلات تجريبية لانتقال الحرارة ومعدل احتراق الشحنة ومفقدات الاحتكاك ، وقد استخدم هذا النموذج في دراسة تأثير تغيير نسبة خلط الايثانول والجازولين على أداء

المحرك (ممثلاً في استهلاك الوقود النوعي والقدرة المعطاة والكفاءة الحجمية وكذلك الكفاءة الحرارية) وعلى انبعاثات العادم (ممثلاً في تركيزات أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات غير المحترقة من المحرك) وقد أوضحت النتائج النظرية والمعملية ان الايثانول يبدو للجازولين قابل للتطبيق بالنسب لاعتبارات الكفاءة والعادم والتشغيل ، تم إجراء عدد من التجارب المعملية على محركي إشعال بالشرارة اسطوانة واحدة تبريد مياه ذوي نسب انضغاط متغيرة وهما مزودان بأجهزة القياس الضرورية وملحق بهما محلل غاز العادم وكانت العوامل المؤثرة المأخوذة في الاعتبار سرعة المحرك ونسبة خلط الايثانول والجازولين ونسبة الانضغاط ونسبة تكافؤ الوقود والهواء وقد تم تأكيد النتائج المعملية بواسطة النتائج النظرية والتي أوضحت أنه يمكن الحصول على زيادة في قدرة المحرك المعطاة وكذلك في الكفاءة الحرارية مع تحسين في انبعاثات العادم بالنسبة لوقود خليط من الايثانول والجازولين عن وقود الجازولين فقط وذلك عند ظروف مقارنة من نسب الوقود إلى الهواء ونسب الانضغاط وسرعات المحرك ، وقد لوحظ زيادة قدرة المحرك المعطاة بنسبة ١٢% قرب نسبة التكافؤ النظرية وكذلك زيادة الكفاءة الحجمية بنسبة ٢٤% كما حدثت زيادة في الكفاءة الحرارية الفرملية بمقدار ٥% وفي استهلاك الوقود النوعي الفرملي بمقدار ٢٤% قرب نفس نسبة التكافؤ من ناحية أخرى حدث تحسن في كمية العادم الخارج بنسبة ٤٠% أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات بنسبة ٤٤% عند نسبة تكافؤ ١.١ أما بالنسبة لغازات النيتروجين فقد كان التحسن بنسبة ١٦% عند نفس نسبة التكافؤ.

Summary of Thesis

Theoretical and experimental investigations have shown that for the spark ignition engine, the fuel composition can have a profound

influence on engine performance and the exhaust of potential air pollutants. The effect of using anhydrous ethanol blended with unleaded gasoline fuel on the engine performance and emission improvement. The present work represents a comprehensive thermodynamic simulation model for the spark ignition engine cycle to study the performance and exhaust emissions of the 4 – stroke engine fueled by ethanol – gasoline blends. This simulation model is used to investigate the effect of varying the blending ratio of ethanol – gasoline fuel on the engine performance (represented by output power, volumetric efficiency, brake specific fuel consumption as well as the thermal efficiency) and engine exhaust emissions (represented by exit concentrations of carbon monoxide, unburned hydrocarbons and nitrogen oxides). Kinetic NO_x , CO and HC formation rate equations were used in the simulation model to calculate their exit concentrations. The model depends primarily on the first law of thermodynamics, mass conservation law, equation of state as well as empirical equations for heat transfer, mass burning rate and engine friction. The theoretical results indicate that ethanol seems to be a alternative fuel to gasoline, with respect to efficient, operational and emission considerations. Experiments have been performed in order to confirm the theoretical results presented hers. The variables studied were blending ratio, compression ratio, mixture equivalence ratio and engine speed. The experimental results confirmed the theoretical results and showed that, an increase in engine output power and

thermal efficiency and an improvement in the exhaust emissions have been obtained for ethanol – gasoline mixtures fuel than for pure gasoline at comparative fuel – air equivalence ratios, compression ration and engine speeds. The simulation model showed that, increasing the blending ratio from pure gasoline to pure ethanol leads to an increase of about 12% in engine output brake power and of about 8,5% in brake thermal efficiency near stoichiometric conditions at a speed of 900 tpm. Also, a small increase in the volumetric efficiency of 2,4% is achieved at the speed. On the other hand, the specific consumption increases by about 24,0% near stoichiometric. The production of CO was reduced by about 40% while the HC by about 44,5% at an equivalence ratio of 1.1 and the production of No_x was reduced by about 16 % at the same equivalence ratio and the same speed.

مقدم الرسالة:	وائل فيروز عز الدين صالح
موضوع الرسالة:	'استخدام نظام التبريد بالامتصاص في تصميم جهاز تكييف لهواء السيارات يعمل بواسطة غازات عادم الإحتراق من المحرك' Design of an Absorption Air Conditioning System for an Automobil Using the Engine Exhaust Gases
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة الميكانيكية
تاريخ الـنـم:	٢٨/٧/٢٠٠٢م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / محمود جابر مرسى أ.د / إبراهيم محمد شفيق طه أ.د / عبد المنعم محمود إبراهيم

ملخص الرسالة

تم تصميم وبناء واختبار نظام تبريد بالامتصاص لتبريد هواء السيارة يعمل باستخدام غاز العادم المنبعث من محرك السيارة . نظام التبريد بالامتصاص الذى تم اختباره هو ماء مع بروميد الليثيوم لأنه أبسط ويعمل عند معدلات تبريد عالية وصغر أبعاد المبادلات الحرارية الخاصة به عن الأنظمة الأخرى والمستخدمه عند نفس الظروف . المحرك الذى تم اختياره لإجراء التجارب عليه هو محرك ديزل بركتر عمودي ذو ٤ إسطوانات وسعة ١٦٢١سم ٣ قدرة ٤٢ حصان تم تقدير حمل التبريد المرغوب وكان اطن تبريد مع درجة حرارة للهواء الخارج من المبخر تساوي ١٥ م وبمعدل سريان للهواء الخارج من المبخر يساوي ٠.١٤ كجم/ ث . تم حساب حجم أجزاء الجهاز وكانت مناسبة للفراغات الموجودة بداخل السيارة . كما تم عمل برنامج كمبيوتر محاكي لتوقع التغير فى أداء الجهاز عند حدوث تغيرات فى الأحمال القرملية للسيارة وكذلك سرعة السيارة . تم التقدير النظري لأداء الجهاز ممثلا فى درجة حرارة

الهواء الخارج من المبخر وسعة التبريد للمبخر وكذلك معامل الأداء للدورة في حالة اللاحمل لمحرك السيارة وكذلك حالات ربع الحمل الكامل للمحرك ونصف الحمل الكامل للمحرك وثلاثة أرباع الحمل الكامل للمحرك ، كما تم عمل التجارب عند نصف الحمل الكامل للمحرك والذي عنده تم حساب حجم أجزاء الجهاز . المقارنة ما بين أداء الجهاز العملي والنظري أظهرت أن لهما نفس الاتجاه مع وجود تباين بسيط. القيم العملية لمعامل الأداء للجهاز كانت تتراوح ما بين ٠.٢٣ ر إلى ٠.٥٣ . ولكن الموديل النظري أظهر إمكانية تحسين معامل الأداء إلى أكثر من ٠.٧٧ ، وبالمقارنة بين النتائج العملية التي تم الحصول عليها في هذا البحث والتي تم الحصول عليها من أبحاث أخرى تبين أن معامل الأداء للجهاز مقاربا لتلك الموجودة في الأبحاث الأخرى رغم أن المحرك المستخدم في هذا البحث أصغر بكثير من المحركات المستخدمة في الأبحاث الأخرى وكذلك أظهرت المقارنة المذكورة الاستغلال الجيد للطاقة الضائعة المتاحة في غازات العادم المنبعثة من المحرك .

Summary of Thesis

An automobile absorption air conditioning system powered by the engine exhaust gases was designed, built and tested. The selected absorption system was water- lithium bromide system because it is simple and operates at a higher cooling rate and smaller heat exchanger surfaces than other absorption systems for the same conditions. The selected engine was a vertical 4 – stoke perkins diesel engine, with a swept volume of 1621 cm³. The cooling load was estimated to be 1 ton of refrigeration for outlet air temperature from the evaporator of 15°C and an air flow rate of 0.14 kg/s. The cooling

load was for an automobile cabin suitable for 4 passengers. The components sizing was analyzed and the components sizes were suitable for the space inside the automobile. A computer simulation program encountered the prediction for the change in the performance of the engine exhaust fired absorption refrigeration unit when the engine speed and load (and consequently the exhaust gas temperature and mass flow rate) changes. The theoretical performance evaluation was done during the engine operation at no load (idling), at a quarter of the full load, at half of the full load, and at a three – quarter of the full load. The experimental work was done for a half of the full load for which the components were sized. The comparison between the experimental work and theoretical works curves showed that they have the same trend. Experimental COP values of the automobile absorption air conditioning system varied between 0.23 and 0.53, but system modeling shows that this can be improved to values considerably over 0.77. A comparable values of performance were achieved when one compare with other investigations. Also it represents a good heat recovery application for the waste power in the exhaust gases leaving the engine.

قسم

الطبيب

الطبيب

مقدم الرسالة:	مصطفى محمد دردير أحمد
موضوع الرسالة:	أداء المحركات أحادية الطور ذات عضو التوحيد المغذاه من خلال مقطعات التيار المستمر Performance of ADC Chopper-Fed Single Phase AC Series Commutator Motor
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة الكهربائية
تاريخ المنح:	٢٨/٤/٢٠٢٢ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ. د / عبد الرحمن أحمد محمد مكي أ. د / محمد ثروت عبد الرحمن د / عبد الله أحمد إبراهيم

ملخص الرسالة

تعد المحركات أحادية الطور ذات عضو التوحيد من أكثر المحركات استخداماً في الجر الكهربائي حيث إنها تستخدم في جر القطارات ولقد أثبتت الدراسات السابقة أنه عند تغذية المحرك الأحادي الطور ذو عضو التوحيد من مصدر جهد منخفض التردد فإنه يؤثر بشكل كبير على أداء المحرك حيث يعتمد كل من معامل القدرة والكفاءة وعملية التوحيد على تردد المصدر الكهربائي المغذي للمحرك ، تقدم الرسالة دراسة لأداء المحرك أحادي الطور ذو عضو التوحيد من خلال تغذيته دائرة مقطع تيار مصنعة حيث أن الطريقة تستخدم اثنتين من المفاتيح الإلكترونية كل مفتاح يتم توصيله على أطراف قنطرة كهربية ، القنطرة الكهربائية الأولى يتم توصيلها على التوالي مع المحرك ومع المصدر الكهربائي الأحادي الطور بينما الأخرى توصل على التوازي مع أطراف المحرك هذه الدائرة البسيطة تقوم بعمل تقطيع لتيار المصدر الكهربائي وجد من خلال عملية

خفض تردد المصدر الكهربى إلى الثلث تحسين ملحوظ فى كل من معامل القدرة والكفاءة وعملية التوحيد ومن مميزات هذه الطريقة رخص ثمنها وبساطتها .

Summary of Thesis

Single-phase AC series commutator motors find wide applications in traction systems. The salient feature of these motors is that their power factor, efficiency and commutation process are frequency dependent. Fortunately, these measures of performance are improved with the decrease of the supply frequency. However, feeding these motors from low frequency supply requires expensive converter-inverter or cycloconverter circuits. Therefore, if reduction of supply frequency becomes possible by simple controlled devices it will be encouraging and regarded as a real achievement. The essence of this thesis is to introduce an improvement to a previous drive in order to meet the above – mentioned demands for the single-phase AC series commutator motor. This thesis describes an improvement to a DC chopper drive for single-phase AC series commutator motor. This is simple as it only employs two controlled devices to operate as DC chopper switches in order to reduce the frequency of the applied voltage on the motor. The DC chopper switches placed across two diodes rectifier bridges one is connected in series with the single-phase series commutator motor and the other is connected in parallel with the motor to operate for free wheeling mode. The aim of this

process is to improve the power factor of the motor, but changing the chopping frequency results into a remarkable change in the RMS value of the voltage impressed on the motor. However, adjustment of the voltage can be easily effected by the drive as it can employ phase – angle control. These facilities of voltage control can be used in effecting speed control in addition. Thus, these merits combined with the simplicity and cheapness of the new drive make it attractive as well as competitive. Digital computer programs have been established using Fortran and Matlab package for transient analysis of proposed drive, both simulation and experimental results confirm the validity of the drive.

مقدم الرسالة:	مدوح عبد الآخر محمد أحمد
موضوع الرسالة:	بدء تشغيل المحركات الحثية الكبيرة مع تقليل عزمو الي على عمود الدوران Starting of Large Induction Motors with Reduced Torsional Torques
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة الكهربائية
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/٤/٢٨ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ د / عبد الرحيم أحمد محمد مكي د / عبد الله أحمد إبراهيم د / فريد نجيب عبد البسر

ملخص الرسالة

تعد المحركات الحثية هي الأكثر شيوعا واستخداما حيث أنها أرخص المحركات ثمنًا وأقلها حاجة للصيانة الا أن عيبها الرئيسي انها ما زالت أعلى للمحركات تكلفة من حيث التحكم في السرعة كما أن معامل قدرتها سيئ . كما أنه يصاحب عملية بدء تشغيل المحركات الحثية تيارات عالية والتي بدورها تؤثر على جهود الشبكة والأحمال القريبة منها خاصة في المحركات الكبيرة بالإضافة إلى ما سبق تظهر عدة مشاكل ميكانيكية في حالة الأحمال ذات الكتل الكبيرة حيث أن المحركات الحثية الكبيرة لها زمن بدء كبير والعزم الكهربى المتولد يحتوي على عدة مركبات متغيرة التردد ، أحد هذه المركبات المتغيرة التردد قد ينطبق ترددها أو يصبح قريباً من التردد الطبيعي للنظام الميكانيكي مما ينتج عنه انهيار أو إجهاد متتابع لعمود الدوران الذي يصل بين كل من الكتلة الدوارة للمحرك والكتلة الدوارة للحمل وبناءً على ذلك فقد تم دراسة مركبات العزم الكهربى المتغيرة التردد وتم تطبيق طريقة جديدة لبدء المحركات الحثية الكبيرة

لتقليل عزوم اللي على عمود الدوران وقد سميت هذه الطريقة بتقنية التحكم في الترددات المتقطعة حيث يتم باستخدام هذه الطريقة إبعاد الترددات لمركبات العزم الكهربى المتغيرة التردد المختلفة عن التردد الطبيعى للنظام الميكانيكي ومن ثم يقل عزم اللي على عمود الدوران . وتشمل هذه الدراسة ستة فصول وهي كالآتي: الفصل الأول ويحتوي عل طرق بدء المحركات الحثية الكبيرة وعيوب ومميزات كل طريقة مع مناقشة ظاهرة الاهتزازات الميكانيكية المتولدة على عمود الدوران الذى يربط بين كتلتين. الفصل الثانى ويشتمل على دراسة ظاهرة عزوم اللي المتولد على عمود الدوران الذى يصل بين كل من كتلة المحرك الدوارة وكتلة الحمل الدوارة ودراسة المركبات الترددية فى العزم الكهرومغناطيسي ودراسة تأثير كل منها على اللي المتولد على عمود الدوران. وخصص الفصل الثالث لدراسة عملية بدء المحركات الكبيرة باستخدام تقنية التحكم فى الترددات المتقطعة ودراسة تأثير خطوة التردد المتقطع على عملية بدء الحركة وعلاقتها بالتردد الطبيعى للنظام الميكانيكي كما تم تحديد اللحظات الانتقالية بين تردد والتالى له. الفصل الرابع لدراسة وتحليل الدائرة المعلىة المقترحة لتطبيق تقنية التحكم فى الترددات المتقطعة حيث تم استخدام ثلاثة ثايروسترات فقط كمفاتيح إلكترونية وتم دراسة إمكانية استخدام هذه الدائرة فى تطبيقات مثل بدء المحركات الحثية ، التحكم فى سرعتها ، عملية الفرملة ، والبدء الناعم. خصص الفصل الخامس لشرح تنفيذ الدائرة المقترحة فى الفصل الرابع معلىا لتغذية المحرك الحثى ذى الثلاث أوجه وتم الحصول على نتائج معلىة تدعم النتائج النظرية التى تم الحصول عليها فى الفصل الرابع. ويتضمن الفصل السادس الاستنتاجات للنتائج التى تم الحصول عليها خلال الدراسة كما اشتمل على إقتراحات لدراسة مستقبلية مكملة لهذه الدراسة .

Summary of Thesis

The first part of this thesis presents a new method for starting of large induction motors driving high inertia loads. The method employs the discrete frequency control techniques. The main aim of this technique is to reduce the shaft torsional vibrations accompanying the starting process, which may reach hazardous values because of various frequency components of the electromagnetic torque. The discrete frequency step depends on the mechanical system parameters. This part includes the following chapters: Chapter 1: Gives synopsis of the methods and physics that govern the start of large induction motors and fundamentals of vibrations in mechanical systems. The aim of each method is to solve the electrical problems accompanied with the starting process. Besides the electrical, there are mechanical problems which affect the motor starting and may lead to the damage of the mechanical system. Chapter 2: Includes analysis of large induction during period. Analysis of the electromagnetic torque indicates that there are variable frequency torque components. Although little amplitude, they may lead to high torsional stresses on the shaft coupling because of the rotor and load masses. Chapter 3: Presents a new technique for starting of large induction motors. The technique depends on the starting process of such a motor, that drives high inertia load by changing the supply frequency in a discrete fashion. The step frequency is set such that it should be less than the

drive system natural frequency. The second part of the thesis presents a new drive, which utilizes three single – phase DC chopper drives for three phase induction motors. The new drive uses only three controlld switches. The idea of this drive deends upon omitting of some half cycles of the line current to generate sumultiple frequencies of the line frequency. The validity of the drive for starting both the high and low inertia loads is confirmed by both simulation and experimental results. This part includes the following chapters. Chapter 4: Gives the simulation results for the starting process of three – phase induction motors using the proposed drive. It is found that the drive satisfies both safe starting of large induction motors driving high inertia loads by reducing shaft vibrations and wide range of speed control of those driving low interia loads. Chapter 5: Presents the experimental work and the results obtained in the laboratory for both the current in case of static loads and the current and speed in case of three – phase induction motor when they are fed from the drive under study. It found that the experimental results agree well with the digital computation. The last chapter (chapter 6) of this thesis gives conclusions of work.

ناصر مراد عبد الموجود	مقدم الرسالة :
تطوير وتطبيق طرق مبنية على نظرية المعلومات لفصل الإشارات Development and Application of Information Theoretical Approaches for Blind Signal Separation	موضوع الرسالة :
كلية الهندسة - قسم الهندسة الكهربائية	الكلية والقسم :
٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »	تاريخ المنح :
أ. د / عبد الكريم أحمد السيد الورداني د / رضا رجب غريب	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

تعتبر عملية الإشارات المختلطة إلى إشارات مستقلة وغير معتمدة على بعضها البعض من العمليات الأساسية والمهمة في مجال معالجة الإشارات يشير الاسم " فصل الإشارات المستترة " إلى ضعف أى معلومات عن الإشارات الأصلية أو الوسط بخلاف الافتراض أن هذه الإشارات مستقلة وغير معتمدة على بعضها البعض وبناء على ذلك فإن كل الخوارزميات التي نوقشت أو تم اشتقاقها في هذه الرسالة مبنية على هذا الافتراض . وقد قسمت الرسالة إلى ثلاث أجزاء رئيسية: في الجزء الأول تم عمل مراجعة للطرق التقليدية المستخدمة في فصل الإشارات مثل الطرق التي تستخدم إحصائيات من الدرجة الثانية والطرق التي تستخدم إحصائيات ذات درجات عالية وتم إيضاح القصور في كل حالة . كما تم أيضا عمل مراجعة ومناقشة لخمس من أشهر الخوارزميات المستخدمة في فصل الإشارات والمبنية على نظرية المعلومات. في الجزء الثاني اقترح خوارزم جديد مبني على نظرية المعلومات ويستخدم هذا الخوارزم في فصل المزيج الاتي للإشارات وتعتمد فكرة هذا الخوارزم على استخدام دالة كثافة الاحتمال الجاوسية المعممة كتقريب لدالة كثافة الاحتمال للإشارات الغير معلومة

والمطلوب استرجاعها ثم إيجاد صيغة للعنصر الذي يتحكم في شكل دالة كثافة الاحتمال للإشارات الغير معلومة والمطلوب استرجعها ثم إيجاد صيغة للعنصر الذي يتحكم في شكل دالة كثافة الاحتمال الجاوسية المعمة بدلالة الإحصائيات ذات الرتب العالية للإشارات المفصولة وتم إجراء بعض التحليلات لقياس مدى ثبات الخوارزم المقترح وفي الجزء الثالث تم تعميم الخوارزم المقترح لفصل الإشارات المتأخرة والإشارات الملتفة ، في حالة الإشارات الملتفة تم اقتراح طريقة جديدة لتغيير أطوال المرشحات المستخدمة في استرجاع الإشارات الأصلية بطريقة توافمية وتعتبر هذه الطريقة مفيدة جداً في حالة ما إذا كانت أطوال المرشحات المستخدمة في مزج الإشارات غير معلومة ويعتبر هذا الشرط متوفر دائماً في حالة " فصل الإشارات المستترة " .

Summary of Thesis

This thesis discuss the blind signal separation problem (BSS). The name " Blind signal separation " (BSS) refers to the lack of any information available about the original signals or the channel except of the independency assumption of the original signals. Accordingly, all algorithms discussed and derived in this thesis are based mainly on this powerful assumption. This thesis was partitioned into three main parts: In the first part: conventional approaches, which utilize second and higher order statistics as a measure of independency, are discussed, and their drawbacks are investigated. In addition, a review of information theoretic techniques was presented, In the second part: new algorithm that employs information theoretic technique for separating instantaneous mixture is derived. This algorithm based on

approximating the source probability density function (Pdf) as a generalized Gaussian Pdf with a new technique of approximating the Gaussian exponent, which controls the shape of the Pdf, as a nonlinear of the normalized cumulant of the separated-sources. In the third part: generalization of the derived algorithm to the delayed and convolved sources is also presented. In the case of convolved sources, a new technique of changing the length of the separating filter adaptively is derived. This technique is helpful where the lengths of the mixing filters are unknowns, which is usually the case.

مقدم الرسالة:	أحمد محمد عبد محمد
موضوع الرسالة:	تحليل أداء المرشحات الالكتروستاتيكية متأثرة بالاضطراب في إنسياب الغازات داخلها Analysis of Electrostatic Filters as Influenced by Turbulence of Flue Gases
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة الكهربائية
تاريخ المقدم:	٢٨/٧/٢٠٠٢ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / مازن عبد السلام د / أحمد سيد عبد الله

ملخص الرسالة

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة المجالات المتأينة في المرشح الالكتروستاتيكي النفقي متأثراً بسريان الغاز المضطرب باستخدام طريقة حساب جديدة . هذه الطريقة مبينة على فكرة العناصر المحددة . تستلزم هذه الطريقة حساب الشحنات في الفراغ ولذلك حسبت قيم الشحنات الابتدائية على سطح الأسلاك باستخدام طريقة متكررة بدلا من استخدام صيغ إفتراضية أو فرض قيم لها كما هو مستخدم سابقاً في الأبحاث كذلك اعتبرت الطريقة المقترحة المجال الكهربى على سطح الأسلاك كقيمة معطومة لطريقة العناصر المحددة أما سريان الغاز المضطرب فظهر تأثيره فى تغيير ضغط الغاز حول سطح الأسلاك مصاحبا لتغيرات فى جهود بدء التأين . هذا بالإضافة إلى إزاحة خطوط المجال الكهربى حيث تسري الأيونات على إمتدادها من سطح أسلاك التأين إلى لوحى الترسيب المؤرضين ولقد ظهرت كفاءة الطريقة المستخدمة عندما تم تطبيقها على عدة نماذج معملية للمرشح وكذلك على نماذج منشورة سابقاً وكانت النتائج متوافقة بصورة مرضية هذا بالإضافة إلى تحسين الدقة وتقليل الوقت اللازم لعملية الحساب مقارنة

بالطرق السابقة لقد تم قياس تيار التفريغ الهالي (Corona) وكذلك كثافة التيار على سطح اللوح المعدني المؤرض لعدة جهود مختلفة وكانت النتائج متفقة مع النتائج العملية المقاسة كما درس تأثير الاضطراب على قيم التيارات وأوضحنا الدراسة أن الاضطراب المصاحب لمرعات الغاز الحقيقية في المرشح النفقي له تأثير بسيط على قيم التيارات المختلفة سواء أكان المرشح يحتوي على سلك تفريغ واحد أو أكثر .

Summary of Thesis

This thesis is aimed at presenting a new iterative finite – element based algorithm (FEA) for the analysis of the ionized field as influenced by turbulence of flue gases in electrostatic filters. The proposed algorithm is aimed to waive Deutsch's assumption, where the volume space charges are assumed to affect the magnitude but not the direction of the electric field. The algorithm calls for the initial space charge density at the surface of the discharge wires is calculated from an iterative solution instead of being assumed using empirical formulas used before. Unlike all previous attempts reported in literature, the proposed algorithm implemented directly the electric field at the discharge wires surface as a boundary condition in the finite – element formulation. The effect of turbulence appears in a change of the gas pressure around the discharge wires with a subsequent change of the onset voltage. This is addition to the effect of the gas flow on the displacement of the field lines where the corona ions are convicted between the discharge wires and the collecting

plates. The proposed algorithm is tested through its application to different laboratory wireduct electrostatic filter configurations and the computed results are compared with those measured experimentally or calculated before. It is worthy to mention that not only the accuracy of computation is improved but also the number of iterations and hence the computational time required for convergence of the proposed iterative FEA is reduced in comparison with previous attempts. The $I - V$ characteristics and the current density at the collecting plates agreed reasonably with those measured experimentally. The effects of turbulence on the $I - V$ characteristics of the wireduct filter are discussed. For gas - flow velocities in real filters in the range 1.0- 3.0 m / s, the effect of the gas flow on the $I - V$ characteristics has nearly 2 - 4% for single and multi - wire filters.

مقدم الرسالة:	أسعد فراج إبراهيم سيد محمد
موضوع الرسالة:	'طريقة جديدة لتحسين الإشارات وتطبيقاتها في معالجة الصور' A New Method of Signal Enhancement With Application in Image Processing
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة الكهربائية
تاريخ المسم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / مدوح إبراهيم فؤاد أ.د / جمال محمد محمد عبد الرحيم

ملخص الرسالة

من أكثر أنواع المرشحات المتوائمة استخداماً هو مرشح LMS حيث يتميز هذا النوع من المرشحات بسهولة وكثرة استخدامه ولكن من عيوب هذا النوع أنه شديد التأثير بواسطة مصفوفة الترابط للإشارة المدخلة وكذلك النسبة بين القيمة الكبرى والصغرى الخاصة للمصفوفة ولحل هذه المشكلة نقوم بعمل ترقية للمرشحات لكي تعمل في حقل آخر بدلا من الحقل الزمني مثل حقل التردد أو أي حقل ويتبع ذلك عمل تعامد للقدرة ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة التقارب . الهدف من الرسالة هو إيجاد طرق جديدة لتحسين الإشارات مع تطبيقاتها في معالجة الصور الرقمية حيث نناقش في هذه الرسالة عدة طرق مقترحة لتحسين الإشارات مع تطبيقاتها في معالجة الصور الرقمية حيث نناقش في هذه الرسالة عدة طرق مقترحة لتحسين الإشارات وإزالة الشوشرة. الطريقة الأولى وفيها نقوم بعمل مرشح يعمل بنظام التغذية العكسية ويسمى مرشح التقاطع المزدوج وفيه تتم تهيئة المرشح عن طريق تقليل قدرة الخطأ الخارج . تستخدم هذه الطريقة بنجاح في إزالة الشوشرة العشوائية وكذلك عمل بعض التعديلات على المرشح لكي يستخدم في إزالة الشوشرة المركزة في حيز من التردد الطريقة

الثانية وهي نفس الأولى ولكن نقوم بعمل تهيئة عن طريق تقليل الترابط بين القيم الخارجية وتعطي هذه الطريقة نتائج جيدة مقارنة بالطريقة الأولى والطرق القديمة المستخدمة في المرشحات المتوائمة وخاصة في حالة النسبة بين الإشارة والشوشرة صغيرة جداً . أيضا في هذه الرسالة طريقتان مقترحتان يعتمدان على المرشحات ذات النظام الشبكي وفيها نستخدم طريقة التغذية العكسية: الطريقة الأولى: وفيها يتم عمل تهيئة للمرشح ذات النظام الشبكي عن طريق تقليل قدرة الخطأ الطريقة الثانية: وفيها يتم عمل تهيئة للمرشح ذات النظام الشبكي عن طريق تقليل الترابط بين الإشارات الخارجية من المرشح ذو النظام الشبكي الأمثلة الموجودة في هذه الرسالة توضح التحسين عند استخدام هذه المرشحات وفي النهاية نقوم باستخدام مرشحات التقاطع المزدوج لكي تعمل في ثنائي الأبعاد واستخدامها في تحسين الصور وإزالة الشوشرة منها .

Summary of Thesis

The least mean squares (LMS) algorithm is simple, robust, and is one of the most widely used algorithms in adaptive filtering. Unfortunately, it is highly sensitive to the conditioning of its input autocorrelation matrix, the higher input eigenvalue spread the slower convergence of the adaptive weights. This problem can be overcome by preprocessing the input to the filter with a fixed data independent transformation that, at least partially decorrelate the inputs. Typical transformations are the discrete Fourier transform (DFT), discrete cosine transform (DCT) ... etc. The adaptive filter updates the coefficients using LMS with normalized learning rate. In this case, the

algorithm called DFT- LMS and DCT- KMS. The objective of this work is to propose and introduce new methods for signal enhancement and apply it to image enhancement. The proposed methods used to filter out the noise part and enhance the input signal. These methods based on minimizing the output square error and minimize the cross correlation between outputs by using a feedback process in cross – coupled filter. Another proposed methods are adaptive lattice feedback line enhancer and correlation based lattice line enhancer. These methods are applied successfully for sinusoids signal corrupted with white gaussian noise and colored noise. In addition, the cross – coupled algorithms treat to work in two – dimensional manner to be used for image enhancement.

مقدم الرسالة:	نجوى محمد عمر أبو العلا
موضوع الرسالة:	تشفير المعلومات باستخدام التردد في الشبكات العصبية النابضة Frequency Coding Information in Pulse Coupled Neural Networks
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة الكهربائية
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ د / يوسف بسيوني مهدي د / سامية عبد الفتاح على د / خالد ممدوح شعبان

ملخص الرسالة

تعتبر شبكات الأعصاب الاصطناعية طرقاً حسابية مستنبطة من الذكاء الحي وتمتد تطبيقاتها إلى حل عدد من المشاكل المعقدة التي لا يمكن حلها باستخدام طرق الحساب التقليدية مثل فهم الكلام والصور ونظراً للتقدم البطيء الحالي في شبكات الأعصاب الاصطناعية وبناء على بعض المشاهدات البيولوجية ظهر اتجاه تكنولوجي جديد يسمى " الشبكات النابضة " وهذا الاتجاه يأخذ في الاعتبار الطبيعة النبضية للخلايا العصبية الحية وبهذا فهو يحاكي الخلايا العصبية الحية بدقة أكبر من شبكات الاصطناعية التقليدية بعض النماذج التي تم تقديمها في المراجع العلمية المتاحة لفهم الطبيعة النبضية للخلايا العصبية الحية كانت معقدة لا يمكن استخدامها داخل شبكة من الخلايا العصبية أو لبناء خوارزم تسجيلي فعلى سبيل المثال نموذج Morries - lecar الذي يوصف بمجموعة معادلات رياضية غير خطية يتعذر دراسة تفاعلاته داخل شبكة من الخلايا العصبية وذلك لصعوبة حل عدد كبير من المعادلات الغير خطية آنياً . أما البعض الآخر من هذه النماذج فقد أهمل ملاحظات بيولوجية هامة مثل النموذج

السزاوي الذي قدمه العالم Izhikevich والذي بني على افتراض أن الخلايا العصبية الحية لها ترددات طبيعية متساوية وهذا ليس صحيح بيولوجيا ولذا فإن هذه الرسالة تقترح نموذج للخلية العصبية الحية معدلا تقدم هذه الرسالة تحليل زمني لحالة الاستقرار للنموذج المقدم في هذا البحث داخل شبكة من الخلايا العصبية مفترضاً أن كل خلية من الخلايا العصبية الحية لها تردد طبيعي مختلف عن الأخرى ولقد تم استخدام هذا التحليل الزمني المقترح في بناء خوارزم تسجيلي عام باستخدام البرمجة الخطية واستكمالا للفهم لأداء الشبكة المقترحة تم تقديم تحليل انتقالي (احتمالي) للنظام وفي محاولة لتقليل عدد المعادلات التي يجب حلها في الخوارزم التسجيلي العام تم بناء خوارزم تسجيلي معدل يستلزم نصف عدد المعادلات المستخدمة في الخوارزم الأصلي ويعمل الخوارزيمان التسجيليان على حفظ المعلومات في شكل تزامن نبضات الخلايا العصبية التي لها مدخل خارجي له قيمة تساوي الواحد وذلك بالاستعانة بقيم التأخير الزمني للوصلات البينية للخلية العصبية فقط مع الاحتفاظ بقوة هذه الوصلات ثابتة عند نفس القيمة وتحتوي هذه الرسالة بعض الأمثلة لتوضيح مدى قدرة الشبكة العصبية المقترحة على تسجيل المعلومات كما توضح تأثير المتغيرات الخاصة بالنموذج المقدم على حالة أية خلية عصبية داخل الشبكة وكذلك تقدم هذه الأمثلة توضيحاً للفروق بين الخوارزمين التسجيليين اللذين تم بنائهما ، علماً بأن أحد هذه الأمثلة يقدم خاصية جديدة للشبكة العصبية المقترحة أسميناه عملية تجميع (ضم) المخرجات وهذه الخاصية لم يتم التوصل أو الحصول عليها باستخدام شبكات الأعصاب الاصطناعية التقليدية وتتميز هذه الخاصية باستدعاء أكثر من معلومة في نفس الوقت كلا منها مميزاً بتردد مختلف ، لقد أثبت هذا العمل البحثي أن قيم التأخير الزمني للوصلات البينية للخلية العصبية وبالتالي التردد له دور مؤثر وفعال في حفظ المعلومات .

Summary of Thesis

Artificial neural networks (ANN) are considered as biologically inspired of computing. They can solve a number of very complicated problems, which cannot be solved with the traditional computing environments such as speech recognition and image understanding. Due to the slow progress in classical ANN, and based on some biological observations, a new technology known as pulse coupled neural networks (PCNN) is evolving. It takes into consideration the spiking nature and hence models the biological neurons more accurately than classical artificial neural networks. Some of the neuron models, which have been developed to understand the pulsating nature of neurons, were too complicated (e.g., morries – lecar model) to be used in a network of neurons or to develop recording algorithm for them. Other models had ignored important biological features such as Izhikevich phase model. This thesis proposes a new neuron model, which is a modification of the integrate and fire model. It captures more of the temporal property of the biological cell. A steady state time analysis is provided for a network of the proposed neurons assuming that the neurons have independent inter – spiking frequencies. The time analysis is used to construct general recording algorithm using linear programming. A transition analysis (probabilistic analysis) for the system has been investigated in order to fully understand the behavior of the network. In order to

reduce the number of equations used by the general recording algorithm an enhanced one is developed. The two algorithms store information in a form of spiking synchronization of the neurons that have an external input of one through changing their interconnection delays only while keeping their interconnection weights fixed to the same value. Some illustrative examples are given to show the network capacity and to illustrate the effect of the model parameters on the state of the network neurons. Also, the given examples demonstrate the differences between the two proposed recording algorithms. Moreover one of the given examples illustrates a new feature that the proposed network exhibits. This feature we called the output grouping ability, which could not be achieved with classical ANN. This feature allows recalling more than one pattern simultaneously and distinguishing their components based upon frequency. The main contribution of this thesis is the proof that the neurons interconnections delays and hence their spiking frequencies have a significant role in storing information in biological networks.

مقدم الرسالة:	عاصم محمد أحمد
موضوع الرسالة:	'التحكم الذكي في مسار محرك تيار مستمر' Intelligent Tracking Control of A.D.C. Motor
الكلية والقسم:	كلية الهندسة - قسم الهندسة الكهربائية
تأريخ المنع:	٢٠٠٢/١٢/٢٩ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د / عوض ابراهيم صالح د / نبيل عبد الجيد محمد د / طارق كمال عبد الحميد

ملخص الرسالة

تقدم هذه الرسالة تحليلاً لتصميم وبناء العديد من الحاكومات الذكية والتي استخدمت للتحكم في مساري السرعة والزاوية لمحرك تيار مستمر . تقنيات التحكم الذكي المستخدمة هي المنطق الغيمي والشبكات والتقنية العصبية الغيمية وحيث ان تقنية التحكم الذكي لا تتطلب معرفة المعادلات الرياضية الواصفة للنظام استخدم محرك تيار مستمر كنموذج لنظام مجهول المعاملات والرسالة تقدم دراسة نظرية ومعملية للمقارنة بين طرق مختلفة للتحكم الذكي في سرعة وزاوية محرك التيار المستمر . في البداية نقدم المفاهيم الأساسية للمنطق الغيمي . ثم استخدمنا المنطق الغيمي في تصميم حاكم استخدم للتحكم في مساري السرعة والزاوية وقد أعطيت النتائج العملية للمسارات المختلفة في حالي السرعة والزاوية وتم تقييم كفاءة الحاكم الغيمي المستخدم بحساب متوسط مربع الأخطاء لستمائة عينة في المسار الواحد . ثم نقدم في الفصل التالي ملخصاً شاملاً عن الشبكات العصبية الصناعية وفي هذا الفصل نستخدم الشبكات العصبية في بناء نموذج يحاكي الديناميكية العكسية لنظام محرك التيار المستمر المستخدم . ثم يستخدم ذلك النموذج كحاكم أمامي في هيكل التحكم العكسي المباشر

لتوليد جهد الدخل المناسب للمحرك لينتبع مسارات محددة مسبقا للسرعة والزاوية ولتحقيق درجة عالية من الدقة في عملية التحكم تم إمداد النظام ببرنامج لتعليم الحاكم أثناء التشغيل وقد أعطيت النتائج العملية للمسارات المختلفة في حالتى السرعة والزاوية وتم تقييم كفاءة حاكم الشبكة العصبية المستخدم بحساب متوسط مربع الأخطاء لستمانية عينة في المسار الواحد . في الفصل الرابع نقدم المفاهيم الأساسية للتقنية العصبية الغيمية وفى هذا الفصل نستخدم التقنية العصبية الغيمية لتحل محل تقنية الشبكات العصبية في هيكل التحكم العكسي المباشر العديد من المسارات إستخدمت في توضيح كفاءة حاكم التقنية العصبية الغيمية وتم تقييم كفاءة حاكم التقنية العصبية الغيمية المستخدم أيضا بحساب متوسط مربع الأخطاء لستمانية عينة في المسار الواحد . فى الفصل الخامس نقدم بالنتائج العملية تقيما لتقنيات التحكم الذكي المختلفة المستخدمة فى عملية التتبع الموضحة فى الفصول السابقة . توضح النتائج العملية جودة الحاكم المستخدم للتقنية اعصبية الغيمية بالمقارنة مع باقى الحاكمات الذكية المستخدمة فى هذه الرسالة .

Summary of Thesis

This thesis describes the design and implementation of various intelligent controllers, which are used in tracking control of speed and position of a D-C motor. The intelligent control system techniques used are fuzzy logic, neural networks and neurofuzzy. We use the D-C motor system (D-C motor, amplifier, transducers, and load), as a model to represent an unknown plant. While most intelligent controller's effectiveness is proven only using simulation, we aim in this thesis to compare fuzzy logic neural networks and neurofuzzy

controllers experimentally. First, we present the fundamental concepts of fuzzy logic. We, then use the fuzzy logic to design a controller for speed and position tracking control. Experimental result for speed and position tracking, in case of different trajectories are presented. The accuracy of the proposed fuzzy controller is evaluated using the mean squared error. Then, we present a comprehensive review for artificial neural networks. We, then use the neural networks to identify the inverse of system (D-C motor, amplifier, and load) dynamics. We, then use this inverse model as a feedforward controller in a fixed stabilizing controller scheme to generate the input voltage for the motor to follow a pre-selected trajectories in speed and position. For precise control, an on-line learning algorithm is introduced. Experimental results for speed and position tracking, in case of different trajectories are presented. The accuracy of the proposed neural controller is evaluated using the mean squared error. After that, we present the neurofuzzy basic concepts. We, then use the neurofuzzy technique to replace the neural network in the fixed stabilizing controller scheme. Different trajectories are applied in order to illustrate the capability of the proposed neurofuzzy controller. Finally, we present an experimental evaluation of the different intelligent control techniques for tracking used in the previous chapters. The experimental results seem to indicate the goodness of neurofuzzy controller in comparison with the other intelligent controllers used in this thesis.

قسم

الطبيب

المعاري

أحمد محمد رفعت مصطفى	مقدم الرسالة:
دراسة الاعتبارات التصميمية لمحور الإقتراب إلى المجموعات المعمارية بالمدينة المصرية (مدينة أسيوط كمثال) Studying the Design Aspects of Approach Axis to Building Groups in the Egyptian City "the Case of Assiut City"	موضوع الرسالة:
كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١/٢٠ م (ماجستير)	تاريخ المقم:
أ.د / محمود أحمد عبد اللطيف أ.د / مجدي محمد رضوان د / مسدوح علي يوسف	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تمثل محاور الإقتراب مسارات الحركة بالمدينة بمختلف أنماطها ، وينصب مفهوم محاور الاقتراب على الدراسة البصرية لهذه المسارات وكيفية الإدراك البصري للتكوينات الحضرية والمعمارية المحددة لها . ومن هنا تتبع أهمية محاور الإقتراب في تكوين الصورة الذهنية الشاملة للمدينة والتي تعكس طابع المدينة وشخصيتها لدى المتحريكين عبر هذه المحاور . يهدف البحث إلى محاولة الإجابة عن سؤال محوري: ماهي الاعتبارات التصميمية لمحاور الاقتراب؟ وللإجابة عن هذا السؤال فقد اتبع البحث عدة مراحل للوصول إلى هدف البحث وهي: التنظير لمحاور الاقتراب بهدف التعرف على عناصر ومفردات تلك المحاور وخصائصها وأنواعها المختلفة. تحليل عدد من محاور الاقتراب للمباني الهامة في الحقب التاريخية (الكلاسيكية - الوسطى) من خلال منهج مقترح للوقوف على الاعتبارات التصميمية التي حكمت تصميم هذه المحاور.

دراسة العوامل المستجدة على تصميم محاور الاقتراب وما نجم عنها من متطلبات تصميمية و أنماط مستحدثة واستخلاص الاعتبارات التصميمية الخاصة بكل نمط ، رصد واستقراء لمحاور الاقتراب بمدينة أسبوط (مثال للمدن المصرية) من خلال تطبيق منهج التحليل المقترح للوقوف على أوجه القصور في تصميم محاور الاقتراب بالمدينة المصرية وسبل الارتقاء بها ، وتخلص الدراسة إلى مجموعة من المفاهيم الأساسية وعدداً من التوصيات التي تهدف إلى وضع اعتبارات وأسس تصميمية لمحاور الاقتراب والسبل التي تكفل الارتقاء بمحاور الاقتراب القائمة .

Summary of Thesis

Approach axes represent the movement paths in the city with their different types, the concept of approach axes focuses on the visual study of these paths and how to visually perceive the urban and architectural forms determining them. From this point rises the importance of approach axes in making the overall mental image of the city which reflects the city style and character as seen by those who move along these axes. The thesis aims at attempting to answer an essential question: What are the design aspects of the approach axes ?.

To answer this question the thesis followed several stages to reach the goal, which are: The study aims at establishing a theoretical basis for the approach axes in order to identify the elements and objects of these axes, their characteristics and various types. The study analyzes a number of approach axes to the important buildings

in historical eras (Classic and Middle Ages) through a proposed methodology to take hold of the design aspects that governed the design of the axes. Studying the new factors that affect approach axes design with their imposed design requirements and new types; then concluding with the design aspects for each type. Tracing and interpreting the approach axes of Assiut (an example of Egyptian cities) by applying the proposed method of analysis, to determine the deficiencies in the design of approach axes in Egyptian cities and how to improve them. The thesis concludes a number of basic concepts and recommendations; that aim at establishing the design aspects and principles of the approach axes; and the ways that enables improving the existing axes of approach.




كلية الزراعة

**بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير
بكلية الزراعة جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠٢**

درجة الماجستير			البيان
أجمالي	طالبة	طالب	
١	٠٠	١	أراضي ومياه
١	٠٠	١	امراض نبات
١	٠	١	الاقتصاد الزراعي
١	٠٠	١	الألبان
٤	٠٠	٤	الإنتاج لحيواني
١	٠٠	١	إنتاج دواجن
١	١	٠٠	بساتين { خضر }
٢	١	١	بساتين { فاكهة }
٢	١	١	المجتمع الريفي والإرشاد الزراعي
٣	٠٠	٣	المحاصيل
١	٠٠	١	الوراثية
١٨	٣	١٥	الإجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الزراعة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢



قسم

الارضى وحيه

مقدم الرسالة:	أحمد جلال أحمد صالح الغرابلي
موضوع الرسالة:	'استجابة الذرة والقمح بالتسميد بمخاليط من بعض مخلفات صناعة السكر' Response of Corn and Wheat to Fertilization with Mixtures of Certain Sugar Industry Wastes
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم الأراضي والمياه
تاريخ الملص:	٢٠٠٢/٣/٣ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د/ محمد فتحي غنيم د/ حسنين جمعة حسنين د/ كمال كامل عطية

ملخص الرسالة

أجريت أربع تجارب حقلية بمحطتي البحوث في نجع حمادي وأسيوط بهدف دراسة أثر استخدام ١٢ مخلوط سمادي مصنعة من مخلفات صناعة السكر (طينة المرشحات والفيناس ورماد المراجل) علي نباتات الذرة الشامية وكذلك دراسة الأثر المتبقي لهذه المخاليط السمادية علي إنتاجية القمح كما درست أثر هذه المخاليط علي التركيب العنصري (النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز والزنك والنحاس) لهذه المحاصيل بجانب دراسة أثرها علي المحتوى العنصري للتربة في الموقعين ٠ وقد أجريت هذه التجارب خلال موسمي ١٩٩٨/١٩٩٩ في نجع حمادي (أرض طينية رملية) و ١٩٩٩/٢٠٠٠ أسيوط (أرض طينية) ومن النتائج المتحصل عليها أمكن معرفة الأثر الإيجابي لاستخدام هذه المخاليط علي إنتاجية هذه المحاصيل مقارنة بما هو مستخدم بمعرفة المزارعين ٠ كما اتضح من الدراسة زيادة تركيز

العناصر الغذائية في نباتي الذرة والقمح بالموقعين نتيجة لاستخدام هذه التراكيب بجانب
أثرها الإيجابي على محتوى التربة من العناصر الغذائية تحت الدراسة .

Summary of Thesis

Four field experiments have been carried out in two in two different locations (Nagaa Hamdy and Assiut) using sandy clay and clay soil to study the effect of the organo – mineral fertilizer mixtures, made from filter mud cake, vinasse and bagasse ash. Corn and wheat plants were used as test crop in both to study the effect of these organo-mineral fertilizers on plant yield and nutrient concentrations as well as nutrient contents in the soil after corn; and wheat cultivation. These trials have been carried in season 98/1999 in Nagaa Hamdy and 99/2000 in Assiut. The obtained results showed that the use of the mixtures significantly increased the yield, of both corn and wheat in comparison what is traditionally used by farmers. Also, there were clear increases of nutrients concentrations in both plant and soil of both crops and sites.

قسم

أعراض النبات

مقدم الرسالة:	جمال علي أحمد محمد
موضوع الرسالة:	'دراسات على أمراض الذبول وعفن الجذور في الترمس' Studies on Wilt and Root Rot Diseases of Lupin
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم أمراض النبات
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/٦/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد سامي محمد (مشرف رئيسي) أ.د./ فرج أحمد سعيد د./ محمد حسن عبد الرحيم

ملخص الرسالة

أجري هذا البحث بهدف دراسة المسببات المرضية لمرض عفن الجذور والذبول في الترمس وكذلك دراسة بعض العوامل التي تؤثر علي شدة الإصابة وهي :تأثر أصناف الترمس ومدي قابليتها للإصابة بالمسبب المرضي (الفيوزاريوم) ، تأثير المحاصيل السابقة علي قابلية الترمس للإصابة بالذبول في الحقل والصوبه الزراعية ، تأثير تعداد كلاً من فطر الفيوزاريوم سامبيوتينم وبكتريا الباسيلس ستلس بالمحاصيل السابقة لزراعة الترمس بالنسبة للفطر الممرض ، تأثير نمو الميسليوم وإنبات جراثيم الفطر الممرض بإفرازات جذور المحاصيل التي تسبق الترمس في الزراعة وكذلك نمو فطر تراكودرما هارزينام وبكتريا باسيلس ستلس في الأظباق ، تحليل الأحماض الأمينية المتواجدة في إفرازات الجذور لأصناف الترمس وتأثيرها علي نمو وإنبات جراثيم الفطر الممرض، طرق المقاومة الحيوية لمرض عفن الجذور والذبول للترمس.

Summary of Thesis

The present work was planned to study the incidence of lupin root rot and wilt diseases in Assiut Governorate: Reaction of lupin cultivars against *Fusarium sp.* isolates, effect of previous crops on incidence of lupin wilt in greenhouse and field, effect of previous crops on population of *Fusarium sambucinum* and *Bacillus subtilis*, effect of root exudates of certain crops on growth and spore germination of the pathogen and growth of certain bioagent in vitro, amino acids content of root exudates of lupin and their effect on spore germination of the pathogen, biological control of the root rot and wilt of lupin.

قسم

الاقتصاد الزراعي

مقدمة: مقدم الرسالة:	حسين محمود علي منشحات
موضوع الرسالة:	"اقتصاديات إنتاج قصب السكر في الأراضي المستصلحة (دراسة حالة)" Sugar Cane Production Economics in Reclaimed Lands: A Case Study
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم الاقتصاد الزراعي
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١٢/٢٩ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	المرحوم أ.د/ محمد عبد الحليم زكي أ.د/ محمد رجاة الأمير أ.د/ علي عبد الجليل عيسى (مشرف رئيسي)

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى دراسة حالة عن المزرعة الآلية بوادي خريت بكوم أمبو محافظة أسوان والتابعة لمصنع سكر كوم أمبو والتي تقوم بزراعة محصول قصب السكر في أراضي مستصلحة، وتقوم بإجراء التجارب العلمية بالاشتراك مع الجهات البحثية والعلمية. ودراسة اقتصادية إنتاج هذا المحصول في الأراضي المستصلحة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في هذا الشأن، وعليه أوصت بضرورة استخدام طرق الري السطحي المطور في ري محصول القصب لترشيد مياه الري وأوضحت أن أفضل هذه النظم اقتصادياً هو نظام الري بالتنقيط. أما بالنسبة للمزارع العادي فقد أوصت الدراسة باستعمال طرق الري السطحي المطور لانخفاض تكاليفه وسهولة الصيانة والتشغيل، وفي مجال التسميد أوصت الدراسة باستعمال حوالي ٢٤٠ وحدة آروت للفدان وبالنسبة للتسميد الفوسفاتي يفضل استعمال ٣٥ وحدة من خامس أكسيد الفسفور للفدان مع عدم استخدام السماد البوتاسي لعدم جدواه الاقتصادية في أراضي الاستصلاح

ففي صعيد مصر. كما أوصت الدراسة بمحاولة خفض التكاليف المتغيرة وأهمها
المستلزمات الخدمية ثم المستلزمات السلعية والتي تشكل أهم بنود التكاليف بالمزرعة
وأكثرها تأثيراً على الإيراد الكلي.

Summary of Thesis

The objective of this study is shed light on the production economics of a newly reclaimed and mechanized farm in Aswan Governorate. This study used the relevant information generated in the experiment undertaken by the soil and water dept. collage of agriculture, Assiut University in Egypt. The current study used the descriptive and quantitative techniques. In particular, the production functional approach, coast functions, general trends and regression analysis. The study reached some recommendations pertaining to optimum irrigation techniques of sugar cane, fertilization rates for nitrogen phosphorus and potassium in upper Egypt.

قسم

البيان

مقدم الرسالة:	محمد فرغلي يونس
موضوع الرسالة:	دراسة علي بعض العوامل الكيماوية والطبيعية المؤثرة علي منحنى نمو بكتريا حامض اللاكتيك في اللبن A Study of Some Chemical and Physical Factors Affecting the Bacterial Growth Curve of Lactic Acid Bacteria in Milk
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم الألبان
تاريخ المسم:	٢٠٠٢/٧/٢٨ > ماجستير<
لجنة الإشراف:	أ.د./ محمد عطية مهران أ.د./ علي إسماعيل حسن د./ نور الهدي حنفي محمود

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة بغرض التعرف علي مدي تأثير بعض العوامل الكيماوية والفيزيائية علي نمو بكتريا حمض اللاكتيك (LAB) حيث استخدمت سلالة (*Lactococcus lactis subsp lactis*) مع استخدام اللبن الكامل المجفف المسترجع كبيلة قياسية وظهر أن كل من الطور التمهيدي والعدد النهائي للبكتريا المختبرة وزمن تجبن اللبن المستخدم تأثر بدرجة معينة بكل من نوع البيئة والنشاط المائي وحجم اللقاح المستخدم ودرجة حرارة التحضين. وكذلك تؤثر العوامل المختبرة علي كل من تطور الحموضة ودرجة الـ pH وظهر أن أقل زمن لتجبن اللبن كانت ٨ ساعات عند التحضين علي درجة ٣٥ م أقصي مدي كانت ١٩ ساعة عند التحضين علي درجة ٢٠ م كما أن إضافة ١% كلوريد الصوديوم كان له تأثير طفيف علي كل من العدد النهائي وتطور الحموضة ودرجة الـ pH.

Summary of Thesis

This study was carried out to investigate the effect some chemicals and physical factors on the growth kinetics of LAB in reconstituted spray dried milk medium. It was found that lag time, maximum cell population and coagulation time of used milk had been significantly affected by medium type water activity (a_w), inoculum size and incubation temperature. Development of titratable acidity (DTA) and PH reduction were affected also by the examined factors. It was obtained that the minimum time for milk coagulation was 8 hr at 35°C. The addition of 1% sodium chloride slightly affected the CFU/ml, DTA and that rate of pH reduction.

قسط

الانتقام الحيواني

مقدم الرسالة:	ايهاب كامل نان رشيد
موضوع الرسالة:	* دراسة بعض العوامل المؤثرة علي أداء الأغنام الأوسيمي والصعيد تحت ظروف مصر العليا A Study of Some Factors Affecting Ossimi and Saidi Sheep Performance Under Upper Egypt Conditions
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم الإنتاج الحيواني
تاريخ المسم:	٢٠٠٢/١/٢٠ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ فيصل فرحات الحمصي د/ محمد نصرت محمود عبد العاطي

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى دراسة بعض العوامل المؤثرة علي أداء الأغنام ألا وسيمي والصعيد في قطعان مزوعة الأغنام - التابعة الي قسم الإنتاج الحيواني والدواجن - كلية الزراعة جامعة أسيوط . تم تجميع البيانات من سنة ١٩٨٥ م وقد بلغ عدد السجلات ٧٣٤ سجلا تم تجميعها من ١٨١ نعجة أوسيمي ، عدد ٥٥٣ نعجة صعيد (من سجلات المواليد) و ٢٥٩ سجلا ، تم تجميعها من ٨٢ حمل أوسيمي ، ١٧٧ حمل صعيد (من سجلات الفطام) ، وقد شملت الدراسة بعض العوامل المؤثرة علي أداء الأغنام وكانت هذه العوامل هي: النوع - جنس المولود - نوع المولود - الموسم - وزن الأم ومدي تأثيرها علي: وزن الميلاد - وزن الفطام - الزيادة اليومية في الوزن - نسبة الحيوية ، وقد أوضحت الدراسة النتائج التالية :كان تأثير موسم الولادة معنوي علي وزن الميلاد بينما لا يوجد تأثير للنوع أو الجنس أو نوع المولود أو وزن الأم - ، كان التأثير معنوي علي وزن الفطام وبين النوع ووزن الأم بينما كان غير معنوي

التأثير في الجنس ونوع المولود وموسم الولادة ، من حيث الزيادة اليومية كان للنوع تأثير معنوي وكذلك نوع المولود فكان المولود الفردي أعلى في الزيادة اليومية عن الحملان المولودة توأسم بينما لا يوجد تأثير معنوي لكل من الجنس وموسم الولادة ووزن الأم - كان تأثير نوع المولود معنوي جدا علي نسبة الحيوية عند اعمار ٣٠ ، ١٢٠ ، ٣٦٥ يوم وغير معنوي عند الميلاد بينما كان النوع والجنس وموسم الولادة ليس لهم تأثير معنوي .

Summary of Thesis

This study was carried out during the 11 years from 1985 to 1995 at the experimental farm, department of animal land poultry production, Assiut University in order to study some factors that affecting Ossimi and Saidi sheep. The obtained results are summarized in the following: Ossimi lambs at birth tended to be heavier than Saidi ones ($2.796 + 0.035$ vs. $2.791 + 0.020$). Male lambs were heavier than female at birth (2.81 vs. 2.77 kg) and were not differed significantly. Single-born lambs were heavier weight than twin-born lambs not only at birth but also at weaning and had higher average daily gain weight. Season of lambing was an important factor that affect birth weights of lambs which born in winter were heavier in birth weight and weaning weight, which is resulted from the higher daily gain, than those born during summer season. Twins were of the lower survival rate than singles. The possible causes of deaths were classified into Low birth weight, bad weather lambing, low milk intake, disease.

مقدم الرسالة:	أحمد محمد عبد الله
موضوع الرسالة:	أداء الحملان الأوسيمي تحت نظم الرعاية المختلفة خلال فترة التسمين*
	Performance of Ossimi Lambs Under Different Managerial Systems During Fattening Period
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم الإنتاج الحيواني
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٤/٢٨ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / فيصل فرحات الحص د. / محمد نصرت محمود عبد العاطي د. / سيف اليزل فتحي عباس

ملخص الرسالة

انقسمت الدراسة الحالية إلى قسمين أساسيين ، حيث تم إجرائهما في المزرعة البحثية بقسم الإنتاج الحيواني والدواجن ، كلية الزراعة جامعة أسيوط خلال الفترة من أبريل ١٩٩٩ وحتى يناير ٢٠٠٠. اشتمل القسم الأول على دراسة تأثير كل من طول فترة الإضاءة (إضاءة طويلة 8D:16L وإضاءة قصيرة 16D:8L) ونظام المساكن (المساكن الجماعية والمساكن الفردية) على كمية الغذاء المأكولة ، كمية الماء المستهلكة ، وزن الجسم ، معدل الزيادة اليومية ، كفاءة التحويل الغذائي وتركيز كل من الجلوكوز واليوريا والكورتيزول بدم حملان الأوسيمي. ولقد تضمن القسم الثاني المقارنة فيما بين نظام التغذية حتى الشبع والتغذية المقننة مع عدد مختلف من مرات التغذية (مرة ، مرتين وثلاث مرات في اليوم) وتأثير ذلك على كمية الغذاء المأكول ، كمية الماء المستهلكة ووزن الجسم ، ومعدل الزيادة اليومية ، وكفاءة التحويل الغذائي وتركيز كل من الجلوكوز واليوريا بدم حملان الأوسيمي. التجربة الأولى: أدت المعاملة

يكل من فترة الإضاءة الطويلة والمساكن الجماعية إلى زيادة معنوية في كل مكن كمية الغذاء المأكولة ، وزن الجسم ، معدل الزيادة اليومية وتركيز كل من الجلوكوز واليوريا في دم الحملان ، وعلى العكس أدت إلى انخفاض في تركيز الكورتيزول في الدم وأدت المعاملة بالمساكن الفردية إلى زيادة كمية الماء المستهلك ونفس النتيجة تم التحصل عليها عن طريق المعاملة بفترة الإضاءة الطويلة. ٢- التجربة الثانية: أدت الزيادة في عدد مرات التغذية من مرة إلى مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم إلى زيادة معنوية في كمية الغذاء المأكولة ، كمية الماء المستهلكة ، وزن الجسم ، معدل الزيادة اليومية ، كفاءة التحويل الغذائي وكذلك زيادة في تركيز كل من الجلوكوز واليوريا في دم الحملان.

Summary of Thesis

The present study was compartmentalized into two main compartment. They were performed in the farm of animal and poultry production department, Faculty of Agriculture, Assiut University during the period from April 1999 to January 2001. Results of summarized in the following: 1- The first experiment: Long photoperiod and group housing increased feed intake of lambs, body weight, daily gain and glucose, urea concentration but decreased blood cortisol concentration. But individual housing increased water intake, also long photoperiod increased water intake. 2- The second experiment: Increasing feed frequency from once to twice to thrice per day increasing feed intake, water consumption, body weight, daily gain and concentration of urea and glucose in blood of lambs.

مقدم الرسالة:	جمال بدري أبو الوفا محـــــــمود
موضوع الرسالة:	* بعض الخصائص التناسلية في الأغنام الصعيدي وتأثرها بمستويات الغذائية من الطاقة والبروتين Some Reproductive Characteristics in Saidi Ram Lambs as Affected by Feeding Different Levels of Energy and Protein
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم الإنتاج الحيواني
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/٥/٢٦ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ إبراهيم عبد الرازق سالم أ.د./ حسن عبد الغني دغش د./ أنس أحمد العريــــي

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة بالمزرعة البحثية ، بقسم الإنتاج الحيواني ، كلية الزراعة جامعة أسيوط ، في خلال الفترة من ٢٠٠٢/٢/١٩ حتى ٢٠٠٢/٦/١٨م وكان الهدف دراسة تأثير مستويات مختلفة من البروتين والطاقة على البلوغ الجنسي ووزن الجسم ومقاييس الجسم وأيضاً دراسة تأثير كل من مستويات التغذية المختلفة من البروتين والطاقة واختلاف فصول السنة على مقاييس الخصية وصفات السائل المنوي. استخدم في هذه الدراسة ١٦ حمل من الأغنام الصعيدي في عمر (٧-٨ شهور) وقسمت إلى أربع مجاميع ، وغذيت على بروتين منخفض وطاقة منخفضة ، بروتين مرتفع وطاقة منخفضة ، بروتين منخفض وطاقة مرتفعة ، بروتين مرتفع وطاقة مرتفعة. أظهرت النتائج أن العمر عند البلوغ كان مبكراً بالنسبة للحملان التي تغذت على مستوى مرتفع من البروتين ومنخفض من الطاقة والتي تغذت على مستوى منخفض من البروتين

ومرتفع من الطاقة مقارنة بالحملاان التي تغذت على مستوى مرتفع من البروتين والطاقة والتي تغذت على مستوى منخفض من البروتين والطاقة. أدت التغذية على مستوى مرتفع من البروتين والطاقة وعلى مستوى مرتفع من البروتين ومنخفض من الطاقة إلى ارتفاع صفات السائل المنوي مقارنة بالأغنام التي غذيت على مستوى منخفض من البروتين ومرتفع من الطاقة وعلى مستوى منخفض من البروتين والطاقة. أدت التغذية على مستوى منخفض من البروتين والطاقة على انخفاض الأداء التناسلي في الأغنام الصعيدي. أظهرت النتائج أن أعلى قيم لصفات السائل المنوي تصل في فصلي الربيع والخريف .

Summary of Thesis

This study was carried out in Experimental Farm of Animal Production Department, Faculty of Agriculture, Assiut University. The study was started from 19th February 2000 to 18th June 2001. A total number of sixteen Saidi ram lambs of about 7-8 month of age were divided into four groups. Low protein low energy (LL), high protein low energy (HL), low protein high energy (LH) and high protein high energy (HH). The results obtained are summarized in the following conclusion: Rams fed on high protein low energy or low protein high energy diets reached to the puberty earlier than those fed on high protein high energy or low protein low energy ones. In addition, rams fed high protein high energy and high protein low energy had significant higher in semen characteristics than those fed

on low protein high energy and those fed on low protein low energy diets. Low protein low energy diet had an adverse effect on reproductive performance of Saidi rams. High quality of semen characteristics during spring and autumn.

مقدم الرسالة:	أيمن يوسف محمد أحمد كساب
موضوع الرسالة:	"التداخل بين المعاملة بالبروجسترون ومستوي التغذية على الأداء التناسلي في الأغنام الصعدي" The Interaction Between Progesterone and Level of Nutrition on Reproductive Performance of Saidi Ewes
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم الإنتاج الحيواني
تاريخ المقدم:	٢٠٠٢/٧/٢٨ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ إبراهيم عبد الرازق سالم د/ جمال محمود أحمد سلامة

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة في مزرعة بحوث قسم الإنتاج الحيواني ، كلية الزراعة جامعة أسيوط. الغرض من هذه التجربة هو دراسة تأثير مستوي التغذية وهرمون البروجسترون علي الأداء التناسلي ووزن الجسم وحجم الضرع وسمك الجلد والصفات الفسيولوجية ومكونات الدم. استخدم في هذه الدراسة ٥٠ من النعاج الصعدي عمر ٤ -٦ سنوات تم تقسيمها إلي مجموعتين: مجموعة غذيت علي العليقة الحافظة ، والأخرى غذيت علي ضعف العليقة الحافظة. وقسمت كل مجموعة إلي تحت مجموعتين أحدها حققت بالبروجسترون والأخرى استخدمت كنترول. وقد أظهرت الدراسة أن الحقن بهرمون البروجسترون والتغذية علي ضعف العليقة الحافظة أدت إلي زيادة في معدل الحمل والولادات ووزن الجسم للنعاج والمواليد. الحقن بهرمون البروجسترون أدت إلي زيادة في درجة حرارة المستقيم. عدم الحقن بهرمون البروجسترون أدت إلي زيادة معنوية ($P<0.01$) في تركيز الجلوكوز سواء عند التغذية علي العليقة الحافظة

أو ضعف العليقة الحافظة.التغذية علي ضعف العليقة الحافظة أدت إلي زيادة معنوية ($P<0.01$) في تركيز هرمون الثيوركسين والهرمون ثلاثي اليود للنعاج. الحقن بهرمون البروجستيرون أدت إلي زيادة في تركيز هرمون البروجستيرون سواء عند التغذية علي العليقة الحافظة أو ضعف العليقة الحافظة. التغذية علي ضعف العليقة الحافظة والحقن بهرمون البروجستيرون أدت إلي زيادة في سمك الجلد وحجم الضرع مقارنة بباقي المعاملات.

Summary of Thesis

This study was carried out at the animal experimental farm, animal production department, Faculty of Agriculture, Assiut University. The objective of the present study was to investigate the effect of level of nutrition and progesterone injection on reproductive performance, blood constituents, body and birth weight, physiological parameters, skin thickness and udder volume. In this experiment, fifty Saidi ewes of about 4-6 years allotted to two groups, a control group fed M and a treated group fed 2M. each group divided to two subgroup and injected or non injected with progesterone hormone. The results obtained are summarized in the following: Ewes fed 2M and injected or non injected had higher conception and lambing rates, birth weight and body weight compared with other treatments. Ewes injected with progesterone had higher rectal temperature than the non injected ewes. Ewes fed 2M and non injected with progesterone had higher ($P<0.01$) glucose concentration compared with other treatment.

Ewes fed 2M had higher ($P<0.01$) T_3 and T_4 concentrations than that of M group. Ewes injected with progesterone of group M or 2M and higher progesterone concentration than that non injected. Ewes fed 2M and injected with progesterone hormone had higher skin thickness and udder volume compared with other treatment.

قسم

إنتاج الواجب

مقدم الرسالة:	عبد الله حسن حسين علي
موضوع الرسالة:	الأداء التناسلي لإناث الأرانب وخلفتها والمحقونة بهرمون (HCG) تحت ظروف أسبوت المناخية Reproductive Performance in Female Rabbits and Their Offspring Injected with Human Chorionic Gonadotrophin Under Assiut Environmental Conditions
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم إنتاج الدواجن
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/٩/٢٩ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ حاتم يوسف الحمادي أ.د/ سمير يوسف حسين د/ محمود علي عبد النبي

ملخص الرسالة

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثيرات المعاملة بـ ٥٠ وحدة دولية من هرمون (HCG) علي بعض الصفات التناسلية والإنتاجية لإناث الأرانب من نوعي البوسكات والكاليفورنيا خلال فترتي ما قبل وبعد النضج الجنسي لتحقيق أحسن أداء للإناث تحت الظروف البيئية السائدة في مصر العليا (محافظة أسبوت). من عمر شهرين إلى ٥ شهور، تم حقن الأرانب في مجموعة المعاملة بكل نوع في العضل بـ ٥٠ وحدة دولية من هرمون (HCG) بواقع مرة أسبوعياً، بعد ذلك تم حقن الإناث في العضل قبل التلقيح الإجمالي بـ ٥٠ وحدة دولية (HCG)، بينما حقنت إناث الكنترول بـ ١ مل محلول ملحي. أظهرت النتائج المتحصل عليها أن معاملة إناث الأرانب بـ ٥٠ وحدة دولية (HCG) حسنت بمعنوية وزن الجسم والزيادة في وزن الجسم، بينما حسنت

وبدون معنوية كل من عدد التلقيحات اللازمة للحمل ومعدل الحمل وحجم الخلفة ووزن الخلفة والزيادة في وزن الخلفة ووزن الأرنب النامي والزيادة في وزن الأرنب النامي.

Summary of Thesis

The objective of this study was to investigate the treatment effects of 50 I.U. human gonadotrophin (HCG) on some reproductive and productive traits in California and Bouscat female rabbits, during pre- and post-sexual maturity to achieve the optimum performance of rabbits under the environmental conditions prevailing in upper Egypt (Assiut). From two to five months old, animals in the treatment group of each breed were injected immediately with 50 I.U. HCG once a week then does were intramuscularly injected immediately before force mating with 50 I.U. HCG, while the control females were injected with 1 ml saline solution. The obtained results showed that the treatment of female rabbits with 50 I.U. HCG improved significantly body weight and body weight gain, while it improved insignificantly their number of services per conception, conception rate, litter size, litter weight, litter weight gain bunny weight, and bunny weight gain.

قسم

بساتین { فطر }

مقدم الرسالة:	شرين حسين علي
موضوع الرسالة:	'محصول وجودة الخرشوف المنزوع بطريقه مختلفه للإكثار في أسبوط' Yield and Quality of Globe Partichoke Grown by Different Propagation Methods in Assiut
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم بساتين (خضر)
تاريخ المنع:	٢٨/٧/٢٠٠٢ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / محمد فؤاد محمد د. / أيمن قطب

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة في محطة البحوث الزراعية لكلية الزراعة بجامعة أسبوط خلال عامي ١٩٩٩/٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠/٢٠٠١ وتضمنت الدراسة ثلاث طرق مختلفة للإكثار الخضري وثلاث مسافات زراعية مختلفة أظهر تحليل التباين إلي حدوث معدل أعلي لغياب الجور في الشتلات مقارنة بالخلفات أو قطع الأمهات بينما لم تكن المسافة الزراعية مؤثرة في غياب الجور ولم يلاحظ وجود أي اختلافات في عدد الأيام من الزراعة وحتى بداية جمع النورات في أي من معاملات طرق الإكثار أو مسافات الزراعة. إضافة إلى هذا لم تكن أي من المعاملات السابقة مؤثرة في وزن النورة الواحدة أو طول النورة أو قطري النورة علي حين أنتجت القطع والفواصل عدد أكبر من النورات ووزناً إجمالياً لهذه النورات أكبر من تلك النباتات المنتجة من الشتلات أما فيما يتعلق بمسافات الزراعة فكانت الزراعة علي مسافة (٦٠ سم) إما مساوية لعدد النورات عند الزراعة علي (٨٠ سم) أو أفضل منها أحياناً بينما كانت دائماً الزراعة علي مسافة (١٠٠ سم) أقل في عدد النورات والوزن الإجمالي للنورات. إلا أنه عندما

استخدم نسبة الجور الناجحة كعامل متغير في تحليل التباين الذي ذلك إلى إزالة الفروق الموجودة بين الشتلات والفسائل في عدد النورات ووزنها الإجمالي إلا أن قطع الأمهات ظلت متفوقة على طريقتي الإكثار الآخرين.

Summary of Thesis

Plant stand are artichoke (*Cynara scolymus*) was not affected by Intra-row spacing. However, a significant reduction occurred in the stand of artichoke grown by transplants as compared to the offshoots and stumps neither the propagation methods nor the Intra-row spacing significantly affected the earliness of the head production and the average head weight, length and diameter. On the other hand, stumps and offshoots derived plants produced larger number of heads than transplants. Increased number of heads were obtained from growing at 60 or 80 cm when compared with 100 cm. Covariance analysis based on use of the plant stand as covariate, suggested that no significant existed in the number of the produced heads between off-shoots and transplants. However, stumps derived plants remained producing more heads than both offshoots and transplants.

قسم

بساتین { فاکٹری }

مقدم الرسالة:	ابنسام أحمد محمود أحمد
موضوع الرسالة:	تحسين إنتاج العنب الكنج روبي باستخدام بعض المواد الكيميائية Improving Production of King Ruby Grape using Certain Chemical Substances
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم بساين (فلكهة)
تأريخ المقدم:	٢٠٠٢/٧/٢٨ > ماجستير<
لجنة الإشراف:	أ.د. / حمدي مرزوق د. / طلعت كامل مهدي د. / عيد الفتاح الصالحي

ملخص الرسالة

تم رش كرمات العنب الكنج روبي ببعض كاسرات السكون ، أظهرت المعاملة زيادة مؤكدة في تكبير وتحسين تفتح البراعم ، أدت إلى زيادة إنتاج الكورمات وتحسين صفات الثمار، تؤكد هذه الدراسة أهمية استخدام الدورمكس ٢% أو نترات الأمونيوم ٤ % أو الزيت المعدني ٥% رشاً فردياً أو خليط من الدورمكس مع نترات الأمونيوم والزيت المعدني المستخدم فردياً وذلك في منتصف يناير بعد التقليم الشتوي، كذلك توضح أفضلية استخدام التريبة الكردونية لإنتاج محصول أوفر وصفات ثمار أحسن.

Summary of Thesis

This study was carried out to study the effect of certain dormancy breaking agents on bud burst, yield and berry quality of Kings ruby grapevines. Dormex, ammonium nitrate and mineral oil

spraying either singly or in combination were significant increase in the bud burst about two weeks earlier. All treatment were significantly increased the yield and proved the berry quality. There was a positive relationship between the cordon training and improvement the yield and berry quality.

مقدم الرسالة:	حفيظ روفائيل حبيبـــــــــــــــــ
موضوع الرسالة:	'دراسات علي بعض أنواع الإيوجينا في أسوان' Studies on some Species of <i>Eugenia</i> in Aswan
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم بساتين (فاكهة)
تاريخ الـمـد:	٢٠٠٢/٦/٣٠ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د./ سمير زكي العجمي أ.د./ سيد فرج خليفة د./ فاروق محمد أحمد مصطفى

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على ستة أنواع من جنس الإيوجينيا المنزرعة بالحديقة النباتية بأسوان خلال ثلاث مواسم متتالية. وكانت أهم النتائج المتحصل عليها ما يلي

تحديد الوضع التقسمي لجنس الإيوجينيا مع دراسة صفات الشكل الظاهري والصفات التشريحية للأنواع التي تحت الدراسة ، دراسة التزهير والتلقيح وعقد الثمار بالإضافة إلى دراسة بعض الخصائص الطبيعية والكيميائية خلال مراحل تطور نمو الثمرة وللثمار الناضجة لاسيما التقدير الكمي لصبغة الأنثوسيانين التي يمكن استخدامها كمكونات طبيعية للأغذية في بعض الأنواع المدروسة واتضح من الدراسة أن النوع *E. jambolana* هو أفضل الأنواع من حيث الخصائص الثمرية ومتوسطا في تركيز صبغة الأنثوسيانين وعليه يتم التوصية بأهمية تنمية وانتشار هذا النوع نظراً لارتفاع محصوله وجوده ثماره.

Summary of Thesis

This study has been conducted in the fruit crops laboratories, Assiut University and flora section, Aswan Botanical garden during 1997 – 2000. **Main Results:** Taxonomic status of genus *Eugenia* and macro and micro morphological characteristics of the six species under study, Study of flowering, pollination and fruit set, as well as fruit physical and chemical characteristics during fruit development and at harvest particularly anthocyanin content (main natural dye) in some studied species, Best results of species were obtained from *E. jambolana*, thus this study recommend growing this species as it has good fruit quality and produces moderate amount of natural food colouring compounds.

قسم

المجتمع الريفي

والأرشاد الزراعي

مقدم الرسالة:	رأفت جابر عبد العزيز
موضوع الرسالة:	'معوقات انتشار وتبني المخصبات الحيوية بين الزراع بمحافظة أسوان' Barriers to the Diffusion and Adoption of Biofertilizers Among Farmers in Aswan Governorate
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم المجتمع الريفي والإرشاد الزراعي
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١/٢٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ سامية عبد السمح هلال د/ أحمد محمد صالح

ملخص الرسالة

تهدف الدراسة إلى التعرف علي معوقات انتشار وتبني المخصبات الحيوية بين الزراع بمحافظة أسوان، وذلك من خلال: دراسة أهم خصائص المبحوثين غير مستخدمي المخصبات الحيوية والمستخدمين لها للزراع بمحافظة أسوان الذين شملتهم الدراسة. دراسة المستوي المعرفي والاستخدامي والمهاري للزراع المبحوثين مستخدمي المخصبات الحيوية. دراسة اتجاهات الزراع نحو المخصبات الحيوية. تحديد المعوقات التي تعوق انتشار المخصبات كما يراها الزراع. معرفة آراء ومقترحات الزراع المبحوثين لتفعيل انتشار وتبني المخصبات الحيوية. ولتحقيق أهداف هذا البحث، تم إجراء حصر ميداني علي مجموعتين من الزراع، المجموعة الأولى هي الزراع المستخدمين للمخصبات الحيوية قوامها ١٥٠ مزارع، والمجموعة الثانية من الزراع غير المستخدمين قوامها ١٥٠ مزارع تم أخذهم من بين زراع محافظة أسوان، ولقد تم جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة بطريقة الاستبيان بالمقابلة الشخصية واستخدام في

عرض وتبويب وتحليل البيانات، الحصر العددي والتوزيع التكراري والدرجة المتوسطة والنسب المئوية وتم مناقشة النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ويقدم البحث بعض التوصيات التي تسهم في عملية تحقيق التنمية الزراعية في البلاد.

Summary of Thesis

This research aims to know Barriers to the diffusion and Adoption of biofertilizers among farmers in Aswan Governorate through the following objectives:

Studying the characteristics of users and nonusers of biofertilizers among farmers included in this research in Aswan Governorate. Studying the level of knowledge and practices of farmers who used biofertilizers. Studying farmers attitudes towards biofertilizers. Identifying barriers to the diffusion of biofertilizers as viewed by farmers. Knowing farmer's views and suggestion to increase the rate of diffusion and adoption of biofertilizers. In order to achieve the above objectives, an empirical study was conducted on two groups of farmers. The first group included 150 users and the second included 150 nonusers of biofertilizers among farmers in Aswan Governorate. The data was collected by means of personal interview using a questionnaire form prepared for this purpose. Frequency distribution, averages and percentages were used for data presentation and analysis results of the paper includes some recommendations to facilitate this process in order to achieve agricultural development.

مقدم الرسالة:	منال عبد المجيد أبو المجد
موضوع الرسالة:	معوقات مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة المجتمعية وتعزيز دورها في التنمية الريفية في محافظة أسيوط Barriers of Rural Women Participation in Societal Activities and Enhancing Her Role in Rural Development in Assiut Governorate
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم المجتمع الريفي والإرشاد الزراعي
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/٦/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / محمد جمال الدين راشد أ.د. / محمد محمود محمد دبوس د. / مصطفى حمدي إبراهيم

ملخص الرسالة

استهدفت هذه الدراسة التعرف على معوقات مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة المجتمعية من خلال التعرف على درجة مشاركة المرأة الريفية ومعوقات مشاركتها في الأنشطة المجتمعية والخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها التغلب على تلك المعوقات ، حيث اعتمدت الدراسة في ذلك على بيانات فريتين من قرى محافظة أسيوط. ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد توصلت إلى مجموعة من التوصيات التي لعل من أهمها: توعية الريفيات بأهمية المشاركة في الأنشطة المجتمعية ، إقامة دورات تدريبية للعاملين بالمجالات المرتبطة بالمرأة ، عودة الرائدات الريفيات المؤهلات من أجل توعية المرأة ، الاستمرار في إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالمرأة الريفية ، دعم الجمعيات الأهلية الحالية ، إعداد برامج توعية المرأة ، تشجيع مشاركة المرأة الريفية في الجمعيات التعاونية.

Summary of Thesis

The overall goal of this study is to identify the main constraints of rural women participation in societal activities and integration in their community development in rural Assiut Governorate. The following recommendation can thus be distilled from the results of the study: Provide training to develop basic skills of rural women for income generation projects, women should be encouraged to participate in political activities, establish training programs for rural women, strengthen the role of local women leaders system at village level.

قسم

المحاصيل

١٩٧٤

مقدم الرسالة:	صلاح فتوح أبو الوفاء
موضوع الرسالة:	تأثير مواعيد الزراعة والحصاد على النمو والجودة في بنجر السكر Effect of Planting and Harvesting Dates on Growth, Yield and Quality of Sugar Beet (<i>Beta vulgaris</i>)
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم المحاصيل
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/١/٢٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/حسن محمد عبد الرحيم د/عادل مصطفى أبو سلامة د/المهدي عبد المطلب طعيمة

ملخص الرسالة

يهدف هذا البحث إلى دراسة إنتاجية بنجر السكر في جنوب مصر وتم إجراء التجربة في خلال موسمي ١٩٩٨/١٩٩٩ ، ١٩٩٩/٢٠٠٠ بمزرعة البحوث الزراعية بالغريب في الصحراء الشرقية بأسسيوط والتابعة لكلية الزراعة بأسسيوط حيث اشتملت الدراسة على ٣ مواعيد للزراعة خلال ٢٠ أكتوبر ، ٤ ، ١٩ نوفمبر و ٤ مواعيد حصاد في ١٥ ، ٣٠ مايو وذلك خلال الموسمين وكانت الأصناف المختبرة هي: Del 937, Del 938 and Del 939 (Manti Bianco) وكانت أهم النتائج هي: تفوق ميعاد الزراعة الأول في ٢٠ أكتوبر في معظم الصفات الهامة مثل محصول الجذور ومحصول السكر. تفوق كل من الصنف Del 938, Del 939 (Manti Bianco) في محصول الجذور والسكر ومعظم الصفات الهامة الأخرى. أدى تأخير ميعاد الحصاد إلى زيادة محصول الجذور والسكر وكان ميعاد الحصاد الأخير هو الأفضل .

Summary of Thesis

The objectives of this investigation were to study the productivity of sugar beet in Upper Egypt. The experiment were carried out through the two growing seasons 1998/1999 and 1999/2000 at Assiut University farm located in El-Ghorieb, 23km south east of Assiut. Sowing dates treatments were at Oct. 20th, Nov. 4th and 19th. Four harvest date were tested at April 15th, 30th, May 15th and 30th. The examined varieties were Del 937, Del 938 and Del 939 (Manti Bianco). The important main findings were: early planting at Oct. 20th was superior for most of the yield related traits such as root and sugar yield. Both Del 938 and Del 939 Produced the highest root and sugar yields and most of the yield related traits - related traits - Root and sugar yields increased with delayed harvest. Late harvest at May 30th produced the highest yield.

مقدم الرسالة:	الحسين حمادة عبد العظييم حسن
موضوع الرسالة:	تأثير تحميل الفول السوداني وعباد الشمس وميعاد إضافة الآزوتي والفسفور والبوتاسيوم على المحصول ومكوناته Effect of Peanut-Sunflower Intercropping and Time of NPK Application on Yield and Its Components
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم المحاصيل
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٣/٣ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ رجب أحمد السيد داود د/ إبراهيم عبد الباقي رزق الفار د/ المهدي عبد المطلب طعيمة

ملخص الرسالة

أجري هذا العمل خلال الموسمين الزراعيين ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ في محطة البحوث الزراعية بالغريب التابعة لجامعة أسيوط. والهدف من هذا العمل هو دراسة تأثير تحميل عباد الشمس مع الفول السوداني وكذا دراسة تأثير مواعيد إضافة السماد الآزوتي والفسفاتي والبوتاسي على صفات المحصول ومكوناته في أرض رملية جيرية ٠ تم زراعة الفول السوداني (صنف جيزة ٥) مع هجين عباد الشمس (فيدوك) في ١٣ و ٢٠ من شهر مايو سنة ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ على الترتيب ٠ تم حصاد عباد الشمس بعد حوالي ١٠٠ يوم منذ بدء الزراعة وتم حصاد الفول السوداني بعد حوالي ١٨٠ يوم من الزراعة ٠ ويمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها كآلاتي: بالنسبة للفول السوداني كان لنظم التحميل تأثيرا ايجابيا على جميع مكونات المحصول فيما عدا (عدد الفروع/ نبات) وصفات الجودة في حين أنه ظهر أعلى مستوى للقرن / فدان تحت نظام الزراعة المفردة ٠ أما بالنسبة لمواعيد إضافة السماد تأثرت جميع الصفات المحصولية وصفات

الجودة بتجزئة السماد الي عدة جرعات. بالنسبة لعباد الشمس: كان لنظم التحميل تأثيرا إيجابيا علي جميع مكونات المحصول وصفات الجودة في حين أنه ظهر أعلى محصول للسبذور / فدان تحت نظام الزراعة المفردة أما بالنسبة لمواعيد إضافة السماد تأثرت جميع صفات المحصول وصفات الجودة بتجزئة السماد الي عدة جرعات •

Summary of Thesis

This work was carried out during the two growing seasons of 1999 and 2000 at Assiut University Experimental farm located in El-Ghorieb 23 km south east Assiut. The objective of this work was to study the effect of intercropping sunflower (*Helianthus annuus*, L) with peanut (*Arachis hypogaeae*, L) and time of NPK application on growth, yield and yield components of peanut and sunflower in sandy calcareous soil. Peanut (Giza 5 cv.) and sunflower (Vidoc-hibrid) were sown at May 13 and 20 in 1999 and 2000 seasons respectively. Sunflower was harvested after 100 days from sowing, whereas peanut after 180 days. 1- For peanut. Intercropping patterns caused significant increase in quality traits and yield components, except number of branches / plant. While; the maximum pod yield / fed. resulted from, sole cropping. For the time of NPK application all traits under study was increased by the splitting of NPK fertilizers. 2- For sunflower Intercropping patterns caused significant increase in quality traits and yield components. While the maximum seed yield / fed. Resulted from sole cropping. For the time of NPK application, all traits study was increased by splitting of NPK fertilizers.

مقدم الرسالة:	نحيف إبراهيم محمد
موضوع الرسالة:	تأثير الكثافة النباتية والتسميد الأروتي على النمو والمحصول علي بعض أصناف الذرة الرفيعة للحبوب Effect of Plant Density and Nitrogen Fertilization on Growth and Yield of some Grain Sorghum Cultivars
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم المحاصيل
تأريخ اللم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ محمد محمود عبد الله د/ عبد الحاكم يونس علام د/ جمال راجح النجار

ملخص الرسالة

اجريت هذه الدراسة بمحطة البحوث الزراعية بكلية الزراعة - جامعة أسيوط خلال موسمي النمو ٢٠٠١/٢٠٠٠ لدراسة أثر التسميد الأروتي (٨٠، ١٠٠، ١٢٠ كجم آروت) والكثافة النباتية (٤٦،٦٦٦، ٧٠،٠٠٠، ١٤٠،٠٠٠ نبات للفدان) علي النمو و المحصول لأربعة أصناف من الذرة الرفيعة (دورادو، شندويل، مينا وحورس). ولقد أظهرت النتائج أن هناك اختلافات بين الأصناف في نمو المحصول لوحظ كذلك أن هناك تأثير لإضافة السماد الأروتي للذرة الرفيعة حيث أدت إضافة السماد الأروتي بمعدلات حتى ١٢٠ كجم آروت للفدان أدي إلي زيادة النمو والمحصول ومكوناته، كذلك لوحظ أن زيادة الكثافة النباتية من ٤٦،٦٦٦ إلي ٧٠،٠٠٠ أو ١٤٠،٠٠٠ نبات/فدان أدت إلي زيادة المحصول ولكن وجد أن بقية الصفات زادت بنقص الكثافة النباتية.

Summary of Thesis

This study was conducted during 2000 and 2001 at the Agric. Exp. Station farm of Assiut University, to study the response of four grain sorghum (Dorado, Shandaweel, Mina and Horus) to the application of nitrogen fertilizer (80, 100, 120 kg N/fed) and the plant density (47.666, 70.000, and 140.000 plant/fed). The data revealed that grain sorghum cultivars different in growth and yield components in both season, also increasing N rates for 80 to 100 or 200 kg increased most of growth and yield attributes. Also, increasing plant density from 46.666 to 70.000 plants increased grain yield/fed, while other characters increased by decreasing plant density.

قسم البراعة

مقدم الرسالة:	بهاء الدين السيد عبد الفتاح
موضوع الرسالة:	الاختلافات الوراثية الناتجة عن مزارع الأنسجة والانتخاب في الأنبوب لصفة تحمل الملوحة في الطماطم Somaclonal Variation and In-vitro Selection for Salinity Tolerance in Tomato
الكلية والقسم:	كلية الزراعة - قسم الوراثة
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٣/٣ > ماجستير
لجنة الإشراف:	أ.د/محمد يونس حسن د/عفت محمد محمود الفرائش د/ حمدي محمد العارف

ملخص الرسالة

تهدف الدراسة إلى استخدام طريقة زراعة الأنسجة في الطماطم في دراسة ما يلي: - الاختلافات الوراثية في نباتات الطماطم الناتجة عن مزارع الأنسجة بواسطة التحليل الكهربائي لمشابهايات الأنزيمات ، استخدم في هذا البحث خمس طرز للانزيمات هي الجلوتاميت أوكسالو أسيتيت ترانس أمينيز ، المالكيت ديهيدروجينيز أسيدفوسفاتينيز ، الاستيريز والبيركسيديز لتحديد الاختلافات الوراثية في ٢٢٠ نبات طماطم ناتجة عن مزارع الأنسجة في أصناف الـ Midi-A والـ Pearson improve. وقد أظهرت النتائج ما يلي البيتينين: IB-3 (2.0 mg/1 BA + 0.2 mg/1 IAA) والـ IB-4 (2.0 mg/1 BA + 0.2 mg/1 IAA) أكبر عدد من الأفرع الخضري لكل جزء نباتي منزرع (٣٣,٨٣ و ٣٣,٦٢ فرع علي التوالي) وأعلي نسبة لتكوين الجذور (٥٩,٣٥ و ٤٣,٤٣ % علي التوالي) لذا اقترح أنسب بيئينين لتكشف نباتات الطماطم عن البينات الأخرى . كما أظهرت النتائج أن ٦٨ كلون من ١١٠ كلون مختبرة (بنسبة

٦١,٨٢%) طرز حزمية لمشابهاات الاستريز ماثلة للأب المعطي Midi-A بينما الكلونات الأخرى (بنسبة ٣٨,١٨%) أظهرت ١٠ طرز حزمية مختلفة عن الأب بالاضافة الي أن جميع الكلونات المختبرة أظهرت طرز حزمية للبيروكسيديز مختلفة عن الأباء ما عدا الكلون رقم ١٣ في الصنف Pearson improve وفي هذه الدراسة أيضا تم زراعة ٩٢٥ ورقة فلقية من الـ Pearson improve, Midi-A تحت ظروف الانتخاب للمحية (٦ جرام لكل لتر) حيث أوضحت النتائج انخفاض معدل الكشف تحت اجهاد الملحية الي ٩,٥٣% بالمقارنة بمعامل الكنترول . دلت النتائج علي أن صفة تحمل الملوحة تم التعبير عنها علي المستوي الخلوي وأنها انتقلت الي نسل النباتات المنتخبة . أظهرت النتائج أن اجهاد الملوحة حفز بناء ١٢ حزمة بروتينية جديدة (٩١,٢٤ كيلو دالتون - ٢٢,٥٦ كيلو دالتون) بالاضافة الي ثلاث حزم لمشابهاات أنزيم الاستريز وحزمة واحدة لكل من أنزيم المالت ديهيدروجينيز وأنزيم البيروكسيديز.

Summary of Thesis

The present study aimed to use the utility of tomato tissue culture for studying the following objectives: I- Somaclonal variation in regenerated tomato plants as revealed by isozyme analysis. In this part of present investigation, the enzymatic patterns of glutamate-oxaloacetate-transamines (GOT), malate dehydrogenase (MDH), acid phosphatase (ACP), esterase (EST) and peroxidase (PRX) were used to determine the genetic variability among 220 tomato plants regenerated from the varieties Midi-A and Pearson improve. In addition, morphological evaluation for the regenerated plants was also

studied. II- The possibility of obtaining salt tolerant tomato plants via tissue culture method. III- The changes in gene expression under salinity stress. Four varieties of tomato namely; Midi-A, Pearson improve, Peto-86 and Roma VF were used in the present investigation. The results revealed that: The two medium IB-3 (1.2 mg/l BA + 2 mg/l AA) and IB-4 (2.0 mg/l BA + 0.2 mg/l AA) media possessed high numbers of shoot/exp (33.83 and 33.62, respectively) and high % of rooting (43.43 and 59.35, respectively), which suggesting that they more suitable for regeneration of tomato plants than the other medium, also showed that sixty eight out of 110 tested somaclones (61.82%) revealed esterase pattern similar their donor parent Midi-A, while the other somaclones (38. 18%) exhibited 10 patterns different from their parent. All tested somaclones did not revealed their peroxidase parental pattern, except the somaclone No. 23. A total of 925 cotyledons midi-A and Pearson improve were cultured under selection conditions of salinity stress (0.6% NaCl). The regeneration rate was reduced under salinity stress to be 9.53% of that on the control treatment. The tolerance to salinity was expressed at the cellular level and the mechanism (s) of enhanced salt tolerance in tomato was during the course of plant development in the field and transmitted to the progeny of the selected plants. The results showed that salinity-stress induced the synthesis of 12 new protein bands (91.24 – 22.56 KDa) in addition to 3 bands in esterase and one band in each of Mdh and peroxidase.




كلية الطب

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الطب جامعة أسيوط عن عام ٢٠٠٢


البيان	درجة الماجستير		
	طالـب	طالبة	أجمالي
الإمراض الباطنة	٥	٨	١٣
الإمراض العصبية والطب النفسي	٣	٠٠	٣
إمراض القلب	٢	٢	٤
الأمراض الصدرية	٦	٠٠	٦
طب المناطق الحارة	١	١	٢
الإمراض الجلدية والتناسلية	١	٠٠	١
طب الأطفال	٣	٢	٥
الباثولوجيا الأكلينيكية	٠٠	٧	٧
الجراحة العامة	١١	٠٠	١١
جراحة المسالك البولية	٢	٠٠	٢
جراحة العظام	٣	٠٠	٣
الاذن والأنف والحنجرة	٢	٠٠	٢
التوليد وإمراض النساء	٤	٠٠	٤
التخدير	٩	٣	١٢
الأشعة التشخيصية	٠٠	١	١
الأشعة العلاجية	٠٠	٢	٢
الصحة العامة	٠٠	١	١
امراض التخاطب	٠٠	١	١
السمعيات	٠٠	٢	٢
الفسبولوجيا	٢	٠٠	٢
الإجمالي	٥٤	٣٠	٨٤

البيان			درجة الماجستير	
القسم	طالب	طالبة	أجمالي	
مقبلة	٥٧	٢٧	٨٤	
الكيمياء الحيوية	٠٠	٢	٢	
طب شرعي وسموم	٠٠	٢	٢	
التشريح والأجنة	٠٠	١	١	
الباثولوجيا	١	٤	٥	
الفارماكولوجيا	١	٠٠	١	
الهستولوجيا	٠٠	١	١	
الميكروبيولوجيا	٠٠	٢	٢	
الإجمالي	٥٦	٤٢	٩٨	


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الطب
جامعة أسيوط عن عام ٢٠٠٢



بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الطب
جامعة أسيوط عن عام ٢٠٠٢



بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الطب
جامعة أسيوط عن عام ٢٠٠٢



قسم

الاحراض الباطنة

مكتبة
الاحراض الباطنة

أشرف عبدلى إسماعيل	مقدم الرسالة:
'الأنترليوكين ١٦ الدائر بين مرضى الذئبة الحمراء وعلاقته بنشاط المرض' Circulating Interleukin- 16 in Systemic Lupus Erythematosus, Correlation With Disease Activity	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »	تاريخ المحرم:
أ.د. نبوية محمود توفيق أ.د. أحمد كامل مصطفى د. محمود على محمود عسرى	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تهدف هذه الرسالة إلى قياس مستوى الأنترليوكين ١٦ في مرضى الذئبة الحمراء وعلاقته بنشاط المرض وقد أوضحت هذه الدراسة أن مستوى الأنترليوكين ١٦ يزداد في مرضى الذئبة الحمراء عن المجموعة الضابطة ويزداد زيادة جوهرية موجبة عند مقارنته بنشاط المرض وقد أشارت هذه النتائج إلى إنه يمكن استخدام مستوى الأنترليوكين ١٦ بمصل الدم كمقياس جديد لقياس مستوى نشاط المرض في مرضى الذئبة الحمراء كما إن ذلك من الممكن إن يفتح مجالا جديدا في المستقبل لاستخدام مضادات الأنترليوكين ١٦ في علاج مرضى الذئبة الحمراء .

Summary of Thesis

The aim of this work was to examine the circulating level of IL-16 in SLE Patients and to find the relation between the disease activity index and the serum level of IL-16. This study revealed that serum IL-16 was significantly higher in SLE patients compared to the control group also it was significantly positively correlated with disease activity index. So that serum IL-16 can be used a new parameter of diseases activity in SLE patients and this opens the future hope for the use of IL-16 antagonist as a potential therapeutic method in the treatment of patients with SLE.

مقدم الرسالة:	أميمه عبد العزيز عبد العال
موضوع الرسالة:	<p>' دراسة دور الموجات فوق الصوتية للوريد الأجوف السفلى في تقييم حجم السوائل داخل الأوعية الدموية لدى مرضى الفشل الكلوي المعالجين بالاستشفاء الدموي ذوي ضغط الدم العالي والمنضبط'</p> <p>Echography of the Inferior Vena Cava for Intravascular Fluid Volume Assessment in Normotensive and Hypertensive Haemodialyzed Patients</p>
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	<p>أ.د. محمد عباس صبيح</p> <p>أ.د. محمد مصطفى عشاوي</p> <p>د. عبد الكريم حسن عبدالله</p>

ملخص الرسالة

يعد قياس قطر الوريد الأجوف السفلى بالموجات فوق الصوتية طريقة فعالة لقياس حجم الوسائل داخل الأوعية الدموية والتحكم في حجم الوسائل خارج الخلايا بالسحب الفائق والمقيم بالنقص في وزن الجسم وقطر الوريد الأجوف السفلى بعد جلسة الاستشفاء أدى إلى التحكم في ضغط الدم الشرياني في ٧٦% من مرضى الفشل الكلوي ذوي ضغط الدم المرتفع .

Summary of Thesis

Ultrasonnographic Measurement of Inferior Vena Cava diameter is one of the reliable tools for assessment of intravascular fluid volume Control of extracellular fluid volume by ultrafiltration as assessed by decrease of body weight and IVC diameter after dialysis is associated with blood pressure control in about 76% of hypertensive haemodialyzed

مقدم الرسالة:	حنان شرف الدين محمد
موضوع الرسالة:	<p>* تأثير التدخين على خصائص رسم القلب الكهربائي في تضخيلبطية الأيسر في مرضى ضغط الدم المرتفع</p> <p>Effect of Smoking on Electrocardiographic Criteria of left Ventricular Hypertrophy in Hypertensive Patients</p>
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/٦/٣٠ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د. / فتحية خليل إبراهيم د. / محمود كامل فراج

ملخص الرسالة

الزيادة في معامل التدخين له تأثيرات كبيرة على كلا من أبعاد البطين الأيسر - كذلك البطين الأيسر - وظيفة القلب الإنبساطية والإنقباضية - قطر الأذين الأيسر ومنشئ الأورطي ، تدخين السجائر له تأثير سلبي على حساسية رسم القلب بجهاز الموجات فوق الصوتية والدوبلر للقلب في تشخيص تضخم البطين الأيسر في مرضى ضغط الدم المرتفع.

Summary of Thesis

Cigarette smoking has negative effect on sensitivity of ECO criteria compared to use of echocardiography for diagnosis of LVH in hypertensive patients increasing smoking index has affect: dimensions of the LV. LV. Mass, diastolic and systolic function, LA diameter and aortic root diameter.

صفاء عيد الستار أحمد	مقدم الرسالة:
"تأثير أنيميا نقص الحديد على الوظائف المعرفية والفسولوجية للجهاز العصبي"	موضوع الرسالة:
Cognitive and Neurophysiological Effects of Iron Deficiency Anemia	
كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »	تاريخ المنح:
أ.د. عصام عبد المنعم صادق البية د. أيمن محمد حسين جعفر د. هالة خلف الله الشريـف	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

هدفت هذه الرسالة إلى دراسة تأثير أنيميا نقص الحديد والعلاج بالحديد على الوظائف المعرفية وعلى النقل بالمحارات الحسية وقد لوحظ أن أنيميا نقص الحديد لها آثار سلبية على المعرفة ، الذكاء ، ووظائف الجهاز العصبي المركزى الأخرى وإن العلاج بالحديد يحسن العديد من تلك الآثار كذلك بأنها تسبب ضعف بصرى وسمعى غير واضح إكلينيكيًا ويظل موجود بعض منها إلى ٣ شهور من العلاج بالحديد .

Summary of Thesis

The aim of this work was to investigate the effect of iron deficiency anemia (IDA) and iron supplementation on cognitive functions and sensory pathway transmissions. It was found that IDA has a deleterious effects on cognition, intelligence and that iron

supplementation improve many of these effects. Also, IDA causes a subclinical visual and auditory impairment which persisted after 2-3 months of iron therapy.

مقدم الرسالة:	عبير وليم أسكندر قلّاس
موضوع الرسالة:	'تأثير اضطرابات الغدة الدرقية على أداء القلب' Effect of Thyroid Dysfunction in Cardiac Performance
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	د / فاطمة أبو بكر محمد العسلى د / علاء الدين السيد عبد المنعم

ملخص الرسالة

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة تأثير اضطرابات الغدة الدرقية على أداء القلب وقد تم دراسة تأثير تسمم الغدة الدرقية ومقارنة هذه النتائج بالمرضى الذين يعالجون بالثيروكسين وقد وجد أن تسمم الغدة الدرقية يؤثر على وظائف القلب بينما يؤدي الثيروكسين على تضخم في عضلة البطين الأيسر"

Summary of Thesis

This study aims to define the effect of thyroid dysfunction on cardiac function. The effect of thyrotoxicosis was studied, and compared with those patients treated with Thyroxine. It was found that thyrotoxicosis leads to left ventricular hypertrophy and enhanced systolic function while Thyroxine leads to marked left ventricular hypertrophy.

مقدم الرسالة:	نشوى محمد عبد الرؤوف
موضوع الرسالة:	قيمة بعض المتغيرات الإكلينيكية والفحوص المعملية في التنبؤ بحدوث تثبيط وظائف نخاع العظمى بعد العلاج الكيميائي في مرض اللاهوبجكين ليمفوما وسرطان الثدي Predictive Value of Some Clinical and Laboratory Parameters in Chemotherapy-Induced Myelosuppression in Non-Hodgkin's Lymphoma and Cancer Breast
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د / حسين أحمد خليل محفوظ د / عصام عبد المنعم صادق البيه د / ممدوح محمد أنسور

ملخص الرسالة

يعتبر تثبيط وظائف نخاع العظمى من أخطر مضاعفات العلاج الكيميائي للأورام واستهدفت هذه الرسالة محاولة استخدام بعض المتغيرات الإكلينيكية وبعض الفحوص المعملية في التنبؤ بحدوث نقص كرات الدم البيضاء المتعادلة عقب العلاج الكيميائي في مرضى اللاهوبجكين ليمفوما وسرطان الثدي حديثي التشخيص. ومن تلك الدراسة تبين أنه يمكن استخدام المقاييس الآتية في التنبؤ بحدوث الحمى المصاحبة لنقص خلايا كرات الدم البيضاء المتعادلة: ١- مستوى عامل التركزز للورم - ألفا ومستقبلاته بالبلازما خاصة المستقبل R_2 . ٢- تقييم حالة الأداء للمريض في قيامه بأنشطته اليومية. ٣- مستوى نسبة الهيموجلوبين والصفائح الدموية في المرضى حديثي التشخيص قبل بدء العلاج الكيميائي

Summary of Thesis

The aim of this study was to use some of the clinical and laboratory parameters in prediction of chemotherapy- induced myelosuppression in non- Hodgkin's lymphoma and cancer breast. This study concluded that, elevated levels of TNF- α and its soluble receptors R₁ and R₂ poor performance status of the patients as well as decreased hemoglobin level and platlet count at the time of diagnosis can predict the occurrence of febrile neutropenia in newly diagnosed patients with NHL after the first course of treatment.

أشرف محمد اليمني متولي	مقدم الرسالة:
عوامل الخطورة المسببة لحدوث التجلط في الأوردة العميقة ومعدلات حدوثه في مرضى الأورام بالقسم الداخلي بمعهد جنوب مصر للأورام Risk Factors and Incidence of Deep Venous Thrombosis in Hospitalized Cancer Patients in South Egypt Cancer Institute	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »	تأريخ المزم:
أ.د/ يسرية عبد الرحمن أحمد أ.د/ أحمد محمد عبد الوارث أ.د/ محمد رأفت خلف د/ أشرف زيدان عبد الله	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على مرضى القسم الداخلي بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط ، وتم فيها متابعة ١٠٠ مريض تم حجزهم لمدة أسبوع على الأقل بالقسم الداخلي، ووجد أن ٤% فقط من هؤلاء المرضى قد تعرضوا لحدوث التجلط في الأوردة العميقة، ثم أجريت دراسة أخرى من البيانات المدونة بملفات المرضى على عدد ٥٠٠ مريض تم حجزهم بالمعهد في فترة عام سابق لإجراء الدراسة، ووجد أن ٦ مرضى فقط قد تعرضوا لحدوث التجلط في الأوعية الدموية العميقة. ولم يكن هناك عوامل خطورة محدد يمكن عن طريقة تحديد المرضى الأكثر تعرضا لحدوث التجلط رغم أن التجلط في الأوعية العميقة كان أعلى في المدخنين عن غيرهم، وأعلى في الرجال

عن النساء، ومن نتيجة هذه الدراسة وجدنا أنه ليس من الضروري إعطاء مضادات
التجلط بصفة روتينية لكل مريض الأورام بالقسم الداخلي.

Summary of Thesis

This study was carried out in Assiut University South Egypt Cancer Institute by examination of 100 patient admitted for one week. We found that 4 of them (4%) developed deep venous thrombosis (DVT). Then we studied 500 patient retrospectively who was admitted one year before starting this study. We found that only 6 of them developed DVT inspite of the increased incidence of DVT in smokers male patient. But this not justify prophylactic anti coagulant for all admitted cancer patient.

مقدم الرسالة:	أمن حمدي زكي علي
موضوع الرسالة:	أنماط الفيروسات الكبدية ومدى تأثير وظائف الكبد في مرضى سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية عند البالغين Viral Hepatitis Profile in Adult Lymphoma and Leukemia
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ أحمد محمد عبد الوارث د/ ثناء محمد حسن المليجي د/ عزه محمود عز الدين

ملخص الرسالة

أوضحت العديد من الدراسات ازدياد نسبة حدوث مرض سرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجيكيني عند المرضى المصابين بالفيروس الكبدى سي ولكنها لم تستطع توضيح مدى العلاقة بينهما. وقد أوضحت الدراسة الآتي: ١-ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس الكبدى (سي) لدى مرضى سرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجيكيني (٣٦ %) مقارنة بالأصحاء (١٠%) ٢-لا يوجد أي اختلاف في مدى استجابة مرضى سرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجيكيني حاملي فيروس الالتهاب الكبدى عن المرضى غير حاملي الفيروس للعلاج الكيميائي. ٣-مرضى سرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجيكيني حاملي فيروس الالتهاب الكبدى أكثر عرضة للالتهاب الكبدى الحاد ، وقصور في وظائف الكبد أثناء وبعد انتهاء العلاج الكيميائي. وتوصي الرسالة بعمل تحليل لدلائل الالتهاب الكبدى لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجيكيني قبل بدء العلاج الكيميائي تفاديا لحدوث نشاط الفيروس مرة أخرى.

Summary of Thesis

Little is known about the coincidence of hepatitis C virus infection (HCV) and non Hodgkin's lymphoma. Although there is an increased incidence of chronic HCV infection with cryoglobulinemia type II and interestingly, low grade NHL. Our study showed higher percentage of hepatitis C infection and latent HBV was found in patients with NHL. Frequent liver complication with intensive immunosuppressive chemotherapy was detected. Full screening of all hepatitis markers in these patient with observation and monitoring during and after end of chemotherapy is recommended.

مقدم الرسالة:	أيمن عبد الجواد أحمد أحمد
موضوع الرسالة:	دراسة لأنماط التهابات المفاصل التي تصيب الأطفال المترددين على مستشفى أسبوط الجامعي Patterns of Arthritis in Children Attending Assiut University Hospital
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة
تاريخ المحم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ البصري إبراهيم أبو النور د/ سلوى صلاح الدين الجندي

ملخص الرسالة

استهدفت هذه الدراسة معرفة الأسباب المختلفة للتهابات الروماتيزمية في الأطفال المترددين على مستشفى أسبوط الجامعي ، وقد أجريت هذه الدراسة على عدد مائة وخمسة مريضاً يعانون من التهابات المفاصل ، وقد تراوحت أعمارهم بين الخامسة والسادسة عشر مع متوسط ١٣,٣ سنة ، وأظهرت نتائج الدراسة أن الأسباب التي يعزى إليها التهاب المفاصل تمثلت في الحمى الروماتيزمية حيث تم تشخيص عدد خمسة وخمسون مريضاً بنسبة ٢,٤% ثم التهاب المفاصل المزمن الصباني في عدد اثنان وثلاثون مريضاً بنسبة ٣٠,٤% ، وتم تشخيص الروماتزم التفاعلي في عدد إحدى عشر مريضاً بنسبة ١٠,٥% ، وأخيراً الذئبة الحمراء في عدد سبعة مرضى بنسبة ٦,٧%.

Summary of Thesis

The study was carried out on 105 children with arthritis attending to Assiut University Hospital, Department of Medicine and Rheumatology clinic in the period between July 2000 to June 2001. The result of the study showed that rheumatic fever is still the most common cause of arthritis in our locality as it has been diagnosed in fifty five patients out of 105 (52.4%). The next common is JCA which has been found in 32 patients (30.4%). Reactive arthritis was found in (11) patients (10.5%) and SLE was diagnosed in only (7) patient (6.07%). Further epidemiological studies on wide scale may be needed to get better estimate about the incidence and prevalence of each types of arthritis in children that might help in health care planning.

مقدم الرسالة:	حمدي عبد الغني أحمد
موضوع الرسالة:	تأثير العلاج بعقار الأريثروبويتين علي وظائف التنفس في مرضي الفشل الكلوي المزمن The Effect of Erythropoietin Therapy on Pulmonary Function's in Patients with Chronic Renal Failure
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة
تاريخ الملف:	٢٠٠٢/١١/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ محمد علي تهامي أ.د/ محمود كامل فراج

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة علي ثلاثون مريضاً بالفشل الكلوي المزمن وتم استخدام الأجهزة المعملية لإجراء قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم وكذلك إجراء اختبارات التنفس علي المرضى قبل وبعد استخدام عقار الأريثروبويتين. وقد أوضحت الدراسة وجود زيادة ذات دلالة في المتوسط الحسابي لنسبة الهيموجلوبين ولعدد كرات الدم الحمراء وقيمة الهيماتوكريت بعد العلاج بهرمون الأريثروبويتين في حين لم توجد اختلافات ذات دلالة في مجموعة التحكم، وبالنسبة لدراسة وظائف التنفس في هؤلاء المرضى وجد اختلاف من النوع التقيدى في وظائف التنفس تمثل في نقص السعة الحيوية بالرنينين وانخفاض حجم الهواء الزفيري الثانية الأولي وهبوط في سرعة السريان القصوي وسرعة السريان الزفيري عند ٢٥-٧٥ % من السعة الحيوية. وأوصت الدراسة باستخدام عقار الأريثروبويتين في مرض الفشل الكلوي المزمن ليس فقط لعلاج الأنيميا وإنما لتحسين وظائف التنفس.

Summary of Thesis

Impairment in the function of the respiratory system are among the frequent complications of chronic renal failure whereby their clinical impact is manifested above all in critically ill patients. A typical finding during ventilometric examinations is the limited airflow in the distal airways and even the clinical picture of obstructive ventilation disorder is not rare. Interstitial lung edema may play a significant role in lung function impairment observed in patients with chronic renal failure). Impairment of spirometric function in patients with renal insufficiency is continual, with reduction of glomerular filtration rate (GFR) and thus small airway dysfunction may be expected not only in patients with end stage renal failure, but also in those with moderate GFR reduction. A reduced diffusion capacity of the lungs for carbon monoxide was found in uremic patients in long term dialyzation prograx. The function of the respiratory muscles is characterized by a reduction of mainal inspiration and expiration pressure. Renal anaemia causes in patients with chronic renalfailure numerous serious problems which can be favourably influenced by improvement of the anaemia. Anemia is a common complication of chronic renal failure (CRF) With the availability of recombinant human erthropoietin over the last decade, much progress has been made in the management of anemia in patients with end – stage renal disease.

مقدم الرسالة:	حنان إدوارد عيساد
موضوع الرسالة:	'خلل في البطانة الوعائية في المتلازمة المقاومة للأسمولين' Endothelial Dysfunction in Resistance Syndrome
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة
تاريخ الـنـمـج:	٢٤ / ١١ / ٢٠٠٢ (ماجستير)
لجنة الاشراف:	أ.د/ محمد منير شـهـرـان أ.د/ محمد حسام مغريسي د/ امنية محمد عبد المنعم

ملخص الرسالة

استهدف هذا البحث دراسة التغيرات التي تحدث في تركيز كل من معامل التنكز الورمي الفاو الأندوثيلين - ١ في مرضى السكر من النوع الثاني ذوي أنواع مختلفة من السمنة، والارتباط بين كل منهما وبين درجة انضباط الجلوكوز ونسبة الدهون في الدم وقد تم قياس كل من مستوى الجلوكوز والدهنيات ومعامل التنكز الورمي الفاو الأندوثيلين - ١ في ثلاث مجموعات من غير المدخنين من مرضى السكر من النوع الثاني: ١٥ مريض ذوي أجسام سوية و ١٥ مريض ذو سمنة جينيكولوجية و ١٥ ذوي سمنة أندولوجية وقد لوحظ أن هناك ارتفاعاً ذوي دلالة إحصائية في مستوى معامل التنكز الورمي الفاو في المرضى ذوي السمنة الأندولوجية . وقد يرجع ذلك إلى عملية حث المعامل من النسيج الدهني (من الدهون الأحشاء) ولوحظ أن هناك علاقة ارتباط ايجابي ذو دلالة إحصائية بين مستوى معامل التنكز الورمي الفاو ومعدل كتلة الجسم والأندوثيلين - ١ في مرضى السمنة الأندولوجية ولوحظ أن هناك ارتفاع ذو دلالة إحصائية عالية في نسبة الأندوثيلين - ١ في مرضى السمنة الأندولوجية وقد يرجع ذلك إلى التفاعل بين معامل التنكز الورمي الفاو " الذي يوجد بنسبة عالية في

هؤلاء المرضى " والأنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الأندوثيلين -١ كما لوحظ أن الأندوثيلين -١ ومعدل كتلة الجسم لهما علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية في مرضى السمعة الأندولوجية ٠ من كل ما سبق ذكره نستنتج أن المتلازمة المقاومة للأنسولين في مرضى السكر من النوع ذو السمعة الأندولوجية وتكون مصاحبة للخلل في السيطرة الوعائية الفارضية ويعتبر معامل التنكز الورمي الفاو الأندوثيلين -١ مؤشرين لكليهما ٠

Summary of Thesis

The objective of this study is to determine and correlate the level TNF- α and ET-1 in type 2 diabetic patients with different types of obesity and to find out their interaction with the degree of glycaemic control and serum lipid levels. The study was performed on three groups of non smoker, type 2 diabetic patients, they divided into 15 lean patients, 15 android obese patients and 15 android obese patients. The following parameters were performed: Colorimetric determination of plasma levels of fasting and 2-hours postprandial glucose, cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol and LDL-cholesterol. Determination of TNF- α concentration and plasma ET-1 level. The data were analyzed according to student's "t" test and Peatson's correlation coefficient. TNF- α plasma levels showed significant elevation in android obese as compared to lean diabetic, due to increased expression from adipose tissue (in the visceral fat). TNF- α levels show a significant positive correlation with both BM1

($r=0.69$) and ET-1 ($r=0.85$) in android obese group only. Plasma levels of ET-1 were also found to be significantly high in android obese diabetic as compared to lean diabetics. This was attributed to interaction between TNF- α (present in high levels in android obese patients) and insulin, leading to elevation of ET-1 level. We concluded that the insulin resistance syndrome in android obese type2 diabetic patients is associated with endothelial dysfunction, and the TNF- α & ET-1 could be markers to both.

عبيد السيد علي ابراهيم	مقدم الرسالة:
قيمة وأهمية نسبة الانترليوكين - ٦ وبروتين سي الحساس في مصل مرضى سرطان الغدد الليمفاوية اللاهيجينية The value of Serum Interleukin-6 and C-Reactive Protein Levels in Non Hodgkin's Lymphoma Patients	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ «ماجستير»	تاريخ الجرم:
أ.د/ فتحية خليل ابراهيم د/ أشرف زيدان عبد الله د/ مها عطوة ابراهيم	لجنة الاشراف:

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى ايجاد علاقة ذات دلالة بين مستوى بروتين- سي النشط ومستوى انترليوكين-٦ في مصل مرضى سرطان الغدد الليمفاوية اللاهيجينية مع المؤشر العالمي وكذلك التعرف على دور بروتين سي.

Summary of Thesis

The present study was designed to find the correlation and significance of the level of C-reactive protein with level of IL-6 in newly diagnosed non Hodgkin's lymphoma patients and also with other prognostic factor including international prognostic index (IPI) also to establish the reliability of CRP as a prognostic factor.

مقدم الرسالة:	محمد فيصل محمد
عنوان الرسالة:	'حمض البوليك والسيتوكينات وجزئ الالتصاق - ١ بين الخلايا في هبوط القلب' Uric Acid, Cytokines and Intercellular Adhesion Molecule-1 in Heart Failure
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الباطنة
تاريخ الهمم:	٢٠٢٢/١١/٢٤ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ. د. / نور الدين عبد العظيم محمد د. / محمد حسام الدين مغربى د. / مديحة يونس بخيشت

ملخص الرسالة

فى هذه الرسالة تم تقييم نسبة مستوى حمض البوليك فى الدم ومعامل تنخر السورم الفا وانترلوكين - ٦ وجزئ الالتصاق - ١ بين الخلايا فى مرضى هبوط القلب المزمن مع دراسة تأثير تخفيض مستوى حمض البوليك العالى بالدم فى تحسن هؤلاء المرضى وكان هناك إرتفاع فى مستوى نسب هذه المواد بالدم مع علاقة ذات مغزى بينهم فى هبوط القلب المزمن .

Summary of Thesis

In this work, we study serum levels of uric acid, tumour necrosis factor alpha, interleukin -6 and adhesion molecule-1 in chronic heart failure with study of treatment of hyperuricaemia in improvement of heart failure There is increase in levels of these substances in serum with significant correlation between them in heart failure.

قسم

الامراض الحسية

والنفسية

مقدم الرسالة:	أحمد عبد الرازق أحمد عثمان
موضوع الرسالة:	تأثير الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية على درجة نضج الجهاز العصبي Neurological Maturation of Breast Fed and Formula Fed Infants
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض العصبية والطب النفسى
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	د. أيمان محمد حسين خضر د. وفاء محمد أحمد فرغلى د. صلاح الدين عمرى أحمد

ملخص الرسالة

تساهم الأحماض الأمينية طويلة السلسلة غير المشبعة وخاصة (حمض دوكوسا هكسانويك و اراكيدونيك) بنصيب كبير في بناء الأغشية العصبية الحساسة وخاصة مستقبلات الحساسة لشبكية العين وهذه الأحماض من المكونات الأساسية للبن الأم بينما لا يتسطيع اللبن الصناعى أن يفى هذه الاحتياطات ولذا تهدف هذه الرسالة إلى مقارنة تأثير الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية على درجة نضج الجهاز العصبى وقد أثبتت الدراسة أن سرعة نضج الجهاز العصبى لدى الأطفال المعتمدين على الرضاعة الطبيعية خلال السنة الأولى من عمرهم على أولئك المعتمدين على الرضاعة الصناعية.

Summary of Thesis

The CNS and the retina are enriched in long chain polyunsaturated fatty acids, specifically docosaheaxaenoic acid and

arachidonic acid which are present in human milk but not in most infant formulas. Objective: To evaluate maturation of the CNS in full term healthy formula fed and breast fed infants at one year of age. Studies of term infants suggest that VEP, BAEP and SSEP are more mature in breast fed relative to formula fed infants at one year of age.

مقدم الرسالة:	أسامة محمد مرسى محمد
موضوع الرسالة:	تقييم الوظائف المعرفية في اضطراب الوسواس القهري Assessment of Cognitive Functions in Obsessive-Compulsive Disorder
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض العصبية والطب النفسي
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د. / محمد أحمد عيسى هدهود د. / على عبد العزيز السايح

ملخص الرسالة

الوسواس القهري عبارة عن وسواس أو قهريات متكررة بالشدة الكافية لأن تكون مضيعة للوقت أو مسببة لضغوط شديدة أو إعاقة حياتية مؤثرة . وقد أثبتت الأبحاث وجود اضطراب في الوظائف المعرفية لدى مرضى الوسواس القهري وتعددت التفسيرات في تحديد أسباب هذا الاضطراب . لذا تهدف هذه الرسالة إلى تقييم الوظائف المعرفية في مرضى اضطراب الوسواس القهري والأشخاص الأصحاء واستبيان وجود تأثير لحدة المرض على هذه الوظائف . وقد أثبتت الدراسة وجود خلل في الوظائف المعرفية في الاختبارات اللفظية في اضطراب الوسواس القهري وأن هذا الخلل في الوظائف المعرفية غير مرتبط بحدّة المرض كما أن نوعية الأعراض قد تؤثر على بعض القدرات المعرفية مثل قدرات الذاكرة والاسترجاع البصري .

Summary of Thesis

Obsessive-Compulsive disorder (OCD) is a chronic and often disabling anxiety disorder. Neuropsychological studies suggest that there is impaired cognition in OCD. Abnormal neuropsychological performance in OCD has generally been interpreted to reflect dysfunction of frontal lobe and sub-cortical brain regions. Objective: To evaluate the cognitive functions in OCD and to detect if there is a correlation between severity of symptoms of OCD and degree of cognitive dysfunction or not. Our research suggest that. 1-OCD patient have dysfunction in certain cognitive abilities including, digit symbols, digit span, performance I.Q. (WASI) and impairment of verbal and non verbal memory. 2- there is no correlation between severity of the illness and cognitive impairment in OCD patients.

مقدم الرسالة:	مدحت فتحى حسين
موضوع الرسالة:	تقييم العوامل المساعدة النفسية والغذائية لمرضى الصداع النصفي Assessment of Psychological and Dietary Factors in Migranous Patients
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض العصبية والطب النفسى
تاريخ التقدم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ صفية على تهاسمى أ.د/ حسن محمد محمد فرويز

ملخص الرسالة

يعتبر الصداع النصفي أحد أكثر أعراض أمراض الجهاز العصبي شيوعا حيث يشكل المعانون منه نسبة كبيرة من المترددين على عيادات الأمراض العصبية والنفسية فى مستشفيات جامعة أسيوط. وتتناول هذه الدراسة موضوع الصداع النصفي فى مرضى صعيد مصر من حيث النواحي الآتية: المظاهر الإكلينيكية لهذا المرض فى مرضى صعيد مصر على وجه الخصوص والعلاقة المحتملة بين هذا المرض والسلوك الغذائى للأفراد أو العادات الغذائية لهم لإجراء تقدير كمى لأعراض القلق و الاكتئاب المصاحبة للصداع النصفي. وقد أجريت هذه الدراسة على ٨٧ مريضا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات من الأشخاص: - مجموعة الصداع النصفي المعتاد - أى غير المسبوق بأعراض منذرة وتشمل ٧١ مريضا ومجموعة الصداع النصفي المسبوق بأعراض منذرة وتشمل ١٦ مريضا ومجموعة من المتطوعين المفترض أنهم أصحاء كمجموعة مقارنة وتشمل عشرين فردا من حيث النوع والسن لحالات الصداع النصفي ولقد استخدمت طريقة (أسئلة استطلاع الرأى) والبيان المفصل للغذاء فى تقييم العناصر الغذائية الأكثر شيوعا على مرضى الصداع النصفي مع التركيز على العلاقة

المباشرة بين تناول مثل هذه الأطعمة وحدوث نوبة الصداع النصفي وكانت النتائج كالتالى: ومن الناحية الإكلينيكية: وجد أن المرض أكثر شيوعا ما بين العشرين والتاسعة والعشرين من العمر أى العقد الثالث من العمر - وكذلك فإن الإناث أكثر تعرضا للإصابة به من الذكور ومن ناحية الأعراض المنذرة: وجدت فى كلا الصنفين من الصداع النصفي بما فيه التقلبات المزاجية والعطش والجوع والتثاؤب واختزان الماء تحت الجلد - وآلام الرأس التي وجدت على ناحية واحدة بصورة مطلقة فى ثلاثة أرباع الحالات بنوعها وكان الشعور بالغثيان بالإضافة إلى النفور من الضوء واحمرار الوجه أحد أكثر الشكاوى شيوعا فى هذه الحالات. وشملت أعراض الإفاقة حالات من الإرهاق والتعب والهياج وضعف التركيز مع التغيرات المزاجية وكانت اضطرابات القلق متركزة أساسا فى اضطرابات الانضباطية والخوف من الأماكن المرتفعة والمظلمة وخصوصا فى الصداع النصفي المعتاد. أما عن أهم أعراض القلق فى هؤلاء المرضى فكانت قلة النوم مصحوبة بالعرق والارتعاش والأعراض الاكتئابية التي كانت تعتبر ذات قيمة اجتماعية لصاحبة وفقدان الشهية وقلة الرغبة الجنسية وكان معدل القلق الاكتئاب ٣٧% فى حالات الصداع النصفي التقليدي مقابل ٧٣ و ٨٨% فى الصداع النصفي الشائع ومن ناحية الطعام كانت الشكولاته أكثر أنواع الطعام تسببا فى حدوث نوبات الصداع النصفي (أكثر من ٦٠% من الحالات) وبينما الجبن (٥٦%) والفول فالبيض فاللبن ثم ويسبب لحم اللاتشون والشكولاتة والفول السوداني نوبات معتادة أكثر من السنيات التقليدية - وهذا الفارق ذو مغزى أحصائي وليس هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل ومدة الصداع النصفي وجانب حدوثه وأنواع الطعام فى سن معين أو الجنس أو حدوث نوبات فى أفراد أخرى من العائلة ومما سبق يمكن استخلاص النتائج التالية: أولا - الاضطرابات النفسية سواء كانت توتيرية أو اكتئابية لها علاقة هامة بحدوث الصداع النصفي ومدى شدة نوباته. ثانيا - هناك أنواع من الغذاء ذات تأثير مهيج لنوبات الصداع النصفي بنوعها ولكن ليس لهذه الأنواع أو غيرها علاقة خاصة

بمعدل ومدة وجانب حدوث النوبة أو الأمراض المصاحبة لها من حيث الشكل وهذا يوضح الآتي: - معدل استهلاك الاطعمه المهيجه لا يؤثر على صورة نوبات الصداع ، لكنها تؤدى إلى تهيج النوبات نفسها ولا يمكن تحديد خطوط فاصلة قاطعة بين (نوعى) نوبات الصداع النصفى مما يوحي فى الحقيقة بأن تقسيمه إلى مثل هذين النوعين هو تقسيم افتراضي فى معظم حالاته وأن النوعين ينتميان إلى نوع واحد فى الاصل .

Summary of Thesis

The study was carried out to evaluate the clinical features of Upper Egyptian migrainous patients, to study of a possible relationship between frequency of certain diet consumption and the occurrence of migrainous attacks and to scaling both anxiety and depression symptoms. For this purpose, 67 migrainous patients were selected, 71 common migraine (Without aura) and 16 classic migraine (with aura). The study also included 20 healthy volunteers, with comparable age and sex to the migraine group. The migrainous patients were clinically assessed by questionnaire study to evaluate the clinical profile of the disease in Upper Egypt and a detailed diet sheet to measure the frequency of consumption of certain foods (84 types) which are commonly used with special-intensification about those known to be provoking migraine attacks. Psychological troubles, (anxiety disorders or symptoms and depressive symptoms) are significantly more common in migrainous patients of both types. These troubles could accentuate their pains. The absence of important

statistically significant correlation between frequency of consumption of many provocative foods with the characters of migrainous attacks as their frequency, duration and laterality, this denotes the following. We could not define clear out differences between common and classic migrains in relation to the frequency of consumption of these provocative foods, which means that these two migraine types are not separate entities.

قسم

احراض القلب

www.KitaboSunnat.com

مقدم الرسالة:	داليا يحيى عبد الحميد
عنوان الرسالة:	" تقييم تأثير العلاج الدوائي على التنبؤ المستقبلي في مرضى القصور بالشرابيين التاجية باستخدام النظائر المشعة" Evaluation of Prognostic Effect of Medical Management in Coronary Artery Disease Patients Using Thallium 201 Single Photon Emission Computed Tomographic
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم أمراض القلب والأوعية الدموية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١٢/٢٩ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د / سمير سيد عبد القادر أ. د / عادل حسن عسلام

ملخص الرسالة

إن مرضى القصور بالشرابيين التاجية الراضين للتدخل لتوسيع الشرايين التاجية المصابة يمكن لهم إجراء المسح الذرى للقلب مرة أخرى مع العلاج الدوائي • المرضى الذين يتحسن فيهم المسح الذرى بنسبة ٢٠% أو أكثر يتوقع أن يكونوا أقل عرضة لمضاعفات المرض علي المدى القريب (حوالي ستة أشهر) •

Summary of Thesis

This study may conclude that patients with large reversible perfusion defect on MPI who refuse to revascularization could repeat MPI scan on medical management those who show more than 20%

reduction in the perfusion defect size have favorable short term prognosis revascularization on those patients could be defined for at least 6 months.

مقدم الرسالة:	سحر سعود عبد المنعم
موضوع الرسالة:	العلاقة بين البروتين التفاعلي (C) ، تركيز مضادات الانتيجين الجسمية للبكتريا السبحية (أنثي استربتوليسين O تيتير ومرضى الاحتشاء الحاد لعضلة القلب Relation Between C-Reactive Protein, Antistreptolysin O Titer and Patients with Acute Myocardial Infarction
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم أمراض القلب والأوعية الدموية
تاريخ المهتم:	٢٠٠٢/١٢/٢٩ « ماجستير »
لجنة الاشراف:	أ.د/ نادية محمد سليم أ.د/ محمود يوسف الطحطاوي د/ محمود كامل فراج

ملخص الرسالة

ان تركيزات بروتين سي التفاعلي في حالات الاحتشاء الحاد لعضلة القلب يعتبر وسيلة جيدة للتنبؤ بالمضاعفات القصيرة المدى والطويلة المدى وكدليل لتحديد مدى احتشاء عضلة القلب مع امكانية استخدامه في التنبؤ لحدوث اعادة التروية لعضلة القلب بعد استخدام مذيبيات الجلطة ، بينما تبين عدم وجود علاقة بين تركيزات مضادات الاجسام السبحية O (كدليل للعدوي الحديثة بالبكتريا السبحية) وبين الاصابة بالاحتشاء الحاد لعضلة القلب .

Summary of Thesis

Serum C-reactive protein concentration (acute phase reactant) is a good marker investigated for prediction of early and late post-acute myocardial infarction complications, extent of myocardial infarction, and success of reperfusion after thrombolytic therapy. There is no relation between Antistreptolysin O titer (as a marker for streptococcal infection) and acute myocardial infarction.

مقدم الرسالة:	محمد عبد القني كريم محمود
موضوع الرسالة:	تصلب الشرايين التاجية والاورطي كمؤشر لامراض الشريان التاجي Carotid and Aortic Atherosclerosis as a Predictor of Coronary Artery Disease
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم أمراض القلب والأوعية الدموية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١٢/٢٩ « ماجستير »
لجنة الاشراف:	أ.د/ آمال السيد أيوب أ.د/ سلوي رشدي ديمتري أ.د/ هاني فؤاد حنينا

ملخص الرسالة

توجد علاقة وثيقة بين تصلب الشرايين التاجية للقلب وتصلب كلا من الشرايين التاجية والشريان الاورطي. وتوجد علاقة ذات دلالة احصائية عالية ما بين شدة الاصابة بتصلب الشرايين التاجية ودرجة تصلب كلا من الشرايين السباتية والشريان الاورطي.

Summary of Thesis

There is a strong relation between CAD and either carotid or aortic atherosclerotic plaques. The severity of carotid and aortic atherosclerotic plaques correlated positively with the number of the diseased vessels in coronary angiography. Presence of atherosclerotic

plaques in carotid arteries as detected by TEE appears to be a good predictive of obstructive CAD, and could be used occasionally to avoid the invasive coronary angiography in some circumstances.

مقدم الرسالة:	محمود عبد الصبور عبد الله
موضوع الرسالة:	أهمية الانخفاض الأمامي لجزء الأس تي (يرسم القلب) في حالات الاحتشاء الحاد السفلي لعضلة القلب ودلائلها على وجود انسداد متعدد بالشرايين التاجية Significance of Reciprocal ST-Segment Depression in Acute Inferior Myocardial Infraction and its Prediction to a Multivessel Disease
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم أمراض القلب والأوعية الدموية
تاريخ الهم:	٢٠٠٢/١٢/٢٩ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ سلوى رشدي ديمتري أ.د/ سليمان غريب إبراهيم

ملخص الرسالة

استهدفت الدراسة الحالية معرفة مدى أهمية انخفاض جزء الأس تي الأمامي لرسم القلب الكهربائي وعلاقته بتعدد الإصابة ويتصلب الشرايين التاجية في مرضي الاحتشاء السفلي لعضلة القلب. وقد اشتملت هذه الدراسة على ٣٠ مريضاً، (٢٤ ذكراً و ٦ إناث) أصيبوا باحتشاء حاد سفلي لعضلة القلب تم تقسيمهم طبقاً للتغير بجزء الأس تي إلى ثلاث مجموعات، الأولى كانت فيهم قيمة الانخفاض العظمي لجزء الأس تي أكبر من القيمة العظمي للارتفاع في الأجزاء الخلفية لرسم القلب ، المجموعة الثالثة كانت فيهم قيمة الانخفاض العظمي أقل من القيمة العظمي للارتفاع في الأجزاء الخلفية لرسم القلب ، والمجموعة الثالثة لم يكن بها أي تغير بجزء الأس تي الأمامي لرسم القلب الكهربائي ، وتمت دراسة العلاقة بين هذه المتغيرات وعدد الشرايين التاجية المصابة في كل حالة علي حده باستخدام قسطرة القلب التشخيصية . وقد أوضحت الدراسة أن

معظم مرضي المجموعة الثانية والثالثة قد عانوا من انسداد لشريان تاجي واحد أما المجموعة الأولى فلقد وضح أن هناك أكثر من شريان مصاب بضيق

Summary of Thesis

The purpose of this work was to study the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of associated anterior ST-segment depression with acute inferior wall myocardial infarction to multivessel coronary artery disease. 30 patients with established diagnosis of inferior wall acute myocardial infarction were divided into 3 groups according to the ECG findings. Group I who had max. ST-segment depression in anterior leads ($STD_{max} > max. ST\text{-segment elevation in inferior leads}$ (STE_{max}) was 13 patients, group II who had $STD_{max} < STE_{max}$ consists of 10 patients. Group III had no reciprocal ST-segment depression in ECG's and consisted of 7 patients. We have found that multivessel coronary artery disease was present in the majority of group I patients (69.2%) in whom magnitude of precordial ST-segment depression is greater than ST-segment elevation in inferior leads during acute inferior myocardial infarction. On the other hand, single vessel disease was present in 70% of patients in group II (ST-segment depression in precordial leads $<$ ST-segment elevation in inferior leads) and in 71% in group III (no ST-segment depression).

قسم

الأمراض الصدرية

مقدم الرسالة:	أيمن أحمد فؤاد محمود
موضوع الرسالة:	تقييم دور الإبرة التي تؤخذ عبر الجلد بمساعدة الموجات فوق الصوتية على الصدر في تشخيص إصابات الصدر الطرفية Role of Percutaneous Needle Biopsy Guided by Chest Sonography in Diagnosis of Peripheral Chest Lesions
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الصدرية
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د. / عبد العظيم أحمد أبو الفضل
	د. / جمال محمد ربيع

ملخص الرسالة

هذا البحث أظهر استخدام الموجات فوق الصوتية لمساعدة إجراء أخذ عينة عبر الجلد تناسب إصابات الصدر الطرفية الموجودة بجدار الصدر أو الغشاء البللوري أو إصابات الرئة الطرفية أو إصابات الحيز الحيزومي التي تستطيع الموجات فوق الصوتية رؤيتها . ومن أهم مزايا هذا الفحص رؤية الإبرة داخل الإصابة أثناء أخذ العينة . ورغم أن هذا الفحص يحتاج إلى بعض التدريب واكتساب المهارة، إلا أن هذا الفحص من السهل اكتسابه وأجراؤه في كثير من الحالات التي يتعذر فيها استخدام الأشعة المقطعية .

Summary of Thesis

Ultrasound- guided needle biopsy is well suited for the sampling of those pleural, pulmonary, chest wall and mediastinal lesions that provide adequate acoustic window to transducer. The chest wall, pleural, and peripheral lung lesions are generally hypoechoic relative to their surrounding tissues. A special puncture transducer was used to perform US-guided biopsy with real-time visualization of biopsy needle and the lesion. Although US- guided needle biopsy requires certain expertise, the technique is relatively easy master and can be performed in many situations, where CT-guided biopsy cannot be performed.

مقدم الرسالة:	شريف أحمد عبد الوهاب محمد
موضوع الرسالة:	عامل النخر الورمي ألفا وفقد الوزن في أمراض السدة الرئوية المزمنة. Tumour Necrosis Factor Alpha and Weight Loss in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الصدرية
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ ألفت مصطفى الشناوي أ.د/ سوزان سلامة سيد أ.د/ مها عطوة محمد إبراهيم

ملخص الرسالة

إن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم الحالة الغذائية لمرضى السدة الرئوية المزمنة ودراسة العلاقة بين سوء التغذية ومستوى عامل النخر الورمي ألفا في مصل الدم لهؤلاء المرضى. ومن تلك الدراسة تم استنتاج ما يلي: (١) أن سوء التغذية له آثار سلبية على هؤلاء المرضى. (٢) أن مستوى عامل النخر الورمي ألفا في مصل الدم كان مرتفعاً في مرضى السدة الرئوية ذوي نقص الوزن. (٣) أنه يمكن استخدام وسائل بسيطة (مثل القياسات الأنثروبومترية وقياس مستوى بروتين الألبومين) في التقييم الغذائي لهؤلاء المرضى. وتوصي هذه الدراسة بأهمية العلاج الغذائي لهؤلاء المرضى.

Summary of Thesis

The purpose of this study to evaluate the nutritional status among patients with COPD, and to study the correlation between serum TNF levels and weight loss in those patients. From this study we concluded that: (1) malnutrition has many adverse effects on COPD. (2) serum TNF levels were elevated among malnourished COPD patients. (3) simple tools (like anthropometric measures and serum albumin) can be used for nutritional assessment in those patients. This study recommends the use of nutritional support as an important part for therapy for COPD patients.

مقدم الرسالة:	على عبد العظيم حسن زايد
عنوان الرسالة:	دور البصاق المستحث في تشخيص سرطان الرئة والدرن الرئوى Role of Induced Sputum in Diagnosis of Lung Cancer and Pulmonary Tuberculosis
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الصدرية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	٠١٠ / أشرف زين العابدين محمد ٠ د / رأفت طلعت إبراهيم محمد السكرى

ملخص الرسالة

البصاق المستحث طريقة سهلة وآمنة وفعالة في الحصول على عينة من إفرازات الشعب الهوائية ويمكن الاستفادة من فحص عينات البصاق المستحث في تشخيص المرضى المشتبه إصابتهم بسرطان الرئة أو الدرن الرئوى والذين لا يستطيعون إحضار بصاق تلقائي ويتعذر إجراء المنظار الشعبى لهم ،

Summary of Thesis

Sputum induction is a simple procedure, safe and an effective method on sampling bronchial secretions and can be used in diagnosis of lung cancer and pulmonary tuberculosis in suspected patients who can not give spontaneous sputum and when fiberoptic bronchoscope is not available or contraindicated.

مقدم الرسالة:	محمد حسين محمود سليمان
موضوع الرسالة:	دراسة مستقبلية علي مرض الدرن الرئوى الايجابي البصاق في مستشفى الصدر بأسسوط A Prospective Study on Sputum Positive Pulmonary Tuberculosis at Assiut Chest Hospital
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الصدرية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ عاطف فاروق القرن أ.د/ حنان حارث عبد الرحيم أ.د/ رافت طلعت السكري

ملخص الرسالة

هذا البحث أظهر أن نسبة تحول البصاق الايجابي للمرض إلي السلبى كانت (٦٧,٩٢%) بعد انتهاء الفترة المبدئية للعلاج، و (٩٢,٨٦%) بعد خمس شهور من العلاج، وأيضاً نفس النسبة (٩٢,٨٦%) بعد إكمال فترة العلاج تبعاً لنظام الدوتس. وقد وجد أن أكبر نسبة مناعة لميكروب الدرن كانت تجاه عقار الأوفلوكساسين (٣٤%) وأقل نسبة مناعة كانت تجاه العقار الريفامبيسين (١٥,١%). وكانت المحصلة النهائية لعلاج المرض بنظام الدوتس في البحث كانت كالآتي:- الشفاء التام حدث في ٣٩ مريضاً (٦٥%) منهم ٢٩ من المرضى الجدد و ١٠ من المرضى الذين سبق علاجهم فُشل علاج حدث في ٣ مرضى فقط (٥%). عدم إكمال العلاج حدث في ١١ مريضاً (١٨,٣%). حالات (٦,٧%) تم نقلهم إلي محافظات أخرى لاستكمال العلاج تبعاً لحمل إقامتهم. حدثت الوفاة في ٣ حالات (٥%). بالنسبة لميكروبات الدرن الغير تقليدية، فقد وجدت حالة واحدة (١,٨٨%) من بين حالات البحث الستين.

Summary of Thesis

The rate of sputum conversion to negative was (67.92%) after initial phase, (92.86%) at the end of fifth month and also (92.86%) after completion of treatment, by using DOTS. It was found that the highest incidence of resistance was towards of loxacin (34%) and the lowest incidence of resistance was towards Rifampicin (15.1%). Regarding the outcome of treatment of our study, successful treatment occurred in 39 cases (65%) of them 29 from the newly diagnoses cases, and 10 from the previously treated cases. Treatment failure occurred in 3 cases (5%). Defaulting occurred in 11 cases (18.3%). Four cases (6.7%) were transferred to other governorates of their residence and 3 cases (5%) died. We found one case of atypical mycobacteria (1.88%).

مقدم الرسالة:	محمد عثمان محمد حسن
موضوع الرسالة:	تقييم نظام علاج الدرن القصير المدى تحت الملاحظة (الدوتس) في مدينة أسيوط
	Assessment of Direct Observed Treatment with Short Course Therapy (DOTS) – Assiut City
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الصدرية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د/ ألفت مصطفى نصر الشناوي د/ رافت طلعت إبراهيم السكري

ملخص الرسالة

يعد الدرن واحد من اكبر المشاكل الصحية العامة في الدول النامية فهو يشكل عبئا على جميع الأعمار أكثر من أي مرض آخر مما له من آثار اقتصادية واجتماعية وأهمية صحية وفي الوقت الحالي اعتبر علاج الدرن قصير المدى تحت الملاحظة (الدوتس) العلاج الأمثل في معظم الدول النامية والمتقدمة وقد تم العمل به في العلاج بمحافظة أسيوط منذ شهر أبريل عام ١٩٩٧. هذه الدراسة لتقييم نتائج نظام الدوتس في علاج مرضى الدرن الرئوي والدرن خارج الرئة منذ أبريل ١٩٩٧ حتى مارس ٢٠٠٠ في محافظة أسيوط ونتائج الشفاء منه ودراسة أسباب انتكاس المرض وأسباب فشل العلاج ونسبتها في المرض.

Summary of Thesis

Tuberculosis is one of the major Public Health problems in developing countries. The world health organization (WHO) in 1986

estimated that 8-10 millions new cases of tuberculosis developed every year causing 2-3 millions death annually. Directly observed therapy, short course is now accepted as the treatment regimen of choice for tuberculosis in many developing and developed countries DOTS was applied in Assiut since April 1997. This retrospective and prospective studies to assessment DOTS program in treatment of pulmonary tuberculosis in Assiut City from April 1997 to March 2000 and to show the patient outcome as percentage of cure and causes of relapse and defaulter and its percent to all patient and how to decrease the percentage of defaulter and relapse in this programme.

مقدم الرسالة:	يوسف أحمد يوسف أحمد
عنوان الرسالة:	كفاءة فحص السائل البلوري وعينة بالإبرة من البلورا ومنظار البلورا في تشخيص سبب الانسكاب البلوري Efficiency of Pleural Fluid Examination, Pleural Needle Biopsy and Thoracoscopy in Etiological Diagnosis of Pleural Effusion
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأمراض الصدرية
تاريخ الطبع:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د. / أشرف زين العابدين محمد د. / عاطف فاروق محمد د. / إيمان أحمد محمد

ملخص الرسالة

لقد تم اجراء هذا البحث في مستشفى أسيوط الجامعي في الفترة من يوليو ٢٠٠٠م حتى يوليو ٢٠٠١م واشتمل البحث على عدد (٥٢) مريض كانوا يعانون من الانسكاب البلوري ، وكان الهدف من هذا البحث هو تقويم وتوضيح القدرة التشخيصية لعينة مأخوذة بالإبرة من البلورا من ناحية وتحليل السائل البلوري من ناحية أخرى عندما نستخدم أي منهما على حده او عندما نستخدمهما معا للوصول إلى التشخيص للمرض المسبب للانسكاب البلوري ، وقد تم التوصل من خلال هذا البحث إلى إمكانية تشخيص نسبة كبيرة من حالات الانسكاب البلوري خاصة السرطاني والناجم عن التهابات درنية بالغشاء البلوري عن طريق الفحص الباثولوجي لعينة البلورا المأخوذة بالإبرة والفحص المعملّي للسائل البلوري .

Summary of Thesis

The study was done in Assiut University Hospital during the period between July, 2000 and July, 2001 and included 52 patients with pleural effusion. The aim of this work was to study and evaluate the diagnostic efficacy of pleural fluid examination and pleural needle biopsy for the etiological diagnosis of pleural effusion. It was found that pathological examination of pleural biopsy taken by the pleural needle and cytological examination of the pleural fluid help etiological diagnosis of large number of pleural effusion cases especially of malignant and tubercles origin.

قسم
طب الباطن
الخارج

٢٠٢٢

مقدم الرسالة:	محمد أحمد أحمد شحاته
موضوع الرسالة:	دراسة نفاذية الأمعاء في مرض تليف الكبد A Study of Intestinal Permeability in Patients with Liver Cirrhosis
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم طب المناطق الحارة
تاريخ المنة:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د. / أحمد كامل مصطفى د. / عثمان عبد الحميد عثمان د. / محمد الطاهر عبد الرحمن

ملخص الرسالة

أشتمل البحث على دراسة نفاذية الأمعاء في مرض تليف الكبد بمختلف مراحله تبعاً لتصنيف تشايلد المعدل حيث شملت الدراسة ٤٦ من مرضى تليف الكبد البالغين منهم ٢٤ ذكور و ٢٢ إناث إلى جانب ١٢ شخصاً طبيعياً كمجموعة ضابطة وتبعاً لتصنيف تشايلد المعدل تو تقسيم المرض إلى ٣ مجموعات: ١٢ مريضاً تشايلد (أ) ١٥ مريضاً تشايلد (ب) ١٩ مريضاً (ج) - ٣٤ إجمالي المرضى كان لديهم ارتفاع في ضغط الدم البابي و ٦ من المرضى تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب البريتوني التلقائي و ١٠ مرضى مصابين بتدهور وظائف المخ الناتج عن قصور بالكبد من هؤلاء ٢ مصابين بسرطان الكبد . تمت دراسة نفاذية الأمعاء باستخدام نسبة الإفراز البولي لأكسيلوز والرموز خلال ٥ ساعات من تناول محلول اللاكتيلوز والرموز عن طريق الفم . انتهت الرسالة إلى أن هناك زيادة في نفاذية الأمعاء في مرض تليف الكبد وهذه الزيادة تتناسب مع مدى تليف الكبد تبعاً لتصنيف تشايلد المعدل كما توجد زيادة في نفاذية الأمعاء في مرض تليف الكبد الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم البابي والمصابين

بالتهاب البريتوني التلقائي والمصابين بدهور وظائف المخ الناتج عن تدهور وظائف

الكبد .

Summary of Thesis

This study included 46 patient with liver cirrhosis 24 males X individual as a control group. According to modified Child- Pugh classification the patient were classified into 3 groups: 12 patients child (A) 15 patients child (B) 19 patients child (C). Intestinal permeability was assessed by lactulose L-rhomnose ratio excreted in urine there is increase in permeability in cirrhotic patients with hepatic encephalopathy and spontaneous bacterial peritonitis and portal hypertension.

مقدم الرسالة:	ناهد أحمد على حسن مخلوف
موضوع الرسالة:	مسح استكشافى للجسام المناعية للبروسيللا في السيدات اللاتي تعاني من فشل في الإنجاب Screening for Brucella Antibodies Among Females With Reproductive Failure
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم طب المناطق الحارة
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / عبد الغنى عبد الحميد سليمان د. / أشرف محمود عثمان د. / علوانى الدريمى السنوسى

ملخص الرسالة

كان الهدف من الدراسة محاولة معرفة العلاقة بين مرضى البروسيللا وفشل الإنجاب في السيدات الدخول بمستشفى أسبوط الجامعى بقسم النساء والتوليد وقد اشتمل البحث على ١٨٠ سيدة تعاني من فشل في الإنجاب وتم التقسيم لثلاث مجموعات ١٢٥ سيدة تعاني من سقط الجنين و ٣٠ سيدة تعاني من موت الجنين داخل الرحم و ٢٥ سيدة تعاني من ولادة مبكرة ومجموعة رابعة ضابطة تتكون من ٤١ حالة . وقد تبين من خلال البحث أن مرض البروسيللا الحاد يمثل ٢٧٧% من حالات فشل الإنجاب وبالرغم من أن هذه النسبة صغيرة إلا أن مرض البروسيللا الحاد لابد أن يوضع في الاعتبار أثناء تشخيص حالات فشل الإنجاب .

Summary of Thesis

The aim of the work of this study is to find a possible relation ship between Brucella infection and reproductive failure in Assuit Governorate. This study included 180 women with reproductive failure classified into 3 groups, group I included 125 women with abortion, group II 30 pregnant women with intrauterine fetal death, group III 25 women with preterm delivery, another group (group IV) as control group (normal delivery group). The results showed among 180 women with reproductive failure only 5 cases showed positive serology for acute Brucella infection by both Rose Bengal test and elevated IgM antibody level by ELISA. Acute Brucella infection as a possible cause of reproductive failure represent 2.77%, although this percentage is low but acute Brucella infection must be taken in consideration during the investigation of cases of reproductive failure.

قسم

الامراض الجلدية

والنفسية

علي محمد عبد الرحمن مهران	مقدم الرسالة:
'التغيرات الاكلينيكية والباثولوجية والهرمونية في مرضى انعدام الحيوانات المنوية وعلاقتها بشكل الخلية الحاضنة' Clinicopathological and Hormonal Changes in Azoospermic Patients and their Relation to Sertoli Cell Morphology	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم الأمراض الجلدية والتناسلية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »	تاريخ المقم:
أ.د/ إتصاف محمد عبد المجيد	لجنة الإشراف:
أ.د/ عزة محفوظ عبد المجيد	
أ.د/ نرمين عبد المنعم حسن كامل	

ملخص الرسالة

تناسل الذكور أصبح عنصراً متزايد الأهمية في العقم خلال العقود الأخيرة. لا نعرف سوى القليل عن أسباب ومنشأ نقص تكون الحيوانات المنوية وذلك لان آليات تكون الحيوانات المنوية لا تزال غير واضحة ، وهذا يفسر كثرة التحاليل الطبية التي قد نحتاجها قبل الوصول إلى تشخيص نهائي في عدد من حالات قلة الخصوية عند الذكور، ومن بين هذه التحاليل تحليل السائل المنوي والذي يعتبر حجر الزاوية في تقييم حالات عقم الذكور، تحليل الهرمونات والخزعة الخصوية، وقد نحتاج إلى إجراء تحاليل أخرى معقدة في بعض الحالات. تحليل السائل المنوي لمرضى العقم قد يظهر انعدام للحيوانات المنوية، وهذه المجموعة من المرضى تعاني إما من انسداد في القنوات التناسلية أو توقف نضج الحيوانات المنوية وهو الاحتمال الأكثر حدوثاً وهو ما يحتاج إلى عمل تحاليل أخرى لقياس الهرمونات في الدم وفحص أنسجة الخصية للوصول إلى مسبب

هذه الحالة. يتأثر تكون الحيوانات المنوية الطبيعي بهرمونات عديدة. من أهمها الهرمون المحفز لحويصلة جراف والهرمون اللوتيني والهرمون الخصوي. وهذا هو سبب أهمية قياس هذه الهرمونات بالدم في المرضى الذين يعانون من انعدام بالحيوانات المنوية بالوسائل المنوي. قياس نسبة الهرمونات بالدم قد يشير إلى وجود توقف نضج الحيوانات المنوية أو وجود انسداد بالقنوات التناسلية. وقد يشير أيضاً إلى وجود سبب صمي وهذا أقل حدوثاً ولكن قابل للعلاج إلى حد ما.

Summary of Thesis

Male reproduction has become an increasingly important factor in infertility during recent decades. Too little is known about the reasons and pathogenesis of deficient spermatogenesis because the intimate mechanisms of normal spermatogenesis have been only partially elucidated. This explains the presence of large number of investigations that might be needed to reach a final diagnosis in a case of male infertility. Among these investigations are conventional semen analysis which is the corner stone in assessment of subfertile male, hormonal assay and testicular biopsy. Further sophisticated investigations might be needed in some cases. Conventional semen analysis of subfertile males might show azoospermia patients suffer either from an element of obstruction or from spermatogenic maturational largest which is more common. These patients need further investigations to evaluate the hormonal profile and testicular histopathology in order to reach an aetiology of this condition.

Normal spermatogenesis is influenced by many hormones. The most important of them are FSH, LH, and testosterone. That's why serum level measurement of these hormones is of marked significance especially in these patients suffering from azoospermia. Hormonal profile may suggest the presence of spermatogenic maturational arrest or obstructive azoospermia. Hormonal profile may also shed light on an endocrine cause of infertility which is relatively uncommon but potentially curable.

قسم

طب الأطفال

مقدم الرسالة:	أمل أحمد حسن إسماعيل
موضوع الرسالة:	"دراسة مرجعية عن بعض الجوانب الإكلينيكية والمعملية للأطفال اللذين تم وضعهم على جهاز التنفس الصناعى بوحدة العناية المركزة"
	Retrospective Study on Some Clinical and Laboratory Aspects of Mechanically Ventilated Children in The Pediatric Intensive Care Unit
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم طب الأطفال
تاريخ المهم:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د. / الحسن محمد على د. / زينب محمد مجيب الدين

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة المرجعية للتعرف على مجموعة من الخصائص الديموجرافية الإكلينيكية والمعملية المرتبطة بنتائج عملية الأفاقية القلبية التنفسية والتنفس الصناعى . اشتملت هذه الدراسة على ١٧٠ حالة من المرضى الأطفال من ذو الحالات الحرجة وقد تم إجراء أفاقية قلبية تنفسية لهذه الحالات بوحدة العناية المركزة أو وضعوا على ماكينة التنفس الصناعى بالإضافة إلى ذلك اشتملت الدراسة على ١٥٠ من المرضى الأطفال من ذو الحالات الحرجة التى لم تتطلب عملية أفاقية أو الوضع على ماكينة التنفس الصناعى والممثلين لمجموعة مرضى الدراسة في السن والجنس والتشخيص وقد تم اعتبارهم كمجموعة ضابطة وقد استخلصنا من النتائج أن معدل بقاء اللذين تم توصيلهم إلى ماكينة التنفس الصناعى على قيد الحياة في هذه الدراسة معادل لما تدل عليه الدراسات العالمية المقارنة ومن الحتمى في كل حالات المرضى ذو الحالات الحرجة إن يتم تقييم بعض الجوانب الإكلينيكية والمعملية حالة دخول المرضى

لوحدة العناية المركزة حيث إن هذه الجوانب من الممكن إن تتنبأ بمستقبل هذه الحالات التي أجرى لها عملية الأفاقة القلبية التنفسية أو تم توصيلهم على ماكينة التنفس الصناعي وأيضا يجب الاهتمام بالتعامل مع حالات أمراض القلب والجهاز الدورى (حالة العيوب الخلفية للقلب وروماتيزم القلب) حيث أن هذه الحالات كانت الأكثر عرضه للوفاة.

Summary of Thesis

This retrospective study was designed to identify q series of demographic, clinical, laboratory and arrest characteristics associated with cardiopulmonary resuscitation (CPR) and mechanical ventilation (M.V)outcome. The study included 170 critically ill pediatric patients undergoing CPR and/or M.V. In addition, 150 critically ill pediatric patients not needed CPR or M.V of matchable, sex and diagnosis were considered as controls.

علم الدين محمد عبد الله	مقدم الرسالة:
مرض السكر في الأطفال: بعض طرق التشخيص الإكلينيكية والمعملية - Childhood Diabetes Mellitus: Some Clinical and Laboratory Diagnosis.	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم طب الأطفال	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)	تاريخ المزم:
أ.د. الحسن محمد على د. مصطفى شفيق خلف د. شعبان رضوان هلال	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

هذه الرسالة أثبتت أهمية عوامل التفاعلات الحادة (سرعة الترسيب / عامل بروتين سى التفاعلى) والعوامل الخاصة بتلف وظائف الخلايا (عامل فون ويلى براند) في الكشف المبكر عن حالات مرض السكر من النوع الأول في الأطفال وكذلك أهميتها في منع المضاعفات الخاصة بمرض السكر من النوع الأول في الأطفال .

Summary of Thesis

This study demonstrated the acute phase reactants (ESR, CRP) and markers of endothelial cell dysfunction (bWf) can be used as useful markers for early detection and prevision of complication of type 1 diabetes mellitus (insulin-dependent diabetes mellitus) in children.

مقدم الرسالة:	قاسم عثمان قاسم
موضوع الرسالة:	<p>“نشاط أنزيم السوبر أوكسيد ديسمنايوتيز والدهن الفوق الأكسدي في الأطفال الذين يعانون من أمراض الأنسجة الضامة”</p> <p>Erythrocyte Soperoxoxide Dismutasf Activity and Plasma Malondialdehyde Level in Children With Collagen Diseases</p>
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم طب الأطفال
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	<p>د . أحمد جاد الرب السيد عسكر</p> <p>د . حنان أحمد نعمان</p> <p>د . سمية عبد الرحمن محمد</p>

ملخص الرسالة

لقد تم إجراء هذا البحث في مستشفيات جامعة أسيوط في الفترة من يناير ٢٠٠٠ حتى يونيه ٢٠٠١ وأشتمل على ٢٧ مريض كانوا يعانون من أمراض الأنسجة الضامة وكان الهدف من إجراء هذا البحث هو تحديد الدور الذي يقوم به الاضطراب الأكسدي الناتج عن وجود الشقائق الحرة في باثولوجية حدوثها ومدى إمكانية كاسحات الشقائق الحرة في علاج هذه الأمراض ولقد ثبت أن أمراض الأنسجة الضامة تعتبر أمراض ناتجة عن اضطراب أكسدي وينصح باستخدام كاسحات الشقائق الحرة في أنظمة علاج هذه الأمراض .

Summary of Thesis

This study was done in Assiut University Hospital in the period from January 2000 to June 2001 included 27 patients were complaining of collagen diseases, The goal of the study was to find the rule of oxidant stress and free radical in the pathogenesis of collagen diseases and the possibility of addition of antioxidants in the regimens of their treatment. It was found that collagen diseases are diseases of oxidant stress and it is advised to use the antioxidants in the regimens of their treatment.

مديحه محمد محمد السعدي	مقدم الرسالة:
دراسة إكلينيكية معملية عن الإسهال المدمم في الأطفال Clinical Laboratory Study on Bloody Diarrhea in Children	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم طب الأطفال	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٦/٣٠ « ماجستير »	تاريخ المنع:
أ.د / فردوس هاتم عبد العال د / حنان أحمد نعمان د / منسى أمين حسن	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

اشتملت الدراسة على ١٠٠ طفل يعانون من الإسهال المدمم منهم ٥٨ حالة إسهال حاد (٤٢) حالة إسهال مزمن وتم عمل فحص إكلينيكي وتم عمل تحليل ومزرعة براز وصورة دم لكل الحالات وتم إعطاء ٤٠ حالة سيفوتاكسيم ومتابعة تحسن الحالات بعد العلاج وقد وجد أن أهم أسباب الإسهال المدمم هو الميكروب المعوي النموذجي ويلييه ميكروب السالمونيلا والشيجيلا وقد وجد أن التحسن في حالات الإسهال المزمن التي عولجت سيفوتاكسيم أكثر من الحالات التي لم تعطى سيفوتاكسيم .

Summary of Thesis

The study includes 100 child suffering from bloody diarrhea (58 cases with acute diarrhea and 42 cases with chronic diarrhea). The cases were evaluated clinically and stool analysis, culture and blood

picture were done to all cases 40 cases were given cefotaxim and the clinical improvement was evaluated after treatment. We found that the most important organism responsible for bloody diarrhea was *E-coli* followed by *Salmonella* and *Shiglla* and the rate of improvement in cases treated with cefotaxim was higher than cases not given cefotaxim.

ياسر أحمد محمد	مقدم الرسالة:
الإصابة العامة الحادة لأعضاء الجسم عقب اختناق الطفل في فترة ماحول الولادة Acute Systemic Organ Injury After Perinatal Asphyxia	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم طب الأطفال	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)	تاريخ المزمع:
أ. د. السيد خليل عبد الكريم د. زينب محمود القاضي د. نجوى علي محمد	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

اشتملت الرسالة على خمسين طفلاً حديث الولادة وكان عامل إيجار في هؤلاء الأطفال بعد ٥ دقائق أقل من ٧ بالإضافة إلى عينة ضابطة مكونة من ٢٠ من الأطفال الأصحاء للمقارنة وقد تم أخذ التاريخ المرضي للأمهات وتقييم عدد ونوع أجهزة الجسم المتأثرة بالاختناق حول الولادة مع عمل أشعات وتحاليل للمرضى والعينة الضابطة وتم تحليل النتائج ولوحظ أن الكلى هي أكثر الأعضاء تأثراً يتبعها بعد ذلك الجهاز الدوري ثم العنبي ثم الجهاز التنفسي ثم حدوث التجلط المنتشر داخل الأوعية الدموية ثم التهاب المعدة والقولون التكرزي

Summary of Thesis

The study included 50 newborn infants with a 5 minutes Apgar score < 7 as well as 20 apparently normal newborn infants as controls.

Full history and clinical assessment including maternal illness, number and type of organ affections were done. All cases and controls were assessed by some radiological and laboratory investigations. The kidney was the most frequently affected organ followed by CVS, CNS, respiratory system, DIC and NEC respectively.

قسم

البيولوجيا

الانسانى

مقدم الرسالة:	تفريد أبو بكر أحمد شكرى غزالى
موضوع الرسالة:	مستقبل سى كت (مجموعة التمييز ١١٧) في سرطان الدم النخاعى الحاد C-Kit Receptor (CD117) in Acute Myeloid Leukemia
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الباثولوجيا الإكلينيكية
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / محمد رأفت خلف أ.د. / عزة محمود كامل د.د / شريف حلمى جلال

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على ٦٠ مريضاً (ثمانية وخمسين مصاباً بإبيضاض الدم النخاعى الحاد وأسنان مصابين بإبيضاض الدم ثنائى النوع) ولقد أظهرت نتائج الفحوص إيجابية مجموعة التمييز ١١٧ في ٢٤,١٤ % (أربعة وعشرون وأربعة عشر من مائة في المائة) من الحالات ووجدت دلالة إحصائية هامة بين إيجابية مجموعة التمييز ١١٧ السطحية ومجموعة التمييز ٣٤ ومما سبق يتضح ان مجموعة التمييز ١١٧ هي دلالة من دلالات خلايا النخاع الجذعية

Summary of Thesis

This study was performed on 60 patients, 58 AML and 2 BAL. CD 117 expression was detected in 24.14% of AML cases with no

significant correlation with FAB subtypes. There was a significant correlation between CD 117 and CD 34 expression ($P \leq 0.001$). There was no statistically significant correlation between CD 117 and other myeloid specific markers as CD 13 and CD33. CD117 is a stem cell and / or progenitor marker more than a myeloid specific marker.

مقدم الرسالة:	دعاء فتحي حجاج أحمد
موضوع الرسالة:	أنترلوكين-١٥ في التهاب المفاصل الروماتويدي Interleukin-15 in Rheumatoid Arthritis
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الباثولوجيا الإكلينيكية
تاريخ الهم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ أسامة بكر صديق عثمان د/ سميرة عبد الرحمن محمد د/ سونيا محمد رشاد

ملخص الرسالة

شملت هذه الرسالة ٤٤ مريضا بالتهاب المفاصل الروماتويدي ٢٢، في المرحلة النشطة للمرض (مع وجود السائل السينوفي في المفاصل) ٢٢ مريضا في مرحلة هجوع المرض ، وصنفت المجموعة الثانية إلى ١٢ مريضا في المرحلة الأقل حدة للمرض ، و ١٠ مرضى في المرحلة المزمنة ، وقد تم تصنيف مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي أيضا حسب وجود عامل الروماتويد في المفصل إلى ٣٠ مريضا ايجابيا لعامل الروماتويد و ١٤ مريضا ساليا. وقد تم عمل الفحوص المعملية الروتينية (صورة دم كاملة- سرعة الترسيب- بروتين سي التفاعلي- عامل الروماتويد في المصل) والفحوص الخاصة (أنترلوكين-١٥ في المفصل والسائل السينوفي- عد كرات الدم البيضاء الكلي والنوعي في السائل السينوفي).

ونستنتج من ذلك أن أنترلوكين-١٥ يلعب دورا هاما في حدوث مرض التهاب المفاصل الروماتويدي ويمكن استخدام أنترلوكين-١٥ كدلالة لنشاط المرض.

Summary of Thesis

This study included 44 RA patients, 22 with active disease presented mainly by synovial inflammation and effusion and 22 were in remission. Patients in remission were subclassified into: 12 patients were in subacute stage and 10 patients in chronic stage. RA patients were also subclassified according to presence of rheumatoid factor into: seropositive-RF patients (n= 30) and seronegative RF patients (n= 14). The following laboratory investigations were performed routine investigations (peripheral haemogram, erythrocyte sedimentation rate (ESR), c-reactive protein (CRP) and rheumatoid factor (RF)) and special investigations (IL-15 level in serum and synovial fluid and total and differential WBCs count in synovial fluid). From this study we concluded that, IL-15 can play a role in the pathogenesis of RA and it can be used as a parameter of disease activity.

مقدم الرسالة:	سمر محمد جلال أبو الوفا
عنوان الرسالة:	مستويات (الأنتيجن الكربوهيدراتي - ١٢٥) في المصل كدلالة لأورام مؤكدة في متابعة أورام الغدد الليمفاوية اللاهودجيكية Serum (Carbohydrate Antigen 125) Levels as a Reliable Marker for Follow up of Non Hodgkin's Lymphoma (NHL)
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الباثولوجيا الإكلينيكية
تاريخ الظم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / زينب عبد المال عبد الحفيظ د / حنان حارث عبد اللطيف د / طه زكــــــــــــــــسي مهران

ملخص الرسالة

يتكون الأنتيجن الكربوهيدراتي ١٢٥ من جليكو بروتين ويوجد هذا الأنتيجن بالأنسجة الطبقية المشنقة من الخلايا الظاهرية الجوفية لأورام المبيض وقد استخدم هذا الأنتيجن الكربوهيدراتي ١٢٥ للنتبع أثر العلاج على المرضى المصابين بأورام الغدد الليمفاوية اللاهودجيكية وقد أجريت هذه الدراسة على عشرين مريضا وعشرة آخرين أصحاء وقد وجد التالي: يزداد معدل الأنتيجن الكربوهيدراتي ١٢٥ في مرضي الغدد الليمفاوية والذين يعانون من اشتغال باطني متشعب .

Summary of Thesis

Carbohydrate antigen 125 (CA125) is a glycoprotein found in normal tissue derived from coelomic epithelium its upper limit in the serum 35 IU/ml. It is expressed by epithelial ovarian tumors and its levels are commonly used to monitor response to therapy of patients with ovarian carcinoma. This study aimed to follow up patients with Non Hodgkin Lymphoma using CA125 levels decreased with (CHO) chemotherapy as a first line of treatment.

عبيد مصطفى مصطفى درويش	مقدم الرسالة:
الخلل الكروموسومي في سرطان الدم النخاعي المزمن باستخدام صبغة جيمسا التحزمية Chromosomal Abnormalities in Chronic Myeloid Leukaemia by Giemsa Banding	عنوان الرسالة:
كلية الطب - قسم الباثولوجيا الإكلينيكية	الكلية والقسم:
٢٠٢٢/١١/٢٤ م (ماجستير)	تاريخ المنح:
أ. د. / محمد رأفت خلف د. / فريدة حسن عبد الرحمن د. / شعبان رضوان هلال	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تضمنت هذه الرسالة واحد وعشرين مريضاً وتم عمل صورة دم كاملة وبزل نخاع عظم وفوسفاتاز قلوي ودراسة كروموسومات الخلية باستخدام صبغة جيمسا التحزمية وجاءت النتائج مؤكدة على دور علم دراسة الكروموسومات في تشخيص وتقسيم سرطان الدم النخاعي المزمن •

Summary of Thesis

This study included 21 C.M.L. Patients for all complete blood picture, bone marrow aspirate, alkaline phosphatase scoring and karyotypic analysis using Giemsa banding technique. The results confirm that the cytogenetic studies have an important role in diagnosis, classification and prognosis of chronic myeloid leukaemia.

مقدم الرسالة:	غادة محمد سيد
موضوع الرسالة:	القيمة التشخيصية للدلالات الكيميائية الحيوية لسائل الارتشاح البللوري Diagnostic Value of Biochemical Markers in Pleural Effusion
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الباثولوجيا الإكلينيكية
تاريخ التخرج:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	د. / خديجة عبد الشافع عبد المجيد د. / عاطف فاروق محمد د. / مديحة يونس بخير

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على تسعة وسبعين مريضاً جميعهم مصابون بالارتشاح البللوري. ولقد قسم المرضى إلى مجموعات: ١- طبقاً للفحص الخلوي للارتشاح البللوري: أ- مجموعة الأمراض الحميدة: وتشمل ٤١ مريضاً ب- مجموعة الأورام الخبيثة: وتشمل ٣٨ مريضاً. ٢- طبقاً لنسب البروتين بالارتشاح البللوري: أ- الارتشاحي (منخفض البروتين) (المجموعة الأولى): أقل من ٣٠ جرام لكل لتر ويشمل ٢٧ مريضاً ب- الارتشاحي (مرتفع البروتين) (المجموعة الثانية): أكثر من ٣٠ جرام لكل لتر ويشمل ٥٢ مريضاً. وقد وجد: ١- درجة الفرق بين المصل وسائل الارتشاح البللوري لكل من البروتينات الكلية والاليومين واللاكتات دي هيدروجيناز دلالات ممتازة في تفرقة سائل الارتشاح البللوري مرتفع البروتين من سائل الارتشاح منخفض البروتين ٢- نسبة سائل الارتشاح البللوري إلى المصل لكل من البروتينات

الكلىة والالبومين واللاكتات دى هيدروجيناز دلالات ممتازة في تفرقة سائل الارتشاح
البللورى مرتفع البروتين من سائل الارتشاح منخفض البروتين .

Summary of Thesis

The initial step in determining the cause of pleural effusion is to categorize effusion as a transudate or exudate. Transudate develop when there is a change in systemic factors such as congestive heart failure or hypoproteinaemia and it does not require diagnostic investigations. However, an exudate effusion always require more extensive and invasive diagnostic investigations. Since exudate are the result of pleural or other pulmonary pathological conditions or lymphatic obstruction. Moreover, the differentiation between malignant and non-malignant is of significant importance.

هالة سمير سعد	مقدم الرسالة:
قيمة مستقبلات الترانسفيرين في مصل الدم في التشخيص المبكر لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد في مرض الفشل الكلوي المزمن The Value of Serum Transferring Receptors in Early Diagnosis of Iron Deficiency Anemia in Chronic Renal Failure	عنوان الرسالة:
كثية الطب - قسم الباثولوجيا الإكلينيكية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)	تاريخ الهم:
أ.د / حامد أحمد سليمان د / سعيد محمد أحمد د / أشرف أنور الشاذلي	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

أجريت هذه الرسالة على عينات من ٧٠٠ مريض من مرضي الفشل الكلوي المزمن وتبين أن هناك زيادة ذو دلالة إحصائية في نسبة الترانسفيرين في مصل الدم مقارنة بالمجموعة الضابطة كما أنه لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين المجموعة التي تعالج بالاريترونيوتين والمجموعة الضابطة ووجد زيادة ذو دلالة إحصائية بين المجموعة قبل الغسيل الكلوي مقارنة بالمجموعة التي تعالج بالاريترونيوتين .

Summary of Thesis

Serum transferring receptor show significance increase in predialysis and regular analysis groups compared to control group, but

there is no difference between group on rheum treatment and control group. There is significant increase of s TFR in predialysis group when compared to group on rHuEPO treatment.

مقدم الرسالة:	وفاء صلاح مجاهد سيد
عنوان الرسالة:	دراسة باثولوجية إكلينيكية لبعض عوامل الدم في الدورة الحيضية الطبيعية والمستحثة Humoral and Clinical-Pathological Studies of Spontaneous and Stimulated Menstrual Cycle
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الباثولوجيا الإكلينيكية
تاريخ التمتد:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	١٥٠١ / محمود يوسف الطحطاوى د / ميمى أحمد محمد كامل د / شريف حلمى جلال

ملخص الرسالة

أجريت الرسالة على خمسين سيدة من اللاتي يترددن على العيادة الخارجية للمعقم، عشرون سيدة منهن لديهن دورة شهرية طبيعية مصاحبة للتبويض ، وعشرون سيدة لديهن دورة شهرية بدون تبويض بسبب تكيس المبيض ، وعشرة سيدات اعددن لإجراء أطفال الأنابيب بطريقة الحقن المجهري عن طريق العقاقير الحاثثة لزيادة التبويض وقد تم عمل فحص إكلينيكي كامل والفحوص المعملية الآتية: فحوص روتينية وتشتمل على صورة دم كاملة ووظائف الكبد ووظائف الكلى ، فحوص خاصة بالبحث وتشتمل على - هرمون الاستروجين والبروجسترون وهرمون حث الحويصلات وهرمون الجسم الأصفر ، - انترلوكين - ٦ قم المصل والسائل الحويصى ، - عامل النمو - ٢ المشابه للانسولين فى المصل والسائل الحويصى ، هذه الدراسة تقارن بين مستوى انترلوكين - ٦ وعامل النمو - ٢ المشابه للانسولين فى كل من المجموعات الثلاثة كما توضح دور انترلوكين - ٦ فى ظاهرة حث المبيض .

Summary of Thesis

This study was performed on fifty women who attending the out patient infertility treatment clinic 20 women with normal ovulatory cycle, 20 women anovulatory cycle due to PCCS and 10 women undergoing COH for assisted reproduction by ICSI. Complete clinical examination and the following investigations were done: Routine investigations include peripheral hemogram kidney function tests and liver function tests. Special investigators include: Hormonal profile including E₂, Progesterone, FSH and LH. Interleukin-6 in serum and follicular fluid. Insulin like growth factor II in serum and F.F. This study compare the level of IL-6 and IGF-II in these three studied group also study the possible role of IL-6 in the pathogenesis of ovarian hyper stimulation syndrom.

قسم

الجرارة الحادة

أحمد محمد علي عبد الله	مقدم الرسالة:
استخدام منظار البطن في تشخيص وعلاج حالات آلام البطن الحادة Diagnostic and Therapeutic Roles of Laparoscopy in Acute Abdomen	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم الجراحة العامة	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)	تاريخ المزمع:
أ.د. / أحمد توني زيان	لجنة الإشراف:
د. / عبد المنعم إسماعيل الخطيب	

ملخص الرسالة

تعتبر حالات آلام البطن الحادة من الحالات العديدة والكثيرة التي تواجه الجراح في مجال عمله وفي بعضها توجد صعوبة في تشخيص تلك الحالات بالرغم من العديد من الفحوصات المتوفرة وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنه يمكن استخدام منظار البطن في تشخيص وإيضاح علاج مثل تلك الحالات والتهابات الزائدة الدودية والمرارة وأيضا قرح الإثني عشر المتفجرة والانسداد المعوي بنتائج مرضية .

Summary of Thesis

In acute abdomen. laparoscopy has both diagnostic and therapeutic roles Many studies have demonstrated an improvement in surgical decision making associated with its use particularly when the need for operation is uncertain. Conditions causing acute abdominal pain for which laparoscopy with or without laparoscopic surgery has a

potential role including acute appendicitis, perforated peptic ulcer, acute cholecystitis, intestinal obstruction caused by band adhesions, acute diverticulitis and abdomen trauma.

مقدم الرسالة:	محمد حسن عثمان
موضوع الرسالة:	استخدام الليزر في علاج أمراض تجويف الفم Laser Therapy of Intra-oral Lesions
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الجراحة العامة
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د. / أحمد تونى زيان أ.د. / صلاح الدين جابر شلتوت د. / هانى عبد الكريم عيسى

ملخص الرسالة

أجريت الرسالة على ٥٠ مريضاً يعانون من أمراض في تجويف الفم تم علاجهم باستخدام الليزر وقد أسفرت الرسالة عن نتائج جيدة من حيث تقصير مدة الجراحة ومدة المكوث في المستشفى وقلة النزيف أثناء الجراحة وعدم حدوث آلام أو التهابات في الجروح .

Summary of Thesis

In this work 50 patients with different types of intra-oral lesion were treated by use of laser. There was shorter operative time, less blood loss, less incidence of post operative pain and oedema with marked reduction of hospital stay and there was no need for post operative treatment or analgesics.

مقدم الرسالة:	أحمد كمال عثمان عبد الرحيم
موضوع الرسالة:	تقييم وعلاج حروق صوان الأذن Management of Burned Auricles
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الجراحة العامة
تاريخ الملص:	٢٠٠٢/١١/٢٤ «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د/ محمود عبد العزيز العتيقي أ.د/ أحمد توني زيان أ.د/ مصطفى عبد الحافظ السنباطي أ.د/ حلمي أحمد شلبي

ملخص الرسالة

تتكون الرسالة من ٩٢ صفحة بأبوابها المختلفة واشتملت علي ٦٩ مرجعاً ولقد تناولت الرسالة طرق علاج التهابات الأذن الخارجية بعد الحروق بدرجاتها المختلفة وكانت النتيجة أن الوقاية في حالات حروق صوان الأذن خير من العلاج والتشخيص المبكر وسرعة التدخل الجراحي لإزالة أي أنسجة غير حية عن طريق فتحة صغيرة أو عن طريق شق الأذن رأسياً إلى نصفين يقتل من حدوث التشوهات.

Summary of Thesis

This thesis represents prospective study includes 40 burned auricles. 90% of the cases achieved excellent results and 10% of the cases developed chondritis. Prevention is the key, as the treatment of an established infection frequently lead to deformities.

أسامة إبراهيم نظير	مقدم الرسالة:
<p>“أنماط أمراض الغدة الدرقية التي سوف تجري لها جراحة بمستشفى أسبوط الجامعي في الفترة من أبريل ٢٠٠١ إلى أبريل ٢٠٠٢”</p> <p>The Pattern of Thyroid Diseases Undergoing Surgery in Assiut University Hospital During the Period from April 2001 to April 2002</p>	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم الجراحة العامة	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ (ماجستير)	تاريخ المنح:
أ.د/ فاروق أحمد مراد د/ هشام علي رياض د/ اعتماد حلمي ياسين	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

ان أمراض الغدة الدرقية شائعة الحدوث في مجتمعنا ، علاوة علي ذلك فهي تمثل نسبة معقولة من ممارستنا في قسم الجراحة العامة . وهذه الامراض هي تضخم الغدة الدرقية متعددة الفصوص دون زيادة في نشاط الغدة ، تضخم الغدة الدرقية التسمي الاول والثانوي وأحادي الفص والتهابات الغدة الدرقية والاورام الحميدة والخبيثة للغدة الدرقية . وتعتمد الطريقة الجراحية المستخدمة علي توافر واستخدام الوسائل التشخيصية المختلفة وذلك بعمل توافقي بين الفحص الاكلينيكي لجميع الحالات والفحوصات المعملية لبعض الحالات والموجات فوق الصوتية لجميع الحالات والمسح الذري لبعض الحالات وأخذ عينة بالابرة من الغدة الدرقية لبعض الحالات والفحص الميكروسكوبي .

Summary of Thesis

This research – work was carried out during the period from April 2001 to April 2002 for determination of different patterns of thyroid diseases managed in our hospital by making a correlation between the clinical evaluation and investigations as thyroid function tests, thyroid sonography, isotope scanning, FNAC and histopathology to help early and rapid diagnosis of thyroid diseases. Exploration of both lobes of thyroid gland was also done for all cases.

أشرف جمال طه موسى	مقدم الرسالة:
ديناميكية الدورة الدموية بالناسور الشرياني الوريدي الجراحي المستخدم للغسيل الكلوي Haemodynamics of Surgically Created Arterio- venous Fistula for Haemodialysis	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم الجراحة العامة	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ «ماجستير»	تاريخ المنح:
أ.د/ فوزي محمد مصطفى أ.د/ حسن بكر البدوي د/ محمد علاء الدين مبارك د/ أحمد فتحي أحمد الجبالي	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى دراسة العديد من التغيرات الخاصة بديناميكية الدورة الدموية بالوريد الإبطي وكذلك الشريان الكعبري أو المرفقي قبل وبعد عمليات الناسور الشرياني الوريدي الجراحي المستخدم للغسيل الكلوي وكذلك المعلات المطلوبة لهذه المتغيرات لضمان معدلات أعلى لنجاح عمليات الناسور الشرياني الوريدي الجراحي.

Summary of Thesis

This study aimed to study the different Haemodynamic variables of the axillary vein and the radial or brachial arteries before and after arteriovenous fistula operations. In addition, it aimed to study the needed levels in these variables to achieve high success rate in the surgically created arteriovenous fistulae.

أ.م.د. أمين عطية منصور	مقدم الرسالة:
معالجة سرطان المريء في مستشفى أسبوط الجامعي Management of Carcinoma of the Oesophagus in Assiut University Hospital	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم الجراحة العامة	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »	تاريخ المحرم:
أ.د. عبد العظيم عبد الرحمن حسن أ.د. علي محمد عبد الوهاب د. سمير شحاتة محمد عبد	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تم إعداد هذه الرسالة المرجعية على ٣١٨ مريضاً يعانون من سرطان المريء وقد تم إجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص المرض. تبين من الدراسة زيادة معدلات الإصابة بسرطان المريء كما تبين أن التدخين من العوامل المهمة المسببة للمرض. وقد تم استئصال الورم في ١٦٢ حالة حيث كان الاعتماد على جهاز الدياسة أساساً في البداية ثم أصبح الاعتماد على الطريقة اليدوية في الآونة الأخيرة حيث أدى ذلك إلى تقليل نسبة الوفيات بسبب التسريب. وقد تبين من الدراسة أهمية العلاج الكيماوي بعد التدخل الجراحي لتقليل احتمال عودة المرض والارتفاع بمعدل العمر الافتراضي، وفي الحالات التي يصعب التدخل الجراحي فيها لتسهيل عملية البلع.

Summary of Thesis

This Retrospective study was conducted on 318 patients suffering from cancer oesophagus and the diagnosis was established in all cases. Oesophagectomy was done in 162 cases. Stappler technique was used to perform the anastomosis but with the advances in surgery, manual technique is the main method to perform the oesophago-gastric anastomosis and so the postoperative leakage was reduced markedly. Postoperative chemotherapy played important role in decreasing the postoperative tumour recurrence and prolonging the life span of patients. Also, chemotherapy played important role palliation and restoring the ability to swallowing.

علاء طه محمد الأمين طه	مقدم الرسالة:
مقارنة في الرق عديم التوتر للفتق الاربي بين استخدام منظار البطن الجراحي من ناحية والفتح الجراحي (طريقة ليشتنشتين) من ناحية أخرى	موضوع الرسالة:
"Tension-free" Repair of Inguinal Hernia: Laparoscopic Versus Open (Lichtenstien) Technique	
كلية الطب - قسم الجراحة العامة	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ «ماجستير»	تاريخ المقدم:
أ.د/ عبد العظيم عبد الرحيم حسن أ.د/ أحمد توني زيان أ.د/ مصطفى أحمد حمد	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

أجريت هذه الرسالة علي ٣٠ مريضاً، تم تقسيمهم إلي مجموعتين تتكون كل مجموعة من ١٥ مريضاً يخضعون لرتق الفتق الاربي بالمنظار الجراحي أو الفتح الجراحي (طريقة ليشتنشتين) وقد أسفرت الجراحة علي تميز المنظار الجراحي في بعض الجوانب وتتميز الفتح الجراحي في جوانب أخرى.

Summary of Thesis

In this work 30 patients with inguinal hernia were studied for comparison of tension for repair of inguinal hernia laparoscopic versus open (lichtenstien) technique as regard operative time, postoperative pain, hospital stay, complication, recurrence.

علي زيدان تهاامي	مقدم الرسالة:
تقديم ومعالجة الأورديما الليمفية بالطرف العلوي الناتجة عن علاج سرطان الثدي' Assessment and Management of Arm Lymphoedema Post Breast-Cancer Treatment	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم الجراحة العامة	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »	تاريخ الملح:
أ.د/ عبد الراضي عبد السلام أ.د/ أشرف زيدان عبد الله د/ نهال أحمد فتحي	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

أجريت الدراسة بطريقتين طريقة مستقبلية اشتملت علي مائة مريض تم إجراء طرق جراحية مختلفة لاستئصال الثدي وتعرض بعضهم للعلاج الإشعاعي وملاحظة عوامل ظهور الاورديما الليمفية ودراسة استرجاعية اشتملت علي ثلاثين مريض لديهم أورديما ليمفية تم علاجهم بالتأهيل الطبيعي.

Summary of Thesis

The study has prospective study include 100 patients have different types of mastectomy surgical operations and have radiotherapy and observed for lymphoedema and retrospective study include 30 patient had lymphoedema take rehabilitative therapy.

مقدم الرسالة:	ماجد انوار بدسطوروس
موضوع الرسالة:	دراسة مرجعية لتقييم تشخيص وعلاج مرض الكياس العدارية في مستشفيات جامعة أسيوط Evaluation of Management of Hydatid Disease in Assiut University Hospitals
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الجراحة العامة
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ محمد علي السبيتي أ.د/ مرسى محمد مرسى

ملخص الرسالة

ان الهدف من دراستنا هذه هو تقييم لدرجة انتشار المرض العداري في صعيد مصر والطرق المستخدمة في التشخيص والعلاج. ولقد وجدنا من خلال دراستنا أن هذا المرض يمكنه أن يصيب أي عضو من أعضاء الجسم غير أن الكبد هو العضو الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض تليه الرئتان. وقد تم حصر تسعة عشر حالة مصابة بهذا المرض وكانت الوسائل التي ساعدت في التشخيص هي الأشعة التليفزيونية والأشعة المقطعية . وستظل الجراحة هي الخيار الأول لعلاج هذا المرض بينما العلاج بالعقاقير يساعد فقط في تخفيض نسبة رجوع المرض.

Summary of Thesis

The aim of the study was to evaluate the magnitude of hydatid disease problem in Upper Egypt and methods used for diagnosis and

treatment. We found that, the disease attacks every organ in the body, but the commonest site of infection is the liver and the lung is the 2nd commonest site. The most effective tools in establishing diagnosis were U.S. and C.T. Surgery is still the treatment of choice for hydatid cysts.

مقدم الرسالة:	محمد احمد محمد عبد الرحيم
موضوع الرسالة:	دور صنفرة الجلد في علاج أمراض الجلد المختلفة لمرضى صعيد مصر The Role of Dermabrasion in Treatment of Different Skin Diseases of Upper Egypt Patients
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الجراحة العامة
تاريخ التخرج:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د. جمال عبد الحميد احمد د. / عاصم حسين كامل د. / حاتم زيدان محمد

ملخص الرسالة

إشتملت الدراسة على أربعين مريضاً من مرضى صعيد مصر تم إجراء صنفرة الجلد لهم. وتبين من الدراسة إمكانية ونجاح صنفرة الجلد لمرضى صعيد مصر في علاج أمراض الجلد المختلفة بشرط عدم التعرض لأشعة الشمس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد إجراء الصنفرة وإستخدام كريم واقى ضد الشمس لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

Summary of Thesis

This study included 40 of Upper Egypt patients with different skin diseases who were undergone dermabrasion. The results showed that dermabrasion is successful for Upper Egypt patients if sun exposure is avoided for at least 3 months and sunscreen cream for another 3 months.

مقدم الرسالة:	محمد بكر محمد قطب
موضوع الرسالة:	تقييم الطرق المختلفة في علاج حصوات القناة المرارية الرئيسية منظار القنوات المرارية - دراسة مقارنة Evaluation of Different Endoscope Lines for Management of Common Bile Duct Stones- Comparative Study
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الجراحة العامة
تاريخ المحم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ أحمد الطيب عيسى الشعراوي د/ مصطفى ثابت أحمد د/ علاء أحمد رضوان

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على (١٠٧) مريضاً ممن يعانون من وجود حصوات بالقناة المرارية الرئيسية ، وقد تم استخراج الحصوات من القناة المرارية بواسطة المنظار في الجلسة الأولى من (٩٥) مريض حيث استخدمت البالونة المرارية في (٣٥) مريض ، السلة المرارية في (٣٨) مريض وتفتيت الحصوات ميكانيكياً في (٢٢) مريض ، وقد استخدمت القسطرة الأنف مرارية في (٥) مريض بهدف التصريف المؤقت للعصارة الصفراوية لحين استخراج الحصوات في جلسة أخرى. أما الدعامة الداخلية فقد استخدمت بصفة مؤقتة في (٧) مريض وبصورة دائمة في حالتين فقط ، وكانت نسبة المضاعفات بهذه الدراسة ١٦,٣ % ، وأهمها التهاب القناة المرارية الرئيسية ، النزيف الناتج عن قطع نتوء الاثنى عشر ، التهاب حاد بالبنكرياس ، التهاب الحوصلة المرارية ، رجوع حصوات القناة المرارية ، جميع المضاعفات علاجها ولم تحدث وفيات.

Summary of Thesis

The study was performed on (107) cases with CBD stones, successful extraction of stone done in (95) cases using balloon in (35) cases, basket in (38) cases, mechanical lithotripsy in (22) cases and nasobiliary catheter used temporary in (5) cases. Stent (endoprotheses) as temporary treatment in (7) cases and as permanent therapy in (2) cases. Complication rate was 16.3% in the form of cholangitis, bleeding, cholecystitis and recurrent CBD stones.

قسم

جراحة المسالك

البولية

1434 هـ

أحمد سراج محمود صفوت	مقدم الرسالة:
استخدام الليزر الهولميوم في علاج حصوات الحالب Management of Ureteric Stones using Holmium Laser	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم جراحة المسالك البولية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »	تاريخ المحرم:
أ.د/ محمد ابراهيم طه د/ عاطف علي جعفر د/ أحمد محمد الطاهر	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

جهاز الهولميوم ليزر يصدر أشعة ضوئية بطول موجي قدره ٢١٠٠ نانومتر ، الذي يقع في مجال الموجات تحت حمراء من المجال الكهرومغناطيسي . ضم البحث مائة وسبعة مريضات تمت مناظرتهم بقسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة أسيوط في الفترة من شهر يناير ٢٠٠٠ حتي شهر يوليو ٢٠٠١ وقد قسم المرضي الي ثلاث مجموعات حسب موقع حصوات الحالب وهي حصوات الثلث علوي من الحالب وحصوات الثلث الاوسط من الحالب وحصوات الثلث الاسفل من الحالب . عند اجراء عمليات حصوات الحالب تم توسيع فتحة الحالب قبل ادخال المنظار في ٥٥% من الحالات وتركزت بقايا الحصوات للنزول الطبيعي بدون مساعدة في ٨١,٨% بينما استخدمت الأدوات المساعدة لاستخراج بقايا الحصوات في ١٨,٢% واستخدمت دعامة للحالب في ٨٦,٤% ، وقد بلغت نسبة النجاح بعد جلسة واحدة من العلاج ٩٦,٢% ووصلت إلى ٩٨% بعد اضافة الجلسة الثانية من العلاج لبعض الحالات.

Summary of Thesis

The Ho: YAG laser produce light of 2,100 nm in a pulsed fashion. This light has a wavelength that lies in the infrared part of the electromagnetic spectrum. Between January 2000 and July 2001, (107) patients, most of them were males (81.3%), presented to the urology department of Assiut University Hospitals, Assiut, Egypt. Those patients were divided into three groups according to the stone location, which was determined radiologically. Flexible and rigid ureteroscopes were used. Dilation of the ureteral orifice prior to introduction of the ureteroscopes was done in 18.2% and stenting of the urinary tract after operation was done in 86.4% of cases.

مقدم الرسالة:	محمد محمود جاد المولى
موضوع الرسالة:	فوائد منظار تجويف البطن في حالات الخصية المعلقة Benefits of Laparoscopy Fore the Undescended Testis
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم جراحة المسالك البولية
تاريخ المزم:	٢٤ / ١١ / ٢٠٠٢ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ عبد المتكعم عبد الله الحجاجي أ.د/ اعلام عزت العبد المتكعم أ.د/ فتحي جابر العناني

ملخص الرسالة

شملت الدراسة ٥٠ حالة ١٥ منهم يعانون من خصيتين معلقتين و٢٥ يعانون من خصية واحدة معلقة وكان متوسط العمر لهذه الحالات ١٦ سنة تحت مخدر عام يتم إجراء منظار تجويف البطن وقد وضعنا تصنيفا جديدا وهو كالآتي: النوع (١): لا يوجد خصية (٥ حالات - ١٠%) - النوع (٢): الخصية عند الحلقة الإربية الداخلية مع انحناء الحبل المنوي (٨%) - النوع (٣): الخصية عند الحلقة الإربية مع عدم انحناء الحبل المنوي (٤%) - النوع (٤): الخصية داخل تجويف البطن (٢٤ حالة - ٤٨%) ويتم عمل المرحلة الأولى لطريقة فالور - ستيفنز في ٢٢ خصية - النوع (٥): فوجدنا بوجود أعضاء داخلية أنثوية أو أعضاء تناسلية أولية غير مميزة الجنس (٥ حالات - ١٠%) - ثم تم عمل المرحلة الثانية لطريقة فالور - ستيفنز بعد المرحلة الأولى بمدة أشهر ل ١٨ حالة وبمتابعة هذه الحالات لمدة ٣ أشهر وعمل المسح الذرى للخصية وكانت الخصية ذات حجم مناسب وداخل كيس الصفن وكما أثبت المسح الذرى

حيويتها أما الحالات التي تم إنزال الخصية فيها بطريقة فاوولر — ستيفنز في مرحلتين بنسبة نجاح ٨٦٧% ومن خلال هذه الدراسة يتضح لنا الأهمية القصوى لمنظار تجويف البطن في تشخيص وعلاج حالات الخصية المعلقة.

Summary of Thesis

This study included 50 patients with undescended testes (15 cases with bilateral, 35 with unilateral) the mean age 16 years. Under general anesthesia, Laparoscopy done. We classified our finding as follows: type (0) nonvisualized testes in 5 cases (7.7%) - type (I) atrophic intra-canalicular testes in 4 cases (6.2%) – Type (II) the testis at the internal ring with looped vas 2 cases (3.1%) – Type (III) the testis at the internal ring without looping of the vas in 10 cases (23.1%), Type (IV) intra-abdominal testes in 24 cases (46.2%), in type (V) abnormal findings in the form of either female internal organs or indefinite gonads in 5 cases (13.5%). Second stage Fowler-Stephens orchidopexy done for 18 cases after 6 months from the laparoscopic clipping in the first stage. Three to six months after laparoscopic orchidopexy and two-stage Fowler-Stephens orchidopexy, follow up done by clinical examination for the testicular size and its position in the scrotum and radio-isotope scanning by Tc^{99m} done to evaluate the viability of the testis. In all cases for whom laparoscopic orchidopexy and came for follow up, the testes were of good size and viable. Two cases with two-stage Fowler-Stephens orchidopexy showed atrophic testes (86.7%).

قسم

جراحة العظام

مقدم الرسالة:	أسامة رشاد عبد الحميد أحمد
موضوع الرسالة:	تقييم نتائج علاج كسور بيلون (أسفل عظمة القصبة) Evaluation of Results of Treatment of Pilon Fractures (Lower Tibia)
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم جراحة العظام
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ كرم الله رمضان أحمد أ.د/ طارق عبد الله الجمال د/ أسامة أحمد فاروق

ملخص الرسالة

الرسالة مقسمة إلي عدة أبواب، بدأت بالتقديم لهذا النوع من الكسور، والصفة التشريحية لمنطقة الكاحل ومداخله الجراحية، ثم الميكانيكا الحيوية للمفصل، ثم الطرق التحفظية والجراحية لعلاج هذا الكسر. وتبين من البحث أن الكسور المفتوحة تتعرض لمضاعفات أكثر من المغلقة، وأن أفضل طريقة لعلاج هذه الكسور هي التثبيت الداخلي المتين كلما أمكن، ويمكن الاستعاضة عنه بطريقة الشد على الأربطة في الكسور المفتوحة والمفتتة، كما أن التثبيت الحلقي يتميز بالتحكم في الجزء السفلي الصغير من الكسر بعد تثبيت الشظية داخليا.

Summary of Thesis

The research started by the introduction for this type of fractures. Then the anatomy of the ankle region, the surgical

approaches to the ankle joint, and the biomechanics of the ankle joint. The conservative and surgical methods for treatment of this fracture were described. The open fractures have more complications than the closed. The rigid internal fixation is the best method for treatment of this fracture. If the internal fixation is not possible, using ligamentotaxis. The ring fixators have better results than the other external fixators.

مقدم الرسالة:	رفيق رجالي داود
موضوع الرسالة:	دراسة العلاج الجراحي لثانويات الأورام بالعمود الفقري Study of Surgical Management of Spinal Metastases
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم جراحة العظام
تاريخ المحم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د/ عصام خلف الله خليفة الشريف أ.د/ محمد جمال حسن محمد أ.د/ المعتر عبد الرازق السبروت

ملخص الرسالة

دراسة العلاج الجراحي لثانويات الأورام بالعمود الفقري من أنواع مختلفة بقسم جراحة العظام بمستشفى أسبوط الجامعي بواسطة عملية جراحية من الأمام لإزالة الضغط علي النخاع الشوكي واستئصال الورم الثانوي ثم تثبيت الفقرات بطرق استعراضية مختلفة مثل ترقيع العظام أو الاسمنت العظمي سواء مدعوما بالأسلاك أو لا ثم تثبيت الفقرات بواسطة شرائح ومسامير معدنية سواء من الأمام أو من الخلف أو كليهما.

Summary of Thesis

Study of surgical management of spinal metastases of different types in orthopedic department in Assiut University Hospital through anterior decompression and corpectomy and then reconstruction by bone graft or cement with K wire or without followed by fixation by plates and screws either from front or from behind or both.

مقدم الرسالة:	مشام أحمد عبد العزيز
موضوع الرسالة:	دراسة مقارنة بين العلاج الجراحي والعلاج التحفظي لكسور أعلى اللقمتين في المرفق في الأطفال Comparative Study of Operative and Conservative Treatment of Siplaced Supracondylar Fractures of the Humerus in Children
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم جراحة العظام
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / ماهر عبد السلام العسال أ.د. / كمال محمد أحمد الجعفري د. / فيصل فهمي آدم

ملخص الرسالة

تم إجراء هذه الدراسة للمقارنة بين العلاج الجراحي والعلاج التحفظي لكسور أعلى اللقمتين بالمرفق في الأطفال وقد امتدت متابعة الحالات إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر . وقد أجريت الدراسة على ٥٠ مريضاً ، ٢٥ مريضاً تم علاجهم بطريقة العلاج التحفظي و ٢٥ مريضاً تم علاجهم بطريقة العلاج الجراحي وقد أثبتت النتائج النهائية لهذا البحث أن العلاج الجراحي قد حقق نتائج أفضل من العلاج التحفظي في علاج هذه الكسور .

Summary of Thesis

This study was planned to compare between two methods of treatment of displaced supracondylar humeral fracture in children,

either by closed reduction and plaster cast fixation or by open reduction and internal fixation through the posterior approach. 50 patients constituted the material of this study, 25 treated by conservative method and 25 by operative methods with follow up period 6 ms. The final results of operative method were better than those of conservative method.

قسم

الأذن والأذن

والحجرة

مقدم الرسالة:	عبد العزيز محمود علي محمود
موضوع الرسالة:	'بعض أوجه الانسداد الخلقي لفتحتي الأنف الخلفيتين' Some Aspects of Congenital Choanal
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأنف والأذن والحنجرة
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د/ حسين فريد وشاحي أ.د/ سامية عطوة محمد أ.د/ أحمد عبد العليم عبد الوهاب

ملخص الرسالة

الرسالة تهدف إلي معرفة معدل حدوث الانسداد الخلقي لفتحتي الأنف الخلفيتين في الأطفال حديثي الولادة ومدى تأثير نقص النمو علي هذا المعدل وكذلك تضمنت الرسالة الطريقة الصحيحة لعلاج الانسداد في هذا السن.

Summary of Thesis

Aim of this work was to determine the true incidence of choanal atresia in neonates and effect of prematurity on this incidence. Ideal method for correction of this anomaly in this age was also considered.

مقدم الرسالة:	وائل متي بشاي نخيل
موضوع الرسالة:	'الارتجاع المعدي المريئي في المرضى الذين يعانون من أمراض حنجرية' Gastroesophageal Reflux Events in (Patients with Laryngeal lesions
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأنف والأذن والحنجرة
تاريخ المحم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د/ محمد مختار فرج أ.د/ إيناس أحمد رضا الكريمي د/ أحمد أبو الوفا عبد الجليل

ملخص الرسالة

الرسالة تهدف إلى توضيح الأثر الفعال للارتجاع المعدي المريئي على المرض الحنجري كمسبب أو كعامل مساعد وقد تبين أنه العلاج الناجح للارتجاع المعدي المريئي قد يحسن كثير من الأمراض الحنجرية.

Summary of Thesis

Persistent laryngeal symptom, necessitate consultation of Gastroesophageal for exclusion of GORD as an important factor in the development of many laryngeal lesions. Successful treatment of GORD can improve many laryngeal lesions.

قسم

التوليد وأمراض

النساء

إبراهيم إبراهيم محمد عبد العال	مقدم الرسالة:
نور عفار الميزوبرستول في تحفيز الولادة عند السيدات اللاتي تجاوزن موعد الولادة المتوقع Evaluation of the use of Misoprostol in Induction of Labor in Postdate Pregnancy	عنوان الرسالة:
كلية الطب - قسم التوليد وأمراض النساء	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١٢/٢٩ م (ماجستير)	تاريخ المنح:
أ.د / عزت حامد سيد د / علاء الدين عبد الحميد يوسف د / صفوت عبد الراضي محمد	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

أظهر هذا البحث المقارن أن إعطاء ١٠٠ ميكروجرام من الميزوبرستول مهبلياً أكثر فاعلية وله نفس درجة الامان بالمقارنة بإعطاء ٥٠ ميكروجرام من الميزوبرستول مهبلياً في تحفيز الولادة عند السيدات اللاتي تجاوزن موعد الولادة المتوقع.

Summary of Thesis

This randomized comparative trial showed that 100 microgram of vaginal Misoprostol is more effective and as safe as 50 microgram of vaginal Misoprostol in induction of labor in possible pregnancy.

أحمد فاروق عبد القوي عبد الجليل	مقدم الرسالة:
التشخيص المبكر لتشوهات الجنين باستخدام جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية Early Diagnosis of Fetal Structural Anomalies by Ultrasonography	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم التوليد وأمراض النساء	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١٢/٢٩ (ماجستير)	تاريخ المنع:
أ.د/مدوح محمد شعبان أ.د/ حسن صلاح كامل أ.د/ ضياء الدين محمد عبد العال	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تهدف الدراسة الحالية إلى تقدير القيمة التشخيصية للتصوير بالموجات فوق الصوتية في الكشف عن تشوهات الأجنة عن طريق التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل. أجرى الفحص الأول (التصوير بالموجات فوق الصوتية المبكر عبر المهبل) عند عمر ١٢-١٥ أسبوع من الحمل. وكان الفحص الثاني عند عمر ١٨-٢٢ أسبوع بالموجات فوق الصوتية عبر البطن. أجرى الفحص الثالث بعد الأسبوع الرابع والعشرون من الحمل. حساسية التصوير المبكر بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل في كشف التشوهات كانت ٣٨,٤١% والخصوصية كانت ٦٣,٩٨%. أما عن الفحص الثاني فكانت حساسية التصوير بالموجات فوق الصوتية ٨١,٦% والخصوصية ٣١,٩٩%. التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل ذو خصوصية عالية في تشخيص التشوهات الجنينية خاصة تشوهات الجهاز الدماغي الشوكي وتشوهات الجهاز الهضمي هذا مما يجعل الحاجة لهذه الوسيلة للنساء الحوامل المحتمل حدوث تشوهات

في اجنتهم واضحا. أظهر الفحص في اواخر الثلث الثاني من الحمل معدلات تشخيصية أفضل ودوره الذي أثبت سوف يستمر ولن يستبدل بالتصوير بالموجات فوق الصوتية الميكر عبر المهبل.

Summary of Thesis

This study aimed to evaluate the diagnostic value of early transvaginal ultrasonography in anomaly scan among high risk pregnant mothers. Ultrasound evaluation was carried out three times for every woman. The first scan was done at the gestational age 12-15 weeks, transvaginally. The second scan was done at the gestational age of 18-22 weeks, transabdominally. The third scan was done after 24 weeks gestational age. The fetuses born or aborted in our series were carefully examined for congenital anomalies. The sensitivity of early ultrasonography in the detection of anomalies was 41.38%. The specificity was 98.63%. The sensitivity of the second scan was 81.6%. The specificity was 99.31%. Transvaginal ultrasonography has got a very high specificity in the diagnosis of fetal malformations especially cerebrospinal and gastrointestinal anomalies. Late second trimester scan appeared to have better diagnostic rates and its role which is already established should continue and cannot be replaced by early TVS scan.

مقدم الرسالة:	شريف عبد الرازق عبد العليم
عنوان الرسالة:	<p>دور الحقن الوقائي لمحتلول الملح داخل التجويف الأمنيوسي حول الجنين في حالات قلة السائل الأمنيوسي أثناء الولادة (دراسة عشوائية مستقبلية)</p> <p>The Role of Prophylactic Intrapartum Amnioinfusion in Cases of Oligohydramnios (A Prospective Randomized Study)</p>
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم التوليد وأمراض النساء
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١٢/٢٩ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	<p>أ. د / ماهر صلاح محمد</p> <p>أ. د / جمال حامد سيد</p> <p>د / أحمد فائق أمين</p>

ملخص الرسالة

يعتبر حقن محتول الملح داخل تجويف الامنيوسي وسيلة علاجية بسيطة وآمنة وفعالة في علاج السيدات في حالات الولادة مع قلة السائل الأمنيوسي . ولقد هدف هذا البحث لإدخال هذه الطريقة العلاجية كخدمة جديدة في قسم التوليد وأمراض النساء جامعة أسيوط . ولقد تم تصميم هذه الدراسة لتقييم دور هذه الوسيلة العلاجية في علاج حالات قلة السائل الأمنيوسي أثناء الولادة (كهدف أولى للبحث) .

Summary of Thesis

Amnioinfusion is a simple, safe, and beneficial procedure in laboring women with oligohydramnios. The current study was conducted to introduce amnioinfusion as a new service in Assiut University Hospital. It was designed to evaluate the role of prophylactic intrapartum amnioinfusion in laboring women with oligohydramnios (as the primary outcome).

مقدم الرسالة:	محمود أحمد محمد عبد الرحيم
موضوع الرسالة:	'علاج العقم ما بعد العلاج بالمنظار الجراحي لحالات تكيسات المبايض' Infertility Treatment After Laparoscopic Management of Ploycystic Ovary Syndrome
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم التوليد وأمراض النساء
تاريخ الجرم:	٢٠٠٢/١٢/٢٩ «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د/ سيد أحمد محمد مصطفى د/ علاء الدين عبد الحميد يوسف د/ مؤمن أحمد محمد كامل

ملخص الرسالة

أجريت الدراسة علي مرضي تكيسات المبايض واللاتي تعانيين من العقم. واللاتي أجريت لهن عملية كي بالمنظار الجراحي سابقاً، ومازلن يعانيين من العقم. وقد تم تقسيم المرضي إلي مجموعتين، الأولى تضم ٣٠ مريضة، وقد تم علاجهن بعقار منشط للتبويض (مترودين)، وقد ثبت أن كلتا الطريقتين غير مجدية في علاج العقم لدي هؤلاء السيدات.

Summary of Thesis

Patients in this study was divided into 2 groups the first group include 30 patients and treated by another electrocautery and the other group included 25 patients and treated by metrodine and the study concluded that both methods are ineffective in treatment of infertility.

قسم التحصيل

أحمد محمود محمد عبد الجواد	مقدم الرسالة:
'المقدرة على السير مع الحفن خارج الأم الجافية أثناء الولادة' Walking Epidural During Labour	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم التخدير	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »	تاريخ المزم:
أ.د. جئار محمد فئحسى ٠.د / صفوت عبد الراضى محمد ٠.د / أسامه محمد على	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى المقارنة بين أربع مجموعات من الأدوية التى تحقن خارج الأم الجافية وهى الروبيقيكين والبيوبيقيكين والروبقيكين مع الفنتانيل والبيبيقيكين مع الفنتانيل لتخفيف آلام الولادة مع الحفاظ على مقدرة الأم على السير أثناء الولادة وملاحظة الآثار الجانبية فى كل مجموعة .

Summary of Thesis

The study aimed to compare between four groups of epidurally injected drug which are ropivacaine, bupivacaine, ropivacaine plus fentanyl and bupivacaine plus fentanyl for labour analgesia with preserving the ability of the mother to walk and recording side effects of each group.

سيد قاعود عبد الشافي	مقدم الرسالة:
"التخدير الموضعي للعصب الخلفي للعضو الذكري بالمقارنة بالتخدير الموضعي للمنطقة العجزية لتخفيف ألم بعد العمليات للأطفال الذين يجرّون عمليات على العضو الذكري" Dessel Penile Nerve Block Versus Caudal Epidural for Postoperative Analgesia in Children Undergoing Penile Surgery	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم التخدير	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٦/٣٠ «ماجستير»	تاريخ المقدم:
أ.د/ محمد عبد المنعم بكر أ.د/ محمد سامي محمد محمد عبد الرحيم	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

الغرض من هذه الدراسة هو المقارنة بين أسلوبين للتخدير الموضعي وهما التخدير الموضعي للعصب الخلفي للذكر والتخدير الموضعي للعصب للمنطقة العجزية ودراسة تأثيرهما في إزالة ألم بعد العمليات للأطفال الذين يجرّون عمليات على الجزء البعيد من الذكر. ألم بعد عمليات العضو الذكري لا يمكن تجنبها ومعالجة الألم بكفاءة غير كافية تعتبر من الأسباب التي تستدعي الإقامة الغير متوقعة بعد عمليات اليوم الواحد ومساائل التخدير الموضعي تعتبر أكثر إفادة من المخدرات وأفضل هذه الطرق للاستعمال العام هو التخدير الموضعي للمنطقة العجزية والتخدير الموضعي للعصب الخلفي للذكر. إزالة الألم بعد العمليات بكفاءة يعتبر جزء هام من الاهتمام المصاحب للعمليات، التخدير الموضعي مثل استعمال التخدير الموضعي للمنطقة العجزية تستعمل بالتزامن مع التخدير الكلي لمنع إزالة الألم أثناء وبعد العمليات، إزالة الألم للمنطقة

العجزية تعتبر وسيلة بسيطة نسبياً مع توقع في مستوى التخدير وعلى المدى الأوسع تعتبر أشهر وسيلة من وسائل التخدير الموضعي المستعملة في جراحة الأطفال وخصوصاً التي تجري على المنطقة السفلى من البطن - عمليات المسالك البولية وعمليات الطرف السفلي - التوقيف البطيء يمنع إزالة الألم بعد العمليات، وتتميز بإفافة بسيطة و سيطرة متميزة على ألم بعد العمليات بالإضافة إلى أنها وسيلة بسيطة تحمل فرص أقل للمضاعفات، التخدير الموضعي للذكر تتميز بالإفافة السهلة والبساطة والكفاءة لتقليل ألم بعد العمليات وأيضاً تقلل التوتر النفسي وتقلل استجابة الغدة الكظرية للتوتر.

Summary of Thesis

The purpose of this study is to compare two regional techniques namely dorsal penile nerve block "DPNB" and caudal epidural block and study their efficacy in relieving post operative pain in children undergoing distal penile surgery. Pain after penile surgery is inevitable. Inadequately treated pain is a major cause of unanticipated hospital admission after day care surgery. Local anaesthetic techniques have been shown to be more effective than systemic opioids and the most effective methods in general use are caudal epidural block and dorsal block of the penis. Adequate post operative analgesia in children is a vital part of preoperative care. Regional techniques such as caudally administered local anaesthetics have long been used in conjunction with general anaesthesia to provide intra-operative and post operative analgesia. Caudal analgesia is a

relatively simple technique with a predictable level of blockade and is by far the most common regional anaesthetic used in pediatric surgery for lower abdominal, urological and lower limb operations. Gradual offset usually provides analgesia beyond the duration of surgery with a smooth recovery period and good post operative pain control. Moreover it is a simple procedure that carries a low risk of complications. Penile block is a safe, simple and effective procedure for decreasing postoperative pain. It also reduces behavioral distress and diminishes adrenocortical stress response.

مقدم الرسالة:	مصطفى حسن عبد الوهاب محمد
موضوع الرسالة:	تخفيف الألم أثناء وبعد العمليات الجراحية في الأطفال عن طريق الحقن خارج الأم الجافية في منطقة الفقرات القطنية Lumbar Epidural Analgesia for Operative and Post Operative Pain Relief in Children
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم التخدير
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. إكرام عبد الله عثمان د. / كامل إبراهيم حادى

ملخص الرسالة

تقيم تأثير حقن عقار البيبوفكين خارج الأم الجافية على درجة تخفيف الألم بعد العمليات الجراحية في الأطفال والآثار الجانبية المترتبة على الحقن خارج الأم الجافية بالإضافة إلى دراسة هذه الطريقة على التغيرات التي تحدث في عدد ضربات القلب وفي متوسط ضغط الدم الشرياني أثناء وبعد العمليات الجراحية.

Summary of Thesis

The assessment of the effect of lumbar epidural anesthesia on postoperative pain intensity, degree of pain relief and side effects as well as the haemodynamic variables in children undergoing orthopedic surgery.

أحمد قهري أحمد بدوي	مقدم الرسالة:
تخفيف حدة الاستجابات التوترية بعد إخراج الأنبوبة الحنجرية عقب تخدير عمليات البطن الصغرى باستخدام عقار الفنتانيل Attenuation of Stress Responses to Tracheal Extubation by Use of Fenton After Minor Intraabdominal Surgery	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم التخدير	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ «ماجستير»	تاريخ المفهم:
أ.د / فاطمة جاد الرب عسكر أ.د / عصام شرقاوي عبد الله	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

اشتملت الرسالة على أربعة وتسعين صفحة وقد احتوت على خمسة أبواب الأول تم عرض المقدمة وفى الباب الثانى تم عرض الجزء الأكاديمي للرسالة وفى الباب الثالث تم عرض طريقة الدراسة وشروط اختيار المرضى الذين تجرى عليهم الدراسة وفى الباب الرابع تم عرض نتائج الدراسة ومقارنتها بالدراسات التى أجراها الآخرون ثم زيلت الرسالة بالملخص العربي والإنجليزي والمراجع التى تم استخدامها أثناء الرسالة وقد تبين من الدراسة مدى فاعلية عقار الفنتانيل فى تخفيف حدة الاستجابات التوترية بعد إخراج الأنبوبة الحنجرية .

Summary of Thesis

The study consisted of ninty four pages, and included five chapters. The first one included the introduction and aim of the work, the second one included the review of the literature, the third one patients and methods then the summary and conclusion references and the Arabic summary were added. The study concluded that fentanyl 2 Ug/kg is effective in attenuation of stress responses to tracheal exudation after minor intraabdominal surgery.

مقدم الرسالة:	أحمد محمد زكى الصادق
موضوع الرسالة:	دراسة مقارنة بين عقاري اللجنوكين والمورفين خارج الأم الجافية وأعصاب ما بين الضلوع لتخفيف آلام كسور الضلوع Comparative Study of Morphine and Lignocaine: Epidural Versus Intercostal Nerve Block for Pain Relief of Rib Fractures
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم التخدير
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/١١/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / محمد عبد المنعم بكر د / عصام شرفاوى عبد الله

ملخص الرسالة

أجرى هذا البحث على (٤٠) مريضاً تتراوح أعمارهم ما بين ٢٠ إلى ٨٠ عاما (متوسط العمر ٥٣ سنة) من الذين حدث لهم كسور بالضلوع مصحوبة بوجود جزء سائب (ثلاث ضلوع أو أكثر) وتم علاجهم فى وحدة عناية الإصابات بمستشفى أسبوط الجامعي ما بين عامي ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٢م . وأتضح أن التخدير الموضعي بالحقن خارج الأم الجافية فى المنطقة الصدرية لمرضى إصابات الصدر المصحوب بوجود جزء سائب هي من أفضل الطرق لتسكين الألم حيث أن هذه الطريقة تؤدى إلى تحسين فى وظائف التنفس للمرضى مما يؤدى إلى تجنب استخدام أجهزة التنفس الصناعي وذلك بدوره يقلل من معدل الوفيات وكذلك معدل الإقامة فى أجهزة التنفس الصناعي وذلك بدوره يقلل من معدل الوفيات وكذلك معدل الإقامة فى المستشفيات .

Summary of Thesis

This study included 40 patients aged from 20 to 80 years (mean 53 years) with flail chest segment (three or more fractured ribs) referred to trauma intensive care unit in Assist University Hospital from May 2001 to February 2002. In conclusion, thoracic epidural pain control for chest trauma is effective, convenient, and human, as long as the patient's condition is monitored closely. This technique improved the patients respiratory functions and tissue oxygenation. Avoidance of mechanical ventilator support and obvious decrease in morbidity, mortality and hospital stay.

مقدم الرسالة:	سلوي بدر عبد الجواد علي
موضوع الرسالة:	تأثير عقار البوبيفيكين مع عقار الترامادول خارج ألام الجافية علي زمن التخدير وتسكين ألام ما بعد العمليات في مرضي جراحات العظام بالطرف السفلي Effects of Epidural Bupivacaine with Tramadol on the Duration of Epidural Anaesthesia and Postoperative Analgesia in Patients Undergoing Lower Limb Orthopedic Surgery
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم التخدير
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الاشراف:	أ.د/ ليلى حسن محمد د/ هاني أحمد ابراهيم المربع

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة بمستشفى أسيوط الجامعي علي خمسة وأربعين مريضاً لتخفيف الام بعد عمليات العظام الخاصة بالاطراف السفلية بعد التخدير النصفي خارج الام الجافية ، تم تقسيم المرضي الي ٣ مجموعات - المجموعة الاولى ١٥ مريض ، تم حقن المرضي ب ٢٠ مللي ببوبيفيكين ٠,٢٥% + ١٠ مللي محلول ملح ، المجموعة الثانية تم حقن ٢٠ مل ببوبيفيكين ٠,٥٠% + ١٠٠ مل جرام ترامادول + ٦ مل محلول ملح المجموعة الثالثة تم استعمال ٢٠٠ مل جرامادول + ٤ مل محلول ملح وتم متابعة التغيرات في الجهاز الدوري ومعدل التنفس ونسبة تشبع الدم بالاكسجين وقياس مستوي شعور المريض بالالم أو حدوث آثار جانبية. كانت نتيجة الدراسة وجد أن النبض والضغط لم يتغير تغيرات جوهرية وكذلك معدل التنفس كما أنه لم توجد تغيرات

جوهريّة في معدل تراجع الحركة وتخدير الاحساس بين الثلاث مجموعات . نستخلص من هذه الدراسة أن حقن عقار الترامادول ١٠٠ ملجم خارج الام الجافية مع البوبيفيكيين ٠,٥٠ % يؤدي الي فترة تسكين للام بعد العمليات في الاطراف السفلية أثناء وبعد العملية .

Summary of Thesis

This study was conducted in Assiut Universty Hospital on 45 patients undergoing lower limb orthopedic surgery to evaluate the effects of epidural tramadol on blupivacaine anaesthesia and postoperative analgesia. Patients were randomly classified into 33 groups. Group I received 20 ml bupivacaine 0.5% + 10 ml 0.9% saline. Group 2: received 20 ml bupivacaine 0.5% + 100 mg tramadol + 8 ml saline. Group 3: received 20 ml bupivacaine + 6 ml saline. The results of these study showed no singificant changes in sensory or motor block in the three groups. Blood pressure, heart rate and respiratory rates did not differ singnificantly. We concluded that addition of tramadol to bupivacaine epidurally proved to be efficacious for treatment of postoperative pain than the use of bupivacaine alone without serious side dffects.

مقدم الرسالة:	ضياء الدين علي فرغلي سيد
موضوع الرسالة:	دراسة مقارنة التخدير باستخدام عقار السيفوفلوران بعقار الايزوفلوران أو التخدير النصفي للولادة القيصرية الاختيارية Sevoflurane Versus Isoflurane and Spinal Anesthesia During Elective Cesarean Birth
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم التخدير
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الاشراف:	أ.د/نوال عبد العزيز جاد الرب د/ زين العابدين زارع حسن د/ أحمد محمد أحمد مخلوف

ملخص الرسالة

تمت هذه الرسالة بعد أن وافقت لجنة أخلاقيات المهنة وبعد أخذ موافقة كتابية من كل الحوامل ، تضمنت هذه الرسالة ٩٠ سيدة حامل قررت لهم الولادة بواسطة الولادة القيصرية الاختيارية التي تمت بقسم التوليد وأمراض النساء بمستشفى أسبوط الجامعي في الفترة من عام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٢ م . تم تقسيم الحالات الي مجموعتين ، المجموعة الاولى تم تخديرها كلياً بواسطة عقار السيفوفلوران أو عقار الايزوفلوران ، والمجموعة الثانية تم تخديرها موضعياً باستخدام التخدير النصفي ، كل ذلك تقسيماً عشوائياً باستخدام دراسة مفتوحة (غير المعمي). كل الوسائل التي استخدمناها في التخدير خلال البحث كانت آمنة بالنسبة لكل من الام والطفل . يعتبر عقار السيفوفلوران بديل آمن وفعال للاستخدام في حالات الولادة القيصرية الاختيارية لما له من مميزات كالمحافظة علي ديناميكية الدورة الدموية والتنفسية ، عدم تأثيره علي أي من وظائف الكبد أو الكلي . ونسبة الزيادة الملحوظة للفلورايد أيون مع استخدام السيفوفلوران أو

الايذوفلوران كانت أقل بكثير من النسبة التي قد تؤدي الي تسمم الكلي ، بالاضافة الي
سرعة استعادة السيدة لوعيها الكامل بعد التخدير الكلي بعقار السيوفلوران مما يتيح
لها سرعة العناية بالمولود .

Summary of Thesis

The study included 90 pregnant women required delivery by elective cesarean section in the Department of Obstetrics and Gynecology, Assiut University Hospital, between 2000 and 2002. Pregnant women were randomly assigned to receive either sevoflurane, isoflurane or spinal anesthesia using an open (non-blinded) study design. We concluded that, all anesthetic techniques used proved foetomaternal safety, sevoflurane is a good alternative inhalational anesthetic can be used safely in elective caesarean section as it can maintaining cardiorespiratory stability, not affecting liver or renal functions with good foetomaternal outcomes when compared with isoflurane. The high serum fluoride levels associated with administration of sevoflurane or isoflurane anesthesia were not dangerous because it did not reach the level that cause nephrotoxicity. Also sevoflurane provide rapid emergence from anesthesia which give the mother good chance to take care of her baby rapidly when compared with isoflurane anesthesia that we can recommend usage of sevoflurane as maintenance of inhalational anesthesia during anesthesia of elective caesarean setion.

مقدم الرسالة:	فيكتور فتحي كامل
عنوان الرسالة:	فاعلية إعطاء عقار الكلونيدين على رعدة ما العمليات عقب التخدير بعقاري الهالوثان والسيوفلوران والتخدير الوريدي المستمر بعقار البروبوفول The Efficacy of Clonidine Administration on Postoperative Shivering Following Halothane, Sevoflurene and Continuous Intravenous Propofol Anesthesia
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم التخدير
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د. / سميرة محمد أحمد عمر أ. د. / محمد سامي عبد الرحيم

ملخص الرسالة

قد تم تخدير المجموعة الأونسي بعقار الهالوثان والمجموعة الثانية بعقار السيفوفلوران والمجموعة الثالثة بواسطة التخدير الكلي الوريدي بعقار البروبوفول . وقد وجد أن عدد كثير من العقاقير الدوائية له فاعلية في علاج والإقلال من حدوث الرعدة وفي هذه الدراسة قد تم اختيار عقار الكلونيدين عند إعطائه قبل إخراج الأنبوبة الحنجرية من المريض وقد وجد أن مادة الكلونيدين تقلل بصورة واضحة الحد الأدنى لحدوث ضيق الأوعية الدموية وقد كان ذلك مصحوباً بتثبيط الرعدة بعد العمليات بوضوح في كل المرضى المعالجون بهذا العقار تقريباً .

Summary of Thesis

The first group was assigned to receive halothane, the second group received sevoflurane and the third group was given total intravenous an anesthesia with propofol. A wide range of drugs have been reported to be effective in suppressing established shivering. It was found that clonidine markedly reduced the threshold for vasoconstriction with significant inhibition of postoperative shivering in nearly all treated patients regardless of anesthetic technique used.

مقدم الرسالة:	نجلاء حسين أحمد
موضوع الرسالة:	مقارنة بين استخدام عقار البروبوفول والسيفوفلورين وذلك لإدخال الماسك الحنجري للممر الهوائي Comparison of Propofol Versus Sevoflurane for Larynges Mask Mirnioty Insertions
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم التخدير
تاريخ الـنـم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / محمود عبد العزيز على أ.د / هاني أحمد إبراهيم المربع

ملخص الرسالة

استهدفت هذه الدراسة إجراء مقارنة بين استخدام عقار البروبوفول والسيفوفلورين وذلك لإدخال الماسك الحنجري للممر الهوائي . وقد أجريت هذه الدراسة بمستشفى أسبوط الجامعي على ٨٠ مريضاً تتراوح أعمارهم ما بين ٢٠ ، ٥٥ سنة طبقاً لجمعية التخدير الأمريكية وذلك في العمليات الاختيارية عن طريق التخدير الكلى وتم تقسيم المرضى عشوائياً إلى مجموعتين ووجد أن الاستنشاق الكامل السيفوفلورين بنسبة ٨% كافى تماماً لإدخال الماسك الحنجري ولكنه يستغرق وقت أطول من عقار البروبوفول .

Summary of Thesis

After obtaining the approval of the ethics committee of Assist University Hospital and obtaining an informed consent from the

patients, this study was performed on 80 patients of ASA physical status I and II, aged between 20 – 55 years, patients were divided into two groups for induction of anaesthesia with inhalational sevoflurane or I.V. propofol. We find that vital capacity breath inhalation induction with sevoflurane 8% is efficient for LMA placement, but takes slightly longer time than propofol.

مقدم الرسالة:	هدى فهمي محمود
موضوع الرسالة:	دور التهوية الغير اأأأأأأأ ذات الضغط الإأأأأأ المستمر في وحدة العناية المركزة The Role of Non – Invasive Continuous Positive Pressure Ventilation in the Intensive Care Unit
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم التخدير
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإأأأأ:	أ. د / صفية عبد الحميد مصطفى د / محمد سيد محمد مصطفى

ملخص الرسالة

أأأأ هذه الدراسة بوحدة العناية المركزة بمستشفى أسبوط الجامعي وقد استأأ القناع ذو الضغط الإأأأأأ المستمر في الممرات الهوائية كوسيلة لتأأأ استعمال الحأأأأ وأهاز التهوية الصناعي. هؤلاء المرضى يستأأمون قناع الأكسأأ التقليدية بنسبة أكسأأأ معينة ثم يتم استعمال القناع ذو الضغط الإأأأأأ المستمر بنفس نسبة الأكسأأأ السابق استأأأأهم لها.

Summary of Thesis

This study was used to evaluate facemask CPAP (FMCPAP) as a mean for non-invasive ventilation in 30 patients with acute hypoxemic and/or hypersonic respiratory failure. Patients were studied at a base line inspired oxygen fraction (FiO₂) by conventional

facemask, and then received mask CPAP at the same FiO_2 level, thus patients serving as their own controls. The results of this study showed that in 26 patients FMCPAP significantly improved the arterial blood oxygenation and they were weaned to conventional face mask without needing intubations.

مقدم الرسالة:	هشام عبد الغنى أحمد
موضوع الرسالة:	' التخدير الموضعى فى العمليات التى تجرى على البروستاتا من خلال مجرى البول' Local Anesthesia for Transurethral Prostatic Procedures
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم التخدير
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د/ محمد جمعة المظ أ.د/ حمدى عباس يوسف د. / محمد عبد البصير سيد

ملخص الرسالة

إن حالة المرض ما قبل العملية والوفيات فى المرضى الذين تجرى لهم عمليات قطع البروستاتا عن طريق مجرى البول تكون أعلى فى كبار السن عنها فى الأصغر سنا. ولقد ازداد بدرجة ملحوظة فى السنوات الأخيرة معدل التقدم فى العمر وما يصاحبه من أمراض وتدرج هذه المجموعة من المرضى إلى ٣ ، ٤ طبقا لتقسيم الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير ولا يوجد فرق كبير فى الأمراض الخطيرة ما قبل العملية والوفيات بين المرضى كبار السن الذين يجرى لهم تخدير كلى أو نصفى. يزداد مواجهة أطباء التخدير للتحديات فى تخدير هذه المجموعة من المرضى. ولقد نفذ عدد قليل من الدراسات باستخدام التخدير الموضعى والمهدئات كبديل للتخدير الكلى أو النصفى لعمليات قطع البروستاتا عن طريق مجرى البول.

لذا تقوم هذه الدراسة بتقييم الفاعلية والأمان للعمليات التى تجرى على البروستاتا فى المرضى كبار السن والأكثر إعتلالا تحت تأثير التخدير الموضعى والمهدئات.

Summary of Thesis

Transurethral surgery is performed on a relatively elderly surgical population, and is associated with considerable morbidity for example, myocardial mortality after transurethral resection of the prostate (TURP) is between 0.5 and 1%, increasing to more than 2% in patients over 80 years. Advancing age coupled with co-morbidity renders many patients with BPH unsuitable for the general or regional anesthesia required for TURP. These group of patients are graded III-IV using the American Society of Anesthesiologists Classification (ASA). Anesthesiologists are increasingly confronted with challenges of providing anesthesia for this group of patients. In a urological practice the diagnosis and treatment of urinary obstruction are daily tasks. Unfortunately, many patients present with urinary obstruction and are high surgical risk for regional or general anesthesia. These patients may benefit from local anesthesia. Few studies are carried out using local anesthesia and sedation as an alternative to general or regional anesthesia for TURP.

The aim of this study is to assess the efficacy and safety of transurethral prostatic procedures in elderly and medically compromised patients under local anesthesia and sedation.

هيثم طه حنفي	مقدم الرسالة:
تأثير اختلاف فترات التنبيب بالأكسجين ما قبل العملية علي فترة انقطاع النفس الآمنة بعد البدء في التخدير الكلي The Effect of Different Time Intervals of Pre-oxygenation on the Safe Apneic Period Following Induction of Anesthesia	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم التخدير	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »	تاريخ الصنف:
أ.د/ حسن إبراهيم محمد قطب أ.د/ محمد محمد عبد اللطيف	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

أجريت الرسالة علي ٦٠ شخص تتراوح أعمارهم ما بين ١٨-٤٠ سنة لدراسة تأثير إعطاء الأكسجين لمدة دقيقة، ٣ دقائق، ٥ دقائق علي فترة انقطاع النفس الآمنة بعد البدء في التخدير الكلي ووجد أن ٣ دقائق أفضل من دقيقة واحدة، بينما لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين ٣ دقائق، ٥ دقائق.

Summary of Thesis

We studied 60 patients aged between 18-60 years to study the effect of 1 minute, 3 minute and 5 minutes of pre-oxygenation on the safe apneic period following induction of anesthesia we found that there was no significant difference between 3 and 5 minutes, while 3 minutes is better than 1 minute.

قسم

الاسماء

الاسماء العجمية

شيرين عزت أمير	مقدم الرسالة:
دور الرنين المغناطيسي في تقييم الام مفصل الكاحل Role of Magnetic Resonance Imaging in Evaluation of Painful Ankle Joint	موضوع الرسالة:
كلية الطب - قسم الأشعة التشخيصية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »	تاريخ المقدم:
د/ أحمد مصطفى حامد د/ أسامة حارث عبد اللطيف د/ أسامة أحمد فاروق	لجنة الاشراف:

ملخص الرسالة

تم هذا البحث بمستشفى أسبوط الجامعي باستخدام الرنين المغناطيسي بقسم الأشعة التشخيصية في مدة زمنية بلغ اثنا عشر شهرا حيث خضع خمسة عشر مريضا يعانون من الام الكاحل للفحص الكامل كان منهم عشر رجال وخمس نساء وتبعنا للنتائج تم تقسيم للمرضي الي مجموعتين: المجموعة الاولى تشمل المرضي الذين يعانون من ألم الكاحل نتيجة التعرض لاصابة مباشرة • المجموعة الثانية تشمل المرضي الذين لم يتعرضوا لاصابة مباشرة ونستنتج من هذا العمل أن الرنين المغناطيسي هو الوسيلة المفضلة في تشخيص الام الكاحل •

Summary of Thesis

This study was carried out although a period of 12 months by the cooperation between the Radiology and Orthopedic Surgery

Department of Assiut University Hospital. The study included 15 patients suffering from painful ankle joint either traumatic (eight patients forming group I) or non-traumatic (seven patients forming group II) and all underwent our radiological work-up followed by MRI using the knee and head coils of a Philips Gyroscan 1.5 T. We concluded that MRI is even highly costly but still the only able to provide conclusive diagnosis in radiographically free parital ankle joint.

قسم

الاشعة الخارجية

مقدم الرسالة:	عبر فائق أمين
موضوع الرسالة:	دراسة إكلينيكية باثولوجية لعلاج الأورام الحرجة Clinico Pathological Study of Oncological Emergencies
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الأشعة العلاجية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د. / محمد عيد الحكيم مكاوي د. / حسين محفوف د. / طه زكي مهراوان

ملخص الرسالة

تتناول هذه الرسالة الحالات الحرجة في الأورام والتي تحدث نتيجة للورم نفسه أو ثانويات منه أو أثناء العلاج . وتشمل هذه الحالات ارتفاع ضغط المخ والضغط على الحبل الشوكي وظاهرة الوريد الأجوف العلوي وزيادة نسبة الكالسيوم بالدم وتفتيت الخلايا السرطانية بالدم والانسداد المعوي وحالات خاصة بالجهاز البولي مثل نزيف المثانة وانسداد الحالبين وأجريت هذه الدراسة على ٩٨ حالة حرجة تشمل الطرق المختلفة لعلاجها ونسبة الاستجابة .

Summary of Thesis

This study in oncologic emergencies could occur due to tumor itself or secondaries. It includes: Increased Intra-cranial tension, Spinal cord compression and superior vena cava syndrome,

hypercalcemia, tumor lysis syndrome, intestinal obstruction and bladder hemorrhage.

This study includes 98 patients and different method of treatment and the response to treatment.

مقدم الرسالة:	علا نبيه عبد الفتاح
موضوع الرسالة:	فاعلية وأمان استخدام عقار فوب ميجوس في تقليل الأعراض الجانبية للعلاج الإشعاعي لأورام الحوض والرأس والرقبة Efficacy and Safety of Wobe –Mugos Tm _E for Reducing the Side Effects Following Radiotherapy in Tumours of Head, Neck and Pelvis
الكلية والقسم:	كلية الطب – قسم الأشعة العلاجية
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د. / أمينة محمد مصطفى أ. د. / سامية عبد الكريم على د. / سمير شحاته محمد

ملخص الرسالة

وقد أثبتت الدراسة أن عقار فوب ميجوس يقلل الآثار الجانبية بنسبة ملحوظة لمرضى الرأس والرقبة وأن آثاره الجانبية قليلة جداً ولا تؤثر على المريض . أما بالنسبة لمرضى الحوض فلم تثبت الدراسة أي فاعلية ملحوظة للعقار من حيث تأثيره على الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي وفي نهاية الدراسة ينصح باستخدام هذا العقار مع مريض أورام الرأس والرقبة فقط .

Summary of Thesis

According to that trial, there is no significant effect of Wobe-Mugos E in reducing the side effects of radiotherapy in pelvis

tumours. In conclusion, the use of Wobe-Mugos E is effective when used with radio therapy as a radio protector in head and neck tumours, rather than in pelvic tumours.

قسم

الصحة العامة

مقدم الرسالة:	تفريد عبد العزيز محمد اسماعيل
موضوع الرسالة:	دراسة نمط الأمراض المعدية المسجلة في مركز الفتح محافظة أسسيوط Pattern of the Reported Infectious Diseases in El-Fateh District, Assiut Governorate
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الصحة العامة
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الاشراف:	أ.د/ كوثر عبد المتجلي فاضل د/ حسنية سعيد عبد المجيد

ملخص الرسالة

تهدف الدراسة الي تحديد نمط الامراض المعدية المسجلة في مستشفى حميات أسسيوط التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسسيوط. وكذلك القاء الضوء علي بعض العوامل الشخصية والبيئية المرتبطة بحدوث مرضي التهاب الكبدى والفيروسي والحمي التيفودية ، وقد وجد أن التهابات الجهاز التنفسي الحاد والنزلات المعوية والتهاب الكبدى الفيروسي والحمي التيفودية هم أكثر الامراض انتشارا بين الرجال بينما كانت التهابات الجهاز البولي والحمي الروماتيزمية أكثر انتشارا بين النساء وكانت التهابات الجهاز التنفسي الحاد هي الأكثر انتشارا بين جميع الاعمار ، أما التهاب الكبدى الفيروسي والحمي التيفودية فقد كانا أكثر انتشارا بين الاطفال والشبيبة بينما زادت التهابات الجهاز البولي بين البالغين وكبار السن، وقد زاد حدوث التهابات الجهاز التنفسي الحاد والنزلات المعوية والحمي التيفودية وكذلك التهابات الجهاز البولي في خلال شهور الصيف ، وقد كانت أكثر وفيات الامراض المعدية بين الاطفال الرضع ، وكانت التهابات الجهاز التنفسي الحاد والنزلات المعوية هي أكثر أسباب وفيات الاطفال الرضع والاقل من خمس سنوات. وقد لوحظ حدوث التهاب الكبدى الفيروسي والحمي التيفودية بكثرة في الوسط الاجتماعي المنخفض جدا والاسر كبيرة العدد وكذلك مع

نقص النظافة الشخصية وعدم النظافة البيئية وكذلك مع العادات غير الصحية في تناول الطعام وحفظه .

Summary of Thesis

Although most of the infectious diseases are preventable, they still represent a public health problem in our community as they affect all ages and cause substantial morbidity and mortality. It was found that ARI, AGF, viral hepatitis. Typhoid fever and UTI were the most common infectious diseases in our study. Viral hepatitis and acute gastroenteritis were significantly higher among males while UTI and rheumatic fever were significantly higher among females. ARI was the most common disease in all ages. Viral hepatitis and typhoid fever were more prevalent among children and adolescent while UTI was more common in adults and elderly. The occurrence of ARI, AGE. Typhoid fever and UTI was high in summer months. Most deaths of infectious diseases occurred among infants. ARI and AGE were the most common causes of death in infants and under five years. More occurrence of viral hepatitis and typhoid fever was observed in the very low socioeconomic classes. big families, overcrowdness. Lack of personal hygiene defective hand washing practices, lack of environmental sanitation (unhealthy water supply, sewage and refuse disposals) and with unhealthy food practices as eating of externally prepared food, food preservation outside the refrigerator and food preparation on the floor.

قسم

امراض التخاطب

مقدم الرسالة:	داليا جلال يس طايح
موضوع الرسالة:	تقييم الوظيفة الصوتية باستخدام الرسام الكهربى للمزمار في الصوت الطبيعى وحالات الصوت المرضى Electroglottographic Assessment of Phonatory Function in Normal and Pathological Voice Qualities
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم أمراض التخاطب
تاريخ الملح:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د. / محمد على سعد بركة د. / عصام الدين محمد مخلوف

ملخص الرسالة

صممت هذه الدراسة بهدف تقديم دلالات تشخيصية كميّة لجهاز الرسام الكهربى للمزمار لتطوير تطبيقاته وفوائده كوسيلة تقييم إكلينيكية للصوت ، وكذلك لفهم أعقق للعوامل الفسيولوجية المرضية للخلل الصوتى ، وقد أثبتت النتائج أن حساب معاملات الرسام الكهربى للمزمار قادرة على تقييم وظائف الحنجرة وتشخيص وجود خلل صوتى أو عدمه ، ويتميز الجهاز بكونه أداة غير نافذة على الإطلاق ولا يتعارض مع عملية التصويت ، بالإضافة لكونه وسيلة بسيطة وسريعة وقليلة التكلفة لقياس فسيولوجية الصوت .

Summary of Thesis

The aim of this study is to investigate the clinical importance of electroglottography as a non invasive method for studying the glottal activity in normal and pathological voice qualities in order to provide quantitative diagnostic electroglottographic indices that enhance its applicability and usefulness in clinical practice of voice assessment. The results indicated that electroglottographic parameters distinguished between normal and different pathological voice qualities. EGG is not uncomfortable because it is completely non invasive and it is one of the best procedure for reflecting the glottal condition during phonation, it is simple, valuable, fast, easy, economic and objective method of evaluating laryngeal function.

قلم

المصنف

مقدم الرسالة:	داليا إسماعيل عبد الرازق
موضوع الرسالة:	التعرف على أسباب الطنين في القوقعة أو المسار العصبي خلف القوقعة Identification of Cochlear and Retrocochlear Causes in Patients with Tinnitus
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم السمعيات
تاريخ المقدم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د / محمد مصطفى سعد د. / محمد سلامة بكسر

ملخص الرسالة

هذه الدراسة تتكون من عدد ٤٠ مريض يعانون من طنين وضعف سمع حسي وعصبي بالأذن يتراوح من الحدود الطبيعية للسمع إلى ضعف سمع حسي وعصبي متوسط . الأجهزة المستخدمة تتكون من حجرة عازلة للصوت أى ايه سى ١٦٠٢ وجهاز قياس السمع بالنغمات النقية مادسين موديل اوده-بى ٨٢٢ جهاز ضغط الأذن طراز (انتراكومستكس ايه د ٧) وجهاز الانبعاث الصوتى لقوقعة الأذن طراز (اوتو ديناميك ال تى دى) وجهاز استجابة جزع المخ الكهربى ، جهاز الرسم الكهربى للقوقعة (نيكولت سيبيريت) كل الأشخاص فى الدراسة يمرون بالاختبارات الاتية أخذ التاريخ المرضى - فحص إكلينيكى للأذن، قياس السمع بالنغمات النقية ويشمل التوصيل الهوائى والعظمى ، قياس ضغط الأذن قياس انبعاث الأذن الصوتى المثار - قياس الرسم الكهربى لقوقعة الأذن ، قياس استجابة جذع المخ الكهربى .

Summary of Thesis

This study was designed to explore the sensitivity of each of these tests in detection of cochlear and retrocochlear causes of tinnitus in subjects with sensorineural hearing loss. 1- To identify the underlying site of lesion in patient with tinnitus whether sensory (cochlear) or neural. 2- To compare the sensitivity of otoacoustic emission and EcochG in detecting cochlear type of lesion. 3- To study the sensitivity of ABR in detecting neurogenic cause in cases with no evidence of cochlear pathology.

مقدم الرسالة:	مصطفى رفعت محمد
موضوع الرسالة:	دراسة معدل حدوث سمية الأذن في المرضى تحت العلاج بالعقاقير ذات السمية للخلية Incidence of Ototoxicity in Patients Receiving Cytotoxic Medications
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم السمعيات
تاريخ المقم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د. / محمد مصطفى سعد أ. د. / أمينة محمد مصطفى د. / عصام الدين على محمود

ملخص الرسالة

دراسة معدل حدوث سمية الأذن في المرضى تحت العلاج بعقارى السيزبلائين و الفينكريستين و لقد أظهرت نتائج البحث أن مريضان من كل ثلاثة مرضى يتعاطون عقار السيزبلائين معرضون لخطر حدوث سمية الأذن، كما أظهر البحث أن عتبة السمع بالانغمات النقية قد ارتفعت في ٥٤% من المرضى الذين يتعاطون عقار الفينكريستين. وقد أظهر البحث أيضا حدوث تحسن نسبى بعد الجرعة الثانية ولكن هذا يتبع بانتكاسه أخرى بعد الجرعة الثالثة من كل من السيزبلائين والفينكريستين.

Summary of Thesis

A prospective study was performed on thirty five patients. twenty of them were receiving cisplatin and fifteen were receiving

vincristine. After therapy, significant audiometric changes in hearing thresholds were demonstrated in 67% of patients receiving cisplatin therapy. This means that there is a risk to develop cochlear toxicity in two out of three patients receiving cisplatin. There were also significant audiometric changes in hearing thresholds of 54% of patients receiving vincristine therapy. There was also an evidence of partial recovery after the first or second courses of therapy which is then followed by further deterioration.

قسم

المسؤولية

مؤلف الرسالة:	جمال عبد الله محمد باصهي
موضوع الرسالة:	القشرة المخية المهيمنة في الأصحاء مستخدمى اليد اليمنى أو اليسرى Cerebral Dominance in Healthy Right and Left Handers
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الفسيولوجيا
تاريخ الفحص:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د. أنور سيد محمد د. أيمن محمد خضسر د. إيناس أحمد حامد

ملخص الرسالة

تم في هذه الرسالة دراسة الفص المخى المهيمن لوظيفة اللغة . والتخطيط الكهربائى للمخ والجانب السائد من الجسم والوظيفة الذهنية (٢٥ طالب أيمن و ٢٢ طالب أعسر ٣ طالب أيمن وأعسر) . وقد أوضحت النتائج وجود تباين ملحوظ في نوع الفص المخى المهيمن للغة والجانب السائد من الجسم (اليد ، العين ، الرجل ، الأذن) في الطلاب الأعسر ، واليمن الأعسر وتفقو الأعسر ، والأعسر اليمن على اليمن في الوظيفة الذهنية.

Summary of Thesis

Cerebral dominance for language, Cognitive function, sidedness and EEG asymmetry were determined in 25 right-22 left- and 3

mixed-handed healthy students. Results showed that left- and mixed-handed subjects had more typical presentation for cerebral dominance and high cognitive function measurements than right-handed.

مقدم الرسالة:	طارق حمدي عبد الجابر
موضوع الرسالة:	التطور النسيجي والكيمياء نسيجي للحويصلات الليمفاوية في تجمعات باير في ذكور الجرذان البيض بعد الولادة Postnatal Development of Lymphoid Follicles in The Peyer's Patches of Male Albino Rat. Histological and Histochemical Studies
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الفسيولوجيا
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د. مديحة محمود محمد مخلوف د. كوثر محمد عبد الحميد

ملخص الرسالة

أجرى هذا البحث لدراسة التطوير النسيجي والكيمياء نسيجي لتجمعات باير في ذكور الجرذان البيض بعد الولادة . وقد وجد أنه في الحيوانات حديثة الولادة تظهر تجمعات باير على شكل نسيج ليمفاوي منتشر في الطبقة تحت المخاطية ويمتد إلى الطبقة الخاصة وتبرز إلى تجويف الأمعاء على شكل قبة . وقد ظهرت الحويصلات الليمفاوية الأولية عند عمر ١٥ يوم كما ظهرت الحويصلات الليمفاوية الثانوية عند ٢١ يوم مع التزايد في العمر قد وجد زيادة في حجم الحويصلات الليمفاوية . في الحيوانات المسنة لوحظ أن الحويصلات الليمفاوية أصبحت صغيرة في الحجم وغير محددة ولوحظ ضمور في الأنسجة الليمفاوية وكذلك تدهور الاستجابة المناعية .

Summary of Thesis

The present research was done to study some histological and histochemical features of the peyers patches of male albino rat at different postnatal ages. it was found that in newly born rat the peyer,s patches appear as diffuse lymphatic infiltration within the submucosa and extend to the lamina propria and projecting into the lumen as the dome. The primary lymphoid follicles has been developed by 15 days of age and the secondary lymphoid follicles by the 21 days of age. The size of peyer,s patches was increase with progression of age. In old age atrophy of the peyer,s patches was found together with decrease in the immune response and this may explain the susceptibility of elderly to gastrointestinal infectious diseases.

قسم

كيمياء حيوية

مقدم الرسالة:	آيات عبد الرحمن سيد
موضوع الرسالة:	تقييم الإنترلوكين - ١٠ ومستقبلات عامل النخر الورمي - الفاد الإنترلوكين ٨-٣٣ في اللبن الأمي في فترات مختلفة من الرضاعة Evaluation of Interlukin-10 Tumor Necrosis Factor - Alfa Receptors and Interleukin 8 in Human Milk at Different Periods of Lactation
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الكيمياء الحيوية
تاريخ المسم:	٢٠٠٢/٦/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / تحية هاشم سليم أ.د/ محمد محمود حمدي غزالي د/ عبد الرحيم محمد عبد الحفيظ

ملخص الرسالة

أكدت الدراسة وجود السيتوكينات في لبن الأمي في فترات الرضاعة المختلفة. لم يوجد اختلاف في محتوى السيتوكينات في كلا من لبن الأمهات للأطفال كاملي النمو والمبتصرين. لم يوجد اختلاف في محتوى السيتوكينات في كلا من اللبن الأمي في الأمهات التي يعانين من الحساسية والتي لا يعانين من الحساسية. وجود كلا من السيتوكينات المصاحبة للالتهابات والمضادة لها في اللبن الأمي لها دور وظيفي في الرضع والأطفال الذين يعانين من النقص في إنتاج السيتوكينات في المراحل الأولى من النمو.

Summary of Thesis

The presence of cytokines (IL-10, TNFRI, TNF-alpha, IL-6, and IL-6) in human milk at different periods of lactation is confirmed. There were no significant differences between full term and preterm milk in their cytokine profile. Changes in maternal cytokine profile due to factors like allergy did not totally reflect on milk composition of cytokines. The presence of cytokines in human milk has its functional effect on the recipient infants who have immature cytokine network.

مقدم الرسالة:	نجلاء كمال عبد الرحمن أندريس
موضوع الرسالة:	'موت الخلايا المبرمج ودوره في إصابات الرئة الحادة' Role of Apoptosis in Acute Lung Injury
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الكيمياء الحيوية
تاريخ المقم:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د. مديحة محروس زخاري د. / أميره مصطفى النويهى د. محمد سيد محمد مصطفى

ملخص الرسالة

وقد وجد أن المرضى المصابون بمتلازمة ضائقة التنفس الحاد يعرفون بأنهم يعانون من نقص الأكسجين في الدم غير مستجاب وذلك الوزمه الرئوية غير قلبية المنشأ ورشاحة الرئة على الجانبين بالإضافة إلى نقص المطاوعة الرئوية وضغط الإنسفين للشعيرات الرئوية طبيعى وذلك يعتبر دورا أساسيا في موت الخلايا المبرمج وضرورته في تولد طائفة التنفس الحاد وقد وجد إن هناك زاده ذات دلالة إحصائية في مستوى كلا من الكسباس -3- والفاس في المرضى عن المجموعة المقارنة وقد أتضح من متابعة هؤلاء المرضى انه يوجد ارتفاع ملحوظ في مستوى الفاس بالمصل بينما هناك نقص ذو دلالة إحصائية في الكسباس.

Summary of Thesis

Acute lung injury sever form of ARDS and leads to apoptosis with an increased level of Caspase-3 and Fas L. with increased levels of antioxidant stress in patients with acute lung injury. So can used antioxidant and antiapoptotic therapy for ARDS patients.

قسم

طب شرعي

والسوم

مقدم الرسالة:	صفاء ماهر جورج
عنوان الرسالة:	تور العقاقير ذات التأثير النفسي في حوادث الطرق بأسسيوط Role of Psychoactive Drugs in Road Traffic Accidents in Assiut
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الطب الشرعي والسموم
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / ناهد عبد المقصود عبد الحميد د / رندة حسين عبد الهادي

ملخص الرسالة

البحث عن دراسة وصفية والهدف منها معرفة نسبة إنتشار العقاقير ذات التأثير النفسي بين سائقي الحوادث المتكررين على مستشفى أسسيوط الجامعي وقد أجري البحث على ١٠٦٣ مصاب من المتكررين على قسم الإصابات بالمستشفى الجامعي بأسسيوط وكانت نسبة إنتشار العقاقير المتسببة للإدمان في السائقين هي (٣٤,٨%).

Summary of Thesis

The present study was conducted on the victims of road traffic accidents admitted to casualty Department of Assiut University Hospital during the period between February to September 2001. The total number of the victims was 1063, the group which was positive for drugs and alcohol (34.8%).

مقدم الرسالة:	نجوى محمود على أحمد غندور
عنوان الرسالة:	'مسح شامل للبول وذلك للكشف عن تعاطي العقاقير بين طلبة المدارس الثانوية في مدينة أسيوط' Urinary Screening for Drug Abuse Among Secondary School Students in Assiut City
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الطب الشرعي والسموم
تاريخ المقم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / عفاف محمد أحمد فرغلى د / وفاء محمد عبد المنعم عوض

ملخص الرسالة

تم عمل مسح شامل للبول وعمل اختبارات يتم بها الكشف عن بعض العقاقير (دلائل الألوان والكشف الكروماتوجرافي) وذلك لعدد ١٠٠٠ طالب وطالبة تم اختيارهم عشوائيا من تسع مدارس مختلفة في مدينة أسيوط. ووجد أن الحالات الموجبة ٤٩ حالة. وأن معدل إنتشار تعاطي العقاقير بين هؤلاء الطلاب ٥,٢%.

Summary of Thesis

Urinary screening had been done for detection of drug abuse by colour tests and thin layer chromatography. The studied students (1000 students were chosen randomly from 9 schools. The positive cases were 49. The prevalence of drug abuse among these students was 5.2%.

قسم

التشريع والاحكام

مقدم الرسالة:	هايدى رفعت محمد
عنوان الرسالة:	'دراسة تطور القناة الغضروفية فى عظمة القصبة للفأر الأبيض' Developmental Study of Cartilage Canal in Tibia of Albino Rat
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم التشريح والأجنة
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / رفعت شحاته محمد أ.د. / شفاء مصطفى مصطفى جاويش د. / محمد البدرى محمد

ملخص الرسالة

تم البحث بدراسة تطور القناة الغضروفية فى عظمة القصبة للفأر الأبيض لعدد ٤٥ فأر أبيض لأعمار مختلفة تبدأ من يوم قبل الولادة وتنتهى ٢١ يوم بعد الولادة وقسمت ٩ مجموعات . وكانت النتائج ظهور القناة الغضروفية فى عمر ٤ أيام بعد الولادة وتطورها وتكاثرها داخل الغضروف ومشاركتها فى تكوين وتطور مركز التعظم فى العظمة إلى أن احتفت فى عمر ٢١ يوم بعد الولادة .

Summary of Thesis

The study were taken on 45 albino rat on cartilage canal in the tibia. Ages were taken & 21 day prenatally at birth, 4 days, 7 days, 8days, 10 days, 14 days & 21 days postnatally. The canals appeared at 4 days old and disappear at 21 days old. It is important for nutrition and development of secondary ossification center.

قسم

الطب والصيدا

مقدم الرسالة:	رياب أحمد أحمد محمد
موضوع الرسالة:	تقييم الهستوباثولوجى للأنواع المختلفة من الالتهابات والتغيرات المصاحبة فى الأغشية المبطنه للمعدة Histopathological Evaluation of Gastric Biopsies for Different Types of Gastritis and the Associated Epithelial Changes, Retrospective Study
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الباثولوجيا
تاريخ المنح:	٢٤ / ١١ / ٢٠٠٢ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ محب فخرى دانيال أ.د/ اعتماد حلمى ياسين

ملخص الرسالة

وفى هذه الدراسة تم إعادة فحص ٢٠٥ عينة من عينات المعدة وقد وجد أن: ٦٦,٧% منها التهابات معدية مزمنة، ١,٧% قرح هضمية، ٢,١% التهابات حادة متفرقة، ١٧% عينات بدون تغيرات باثولوجية ذات مدلول معين، ٦,١% عينات غير صالحة للفحص الباثولوجي من حيث الكم والكيف، ٧,٧% أورام عدية خبيثة معوية - النوع، ٦,٩% أورام عدية خبيثة منتشرة - النوع، ٥٠,٤% أورام ليفمفاوية خبيثة من النسيج الليمفاوي المتكون فى بطانة المعدة نتيجة التهابات المعدة المزمنة. وبإعادة فحص حالات التهاب المعدة المزمنة (٣٤٧) وجدنا أنها تنقسم إلى: ٦,٩% منها التهابات سطحية و ٨,٣% التهابات معدية ضامرة متعددة اليوز. ٥,٢% التهاب منتشر بجيب المعدة. و ١,٧% التهاب كحيائي و ٢٧% بسبب ميكروب الهيلوباكتر الحلزوني و ٠,٢% التهابات بفطر الكانديدا وباقي الحالات وتمثل ٧٥,٠% شخصيت "التهابات معدية مزمنة غير محددة السبب" و بدراسة تغيرات الأغشية

المعدية المصاحبة لإصابة بميكروب الهليكوباكتر وجدنا أن نسبة الإصابة أكبر الرجال (٣٠%) منه في السيدات (٢٤%) ، ضمور الغدد وتحولها المعوي أكبر في نوى الأعمار المتقدمة (٦٠، عاما) عنه في المرضى الأقل عمراً تكون الحبيبات الليمفاوي السمة الظاهرة في الأطفال ، كثافة الميكروب تكون أكبر في جيب المعدة عنه في باقي الأجزاء منه ٣٨% من التهابات المعدة المزمنة الضامرة و ٣٤٥ من هذه الالتهابات المصحوبة بتغير معوي تكون مصابة بالميكروب وبإعادة تقييم عينات المعدة التي شخصت من قبل ' التهابات معدية مزمنة غير محددة السبب وجدنا أنه يمكن تحديد السبب في ٢١% من هذه الحالات .

Summary of Thesis

The histological approach to the diagnosis of chronic gastritis has undergone a series of re-evaluation over the last decade. In this retrospective study we evaluated 520 gastric biopsies and categorized them into 66.7% chronic gastritis, 2.1% acute erosive gastritis, 1.7% peptic ulcers, 17% biopsies without significant changes, 6.1% bad biopsies unfit for pathological diagnosis, 7.7% intestinal -type gastric carcinoma, 6.9% diffuse-type carcinoma, 0.4% MALT lymphoma. By re-evaluation of biopsies of chronic gastritis, we found 6.9% superficial gastritis, 8.3% multifocal atrophic gastritis, 5.2% diffuse 1.7% chemical, 27% H. pylori-induced gastritis 0.2% candidal gastritis and 50.7% chronic nonspecific gastritis. The prevalence of H. pylori infection in males (30%) was higher than that in females (24%). Chronic gastritis in biopsies from old peoples (>60 years) were

characterized by higher percentage of atrophic and metaplastic changes than younger age groups while the infection in children was characterized mostly by lymphoid follicle formation. The density of colonization of *H. pylori* and the associated histological features were more pronounced in the antral mucosa than in the fundic and the cardiac mucosa. The Histopathological examination of the gastric specimen should include information about the type, grade, extent, and topography of gastritis and the presence of significant accompanying epithelial changes.

أحمد عبد الستار عبد الحكيم	مقدم الرسالة:
دراسة هستوباثولوجية ومناعية هستوكيميائية عن تخليق الأوعية الدموية في حالات بطانة الرحم السوية وحالات النمو النسيجي والنمو الورمي	عنوان الرسالة:
Histopathological and Immunochemical Study of Angiogenesis in Normal, Hyperplastic and Neoplastic Endometrium	
كلية الطب - قسم الباثولوجيا	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤ م « ماجستير »	تاريخ الملصق:
٠ د / حسن الكاتب حسين	لجنة الإشراف:
٠ د / حسام ثابت سالم	
٠ د / حسين عبد المنعم حسن	

ملخص الرسالة

الدراسة الحالية نفذت على ٥٠ حالة من عينات بطانة الرحم . كل العينات صبغت بصبغة هيموتوكسلين وأيوسين وصبغة مناعية بمضاد عامل ٨ في دراستنا الحالية وجدنا زيادة عدد الأوعية الدموية في حالات النمو الورمي عن حالات النمو النسيجي وزيادة عدد الأوعية الدموية في الأخير عن حالات بطانة الرحم السوية .

Summary of Thesis

The work was done on 50 cases of endometrial biopsies. All specimens were subjected to H & E stain, immunostaining with factor

VIII antibody. In our work we found increase the angiogenic counts from normal endometrium to endometrial hyperplasia to endometrial carcinoma.

مقدم الرسالة:	جيهان محمد عبد المنعم العسيلي
عنوان الرسالة:	دراسة هستوكيميائية ومناعية لتكون الأوعية الدموية فر سوطان الحنجرة Immunohistochemical Study of Angiogenesis in Laryngeal Carcinoma (Retrospective Study)
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الباثولوجيا
تاريخ الجرم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / نعمت الله عبد الفتاح د / هشام سعد عطسا

ملخص الرسالة

لقد تم تقييم متوسط عد الأوعية الدموية فر خمسين عينة من مرضى سرطان الحنجرة باستخدام دلالة الأورام سى دى ٣٤ وقد أظهرت الدراسات الإحصائية عدم وجود علاقة ذات أهمية بين عد الأوعية الدموية الصغيرة وسن ونوع الجنس للمرضى وكذلك النوع الهستولوجى أو مكان الورم حيث كانت النتائج الإحصائية أكبر من ٠,٥ .

Summary of Thesis

Assesment of the average count of microvessels in fifty cases with laryngeal carcinoma by the endothelial marker CD 34 antibody. It was found that there was no statistical significant association between the average count of microvessels and the age, sex of patients and the type and site of the tumor.

مقدم الرسالة:	داليا أحمد حامد السرس
عنوان الرسالة:	دراسة إكلينيكية باثولوجية مقارنة لنتائج العينات المأخوذة بإبرة الرشف وبالإبرة القاطعة وبالطريقة الشقية في حالات تورم الفكين Fine Needle Aspiration Cytology, Tru-cut Needle Biopsy and Incisions Biopsy in Jaw Swellings. A Clinico-Pathological Comparative Study
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الباثولوجيا
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / عبد الهادي محمد محمد عمر د / محمد جلال مصطفى د / صلاح الدين جابر شلتوت

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة في قسمي الباثولوجيا وجراحة الوجه والفكين بمستشفى أسيوط الجامعي وشملت ٣٥ مريضاً يعانون من تورم الفكين وقد أجري لهم فحص إكلينيكي ومعللي وفحص بالأشعة ثم أخذت من كل مريض بعد موافقته ثلاث عينات بالإبرة الراشفة وبالإبرة القاطعة وأخرى بالطريقة الشقية أو القطعية . استهدفت هذه الدراسة تقييم المقدرة التشخيصية وحساسية الإبرة الراشفة والقاطعة مقارنة بالطريقة الشقية أو القطعية . وقد هذه الدراسة أن نسبة حساسية الإبرة الراشفة في تشخيص أورام الفكين هي ٥٧,٨ % ونسبة حساسية الإبرة القاطعة ٩٠,٣ % وفي ضوء هذه الدراسة تبين أن إبرة الرشف آمنة ومحتملة من غير تخدير موضعي وموفرة للوقت في تشخيص أورام الفكين . كما أنه يسهل بواسطتها التمييز بين الأورام الحميدة والخبيثة حيث أنها ذات فاعلية في وصف الخلايا فقط أكثر من تحديد معالم الورم . تتميز الإبرة

القاطعة بقدرتها على تحديد الصفات الهستولوجية ومعالم الورم مما يسمح بتصنيف
الورم وتحديد درجته.

Summary of Thesis

In this study, 35 patients with jaw swellings were investigated. We attempted at evaluation of the diagnostic role of fine needle aspiration cytology (FNAC) and tru-cut needle biopsy (TCNB) compared to excisions / incisions biopsy of these swellings. Our results showed that the sensitivity of FNAC was 75.8% and 90.3 in TCNB. FNAC in the diagnosis of jaw swellings has the advantages of being safe, cheap, and time saving. FNAC provides cytological than architectural details of a lesion, so it permits determination of its malignant or benign nature. TCNB is safe, but must be done under local anesthesia and easy to perform, as compared to excisions biopsy but the needle is expensive. It provides architectural details of the lesions, allowing greater accuracy in typing and grading of the tumors.

مقدم الرسالة:	عبيد الرفاعي محمد
موضوع الرسالة:	تقييم النشاط التكاثري لسرطان الثدي Assessment of Proliferative Activity in Breast Carcinoma
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الباثولوجيا
تاريخ الـمـم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الاشراف:	أ. د/ سناء سليمان عبد الحميد د/ فاطمة أحمد محمود بداري

ملخص الرسالة

شملت هذه الدراسة الاستيعابية ٥٠ حالة من حالات سرطان الثدي الاولي المنتشرة وهي مقسمة كالتالي: ٣٩ حالة للسرطان القنوي المتشعب ، ٣ حالات سرطان لبني ، حالتان من السرطان العجري ، حالتان من السرطان المخاطي ، حالة سرطان غربالي ، حالة سرطان قصبي ، حالة سرطان حشقي وحالة مختلطة من كل من السرطان المخاطي والسرطان القنوي المتشعب . استخدمت في هذه الدراسة ٤ طرق لتقييم النشاط التكاثري في سرطان الثدي وهي: عدد الانقسامات الميوزية في ١٠ مجالات ميكروسكوبية عالية التكبير ، عدد الانقسامات الميوزية في ١٠٠٠ خلية سرطانية ، الفحص الكيميائي المناعي الخلوي باستخدام مضاد Ki-67 ، وعد مناطق منظمات النوية بعد صباغتها بنترات الفضة وهذه الطرق أجريت علي قطاعات الانسجة المغمورة في شمع البرافين. وقد تم تدرج حالات السرطان القنوي المتشعب باستخدام طريقة SBR المعدلة. أظهرت هذه الدراسة ان أبسط وأفضل الطرق لتقييم النشاط التكاثري لسرطان الثدي هو عدد الانقسامات الميوزية سواء في ١٠ مجالات ميكروسكوبية عالية التكبير هو الطريقة الوحيدة التي ارتبطت بانتشار الورم للغدد

الليمفاوية تحت الابط ، وأن الفحص الكيميائي المناعي باستخدام مضاد Ki-67 هو مؤشر عملي يمكن الاعتماد عليه ومفيد في قياس تكرار الورم لأنه يعكس نشاط الورم ، وكذلك يعتبر عد مناطق منظمات النوية وسيلة بديلة لتقييم النشاط التكاثري في سرطان الثدي ، ولكن في المعامل الباثولوجية التي لا تسمح لها امكانياتها باستخدام الفحص المناعي الخلوي فإنه يمكن الاستعاضة عنه بعدد الإقسامات المينوزية في ١٠ مجالات ميكروسكوبية عالية التكبير حيث أنه يعطينا نتائج مقارنة لتلك التي نحصل عليها من كيمياء الخلايا المناعية.

Summary of Thesis

This study included 50 cases of primary invasive breast carcinoma. They included 39 cases of infiltrating duct carcinoma, three of medullary carcinoma, two of tubular carcinoma, two of mucoid carcinoma and one case of cribriform carcinoma, one lobular carcinoma, one case of mixed mucoid and a case of squamous cell carcinoma. Four methods of estimating proliferative activity were compared: mitosis per 10 high power fields, mitosis per 1,000 tumour cells, Ki-67 immunostaining and detection of NORs by silver stain. All methods were done on paraffin embedded materials. The cases of infiltrating duct carcinoma graded according to modified SBR classification. This study have shown that the simplest and best method for determining the proliferation fraction of breast carcinoma, is mitotic figure count performed a mitosis per 10 HPF or mitosis per

1,000 tumour cells according to the protocol used. There was strong correlation between different methods of evaluating cellular proliferation. Also, very strong correlations were found between tumour grade and methods of estimating proliferative activity. MFC was the only method associated with presence or absence of lymph node metastases, Ki-67 labeling index is a reliable practical and useful method for measuring proliferative activity because its expression reflects the tumour proliferation pool. Ag- NOR is an established alternative method for determining proliferative rate in breast carcinoma. However, in surgical pathology laboratories that cannot afford the cost of immunohistochemistry, MFC can provide an estimation of proliferation fraction close to Ki - 67 immunostaining.

قسم

الفرما كولوبيا

مقدم الرسالة:	يحيى محمد علي الغنطاري
موضوع الرسالة:	تعيين التغيرات في مستوى مادة الإبينفرين في البلازما بعد الحقن بالتخدير الموضعي بطرق مختلفة في طب الأسنان. Evaluation of the Alterations in the Plasma Catecholamine Levels After Injection of Local Anesthetics by Different Techniques in Dentistry
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الفارماكولوجيا
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/أحمد عثمان عبد الظاهر د/سهير محمد كامل

ملخص الرسالة

تم قياس التغيرات في كاتي كولا امين البلازما التي تتطور بعد حقن ميبيفيكايين لوحده ارتفاعا في مستوى الإبينفرين وكان ملاحظا وأكثر قيمة في ميبيفيكايين مع الإبينفرين. دويامين البلازما لم يتغير أبدا. وكل التقنيات لم تلتج تغيرا في متوسط الضغط الشرياني ، ولكن هناك تغير في معدل النبض في ميبيفيكايين مع الإبينفرين. وتقنية الحقن الرباطي البطيء أعطت أقل نسبة ملوثة في ارتفاع إبينفرين ونورإبينفرين البلازما وكذلك معدل النبض. هذه النتائج تقترح بأنه هناك إبينفرين ونورإبينفرين قد أفرز داخليا.

Summary of Thesis

The change in the plasma catecholamine levels that developed after injection of mepivacaine without or with epinephrine by different techniques in dentistry were evaluated. Plain mepivacaine produced an elevation in the plasma epinephrine level, and more marked and more sustained in mepivacaine with epinephrine. The plasma norepinephrine level was increased in mepivacaine alone or in mepivacaine with epinephrine. The plasma dopamine level did not change. All techniques produced no change in the mean arterial blood pressure. But there was a marked increase in pulse rate in mepivacaine with epinephrine. Slow periodontal ligament injection technique produced the least percentages of increase in the plasma epinephrine and norepinephrine levels and in pulse rate. These results suggest that an endogenous epinephrine and norepinephrine were released.

قسم

المستلوجات

مقدم الرسالة:	داليا عبده على الجمل
موضوع الرسالة:	"التغيرات النسيجية والكيمياء نسيجية في القشء المخاطى لأمعاء الجرذان البيض في الأعمار المختلفة والتباين الجنسى" Age Related Histological and Histo-Chemical Change of Albino Rat Intestinal Mucosa and Gender Variability
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الهستولوجيا
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	د / صفاء أحمد عبد المقصود د / همت هريدى غفیر

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثير التغيرات العمرية والتباين الجنسى على ذكور وإناث الجرذان البيض خلال الأعمار المختلفة باستخدام الطرق النسيجية والكيمياء النسيجية ، ففي الأمعاء الدقيقة وجد زيادة في تفاعل إنزيم الأكالين فوسفاتيز مع تقدم العمر . كما ظهرت الأشكال المينوزية في الجرذان صغار السن أكثر منها في العمر البالغ أما خلايا بانث فقد قل عددها في الجرذان كبار السن وكانت الخلايا الكاسية أيضا تقل في الجرذان كبار السن وكانت المادة المفرزة منها مادة حمضية ، أما الخلايا الصم المعوية فقد لوحظ زيادة في نشاطها مع التقدم العمرى للذكور أكثر منها في الإناث وفى الأمعاء الغليظة فقد لوحظ زيادة في أعداد وكثافة الغدد المعوية مع تقدم العمر ، وظهرت الخلايا الكاسية في زيادة مع التقدم العمرى للإناث أكثر منها في الذكور كما أن الخلايا الصم المعوية كانت أكثر نشاطا في الذكور عن الإناث مع تقدم العمر . ونعزى تلك التغيرات في الإناث عن الذكور إلى دور الهرمونات الأنثوية .

Summary of Thesis

The present research was done to study histological and histochemical features of intestinal mucosa in male and female albino rats at different ages. In the small intestine, positive reaction for alkaline phosphatase reaction was detected in the adult age and decreases with aging. Mitotic figures were more seen in the young male and female than the adult age. Paneth cells decreased in the elderly age. Goblet cell also decreased with age and they produce acid mucosubstances, Strong positive reaction was seen for entero-endocrine cells increase with age more in female. Entero – endocrine cells were more in male than female with age. Therefore female sex hormones may play an important role in the age related changes in the intestinal epithelium.

قسم

ميكروبيولوجيا

مقدم الرسالة:	نيفين عبد المحسن عباس أحمد
موضوع الرسالة:	دراسة مسح وتصنيف ميكروب السودوموناس إيروجينوزة في عدوى المسالك البولية المصاحبة للقسطرة البولية في مستشفى أسبوط الجامعي Incidence and Typing Study of <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> Nosocomial Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Assiut University Hospital
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الميكروبيولوجيا
تاريخ المسم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / أحمد صادق أحمد أ.د / محمد عصام الدين عثمان د / محمد سعيد بداري

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى قيام بدراسة مسح وتصنيف لميكروب السودوموناس إيروجينوزة في عدوى المسالك البولية المصاحبة للقسطرة البولية في قسمين بمستشفى أسبوط الجامعي؛ قسم جراحة المسالك البولية وقسم العناية المركزة.

Summary of Thesis

The study aimed to perform an incidence and typing study of *Pseudomonas aeruginosa* catheter-associated urinary tract infection in two departments of Assiut University Hospital, department of Urology and the ICU.

مقدم الرسالة:	هناء عبد الحكيم نفاذي
عنوان الرسالة:	التشخيص السيريولوجي للحصبة الألمانية وفيروس الخلية المتضخمة والهربس بين السيدات الحوامل نوات الإجهاض المتكرر Serodiagnosis of Rubella, Cyromegalovirus and Herpes Simplex Virus Type-2 Among Pregnant Women with A History of Habitual Abortion
الكلية والقسم:	كلية الطب - قسم الميكروبيولوجيا
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / خالد محمد حساتين د / إحسان عبد الصبور حسن د / أحمد فايق أمين

ملخص الرسالة

دراسة العلاقة بين الإجهاض المتكرر ووجود الجولوبيونات من النوع (ام و جي) لكل من الحصبة الألمانية وفيروس الخلية المتضخمة والهربس. وجد أن ٩٨% و ٢٣% من الحالات إيجابي للجولوبيونات من النوع (ام و جي) لفيروس الخلية المتضخمة على التوالي و ٩٤% و ١٤% من الحالات إيجابي للجولوبيونات من النوع (ام و جي) للحصبة الألمانية على التوالي و ١٠٠% و ٩٠% من الحالات إيجابي للجولوبيونات من النوع (ام و جي) للهربس على التوالي .

Summary of Thesis

The study investigate the relation of HCMV, RV and HSV-2 (IgG & IgM) antibodies and habitual abortion and found that 98% of cases were seropositive for HCMV IgG antibodies and 23% of cases were seropositive for HCMY IgM antibodies. Rubella virus IgG antibodies were seropositive in 94% of cases while rubella virus IgM antibodies were seropositive in 1.14% of cases. HSV-2 IgG antibodies were seropositive in 100% of cases while HSV-2 IgM antibodies were seropositive in 90% of cases.



كلية الصيدلة

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير


بكلية الصيدلة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢

درجة الماجستير			البيان
أجمالي	طالبة	طالب	
٢	٠٠	٢	العقاقير
٢	٠٠	٢	الصيدلة الصناعية
٢	٠٠	٢	كيمياء حيوية
١	٠٠	١	كيمياء صيدلة طبية
٧	٠٠	٧	الإجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير بكلية الصيدلة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢



قسم

الحقائق

جمال عبد الله محمد حسين	مقدم الرسالة:
دراسة عقاقيرية لنبات السبيريس روتندس (ل.) (السعد) التابع للعائلة السعدية الذي ينمو في مصر. Pharmacognostical Study of <i>Cyperus Rotundus</i> (L.) Family Cyperaceae, Growing in Egypt	موضوع الرسالة:
كلية الصيدلة - قسم العقاقير	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١/٢٠ « ماجستير »	تاريخ المحم:
أ.د/ هناء محمد سيد د/ محمود حامد محمد د / سلوى فاروق فرج	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تنقسم الرسالة إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: ويشمل علي الدراسة النباتية لنبات " السبيريس روتندس ل. الجزء الثاني: يشمل علي الدراسة الفيتوكيميائية لنبات السبيريس روتندس ل. وقد تم فصل ١١ مركب كيميائي منهم اثنان يفصلان لأول مرة من الفصيلة السعدية و ٦ مركبات تفصل لأول مرة من نوع النبات و ٣ مركبات فصلت قبل ذلك من النبات. الجزء الثالث: دراسة بيولوجية للمستخلصات المختلفة لدرنات السبيريس روتندس ل.

Summary of Thesis

The thesis was divided into three parts Part I: Macro- and micromorphological study of *Cyperus rotundus* L. Part II:

Phytochemical study of *Cyperus rotundus* L., two of them were isolated for the first time in genus *Cyperus*, six were reported for the first time in *Cyperus rotundus* L. and three were reported previously from *Cyperus rotundus* L. Part III: Biological investigation for the different extractives of *Cyperus rotundus* L. tubers.

مقدم الرسالة:	وائل مصطفى عبد المجيد مصطفى
موضوع الرسالة:	دراسة عقاقيرية لنبات التيكوما مولس همب و بونيل (تيكونا فيلوتينا لنذل ، نوع فيلوتينا هورت) المنزرع في مصر : العائلة البجنونية" Pharmacognostical Study of <i>Tecoma Mollis</i> Humb & Bonpl. (T. velotina lindle, T. Stans Var. Velotina Hort.) Cultivated in Egypt, Family Bignoniaceae)
الكلية والقسم:	كلية الصيدلة - قسم العقاقير
تاريخ المنح:	٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٢ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ نصر أحمد العمري أ.د/ عزة عباس خليفة د / أنعام يونس بخيت

ملخص الرسالة

نسبات التيكوما مولس (همب و بونيل) هو نبات تابع للعائلة البجنونية ، تنقسم هذه الدراسة الي ثلاثة أجزاء اساسية: الدراسة النباتية وتشمل: دراسة الصفات العيانية والمجهريّة للأجزاء المختلفة (الأوراق، الساق وقلف الساق) وذلك للتعرف عليها سواء في الحالة الصحيحة أو علي هيئة مسحوق . الدراسة الفيتوكيميائية وتم فصل احد عشر مركبا وهي: الفا اميرين، أورسوليك ألدهايد، بيتا سيتوستيرول، لاکتون حامض الأورسوليك، حامض الأورسوليك، حامض التورمينتيك، بيتا سيتوستيرول - ٣ - أ - جلو كوزيد، أبيجينين - ٧ - أ - راموزيد، أبيجينين - ٧ - أ - روتينوزيد و الفيسينين - ٣ . الدراسة البيولوجية وتشمل دراسة بعض الخواص الفارماكولوجية للمستخلصات مثل: الفاعلية كمضاد للإلتهابات ومسكن للألام وخافض للحرارة. - التأثير على الجهاز العصبي المركزي وكذلك دراسة سمية المستخلصات المختلفة للأوراق

Summary of Thesis

The present study was planned to include the following: Macro - and micromorphological study of different organs as leaves, stems and stem bark to identify these organs in the entire and powdered forms. Phytochemical study with the separation of eleven compounds; α -Amyrin, Ursolic aldehyde, β -Sitosterol, Ursolic acid lactone, Ursolic acid, 2- epi-tormentic acid, β -Sitosterol glucoside, Apigenin -7-0-rhamnoside, Luteolin 7-0-rutinoside and Vicenin-2. Biological study include; analgesic, anti-inflammatory and antipyretic with activity on the CNS and acute toxicity in mice.

قسم

الصحة والصناعة

مقدم الرسالة:	محمد أحمد أمين درويش
موضوع الرسالة:	صياغة وتقييم بعض الأغشية البوليمرية الدوائية والمستخدمة في العلاج عن طريق الجلد Formulation and Evaluation of Some Medicated Polymeric Topical Films
الكلية والقسم:	كلية الصيدلة - قسم الصيدلة الصناعية
تاريخ الترم:	٢٨ / ٤ / ٢٠٠٢ > ماجستير <
لجنة الإشراف:	أ.د/ أحمد السيد أبو طالب أ.د/ إيمان مصطفى سامي أ.د/ أحمد إسماعيل محمد

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى دراسة إمكانية تحضير وصياغة تركيبات مناسبة لأغشية بوليمرية موضعية دوائية لعقار التتراكين هيدروكلوريد الذي يعد واحداً من الأدوية ذات التأثير المخدر الموضعي الفعال ، وقد اشتملت الرسالة علي ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: تحضير أغشية الأيدراجيت البوليمرية ودراسة خواصها الفيزيوكيميائية وقد تم استخدام نوعين من البوليمر الأيدراجيت هما رس ١٠٠ والأيدراجيت رس ب م الجزء الثاني: تقييم أغشية التتراكين هيدروكلوريد المكونة من بوليمرات الأيدراجيت واشتمل هذا الجزء دراسة انطلاق العقار من الأغشية البوليمرية وكذلك دراسة التداخلات الفيزيوكيميائية للعقار في الأغشية البوليمرية ، الجزء الثالث: التقييم البيولوجي لأغشية التتراكين هيدروكلوريد البوليمرية ويشمل تحضير وتقييم أغشية التتراكين البوليمرية للاستخدام البيولوجي وتأثير طول الفترة الزمنية علي الخواص الفيزيوكيميائية للعقار والتقييم البيولوجي لأغشية التتراكين هيدروكلوريد البوليمرية .

Summary of Thesis

The thesis concerned with formulation and evaluation of some medicated polymeric topical films. The work was performed in three parts: The first part involved the formulation and evaluation of physicochemical properties of Eudragit films. The second part involved the investigation of some factors which affecting the release profiles of tetracaine hydrochloride from Eudragit films. Also the possibility of interaction between the drug and the polymers used and the release of the drug from cream base. The final part involved the biological evaluation of tetracaine hydrochloride Eudragit polymeric films using tail flick method.

مقدم الرسالة:	أسامة سلام سليمان أبو عريضة فلسطيني الجنسية -
موضوع الرسالة:	دراسة علي صياغة وإتاحة الميكلوزين هيدرو كلوريد من مستحضرات صيدلانية معينة A Study on the Formulation and Availability of Meclozine HCl from Certain Pharmaceutical Dosage Forms
الكلية والقسم:	كلية الصيدلة - قسم الصيدلة الصناعية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢ / ٥ / ٢٦ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ أحمد السيد أبو طالب أ.د/ علي عبد الظاهر عبد الرحمن د / محروس عثمان أحمد

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة الى زيادة معدل الإذابة لعقار الميكلوزين هيدروكلوريد وذلك بقصد تحسين معدل الإتاحة الحيوية لهذا العقار . وقد تم القيام بتحضير بعض الصور الصيدلانية المحتوية علي العقار . وبدراسة هذه الصور وجد أن معدل ذوبانية العقار قد تحسن بشكل ملحوظ . كذلك تم صياغة العقار في صورة أقراص باستخدام طريقتي الكبس المباشر وطريقة التحبب الرطب . كما تم صياغة العقار في صورة أقماع شرجية وذلك باستخدام أنواع مختلفة من قواعد الأقماع شرجية . وبتقييم الأقراص والأقماع الشرجية التي تحتوي علي العقار بالإضافة إلي دراسة ثباتية العقار في هذه الصواغات ومعدل الإتاحة الحيوية للعقار من هذه الأشكال الصيدلانية المختلفة وجد أنه طراً تحسن ملحوظ سواء علي معدل ذوبانية العقار ومعدل إتاحتة الحيوية من هذه الصواغات بالمقارنة مع العقار المنفرد .

Summary of Thesis

The aim of the thesis was to improve the dissolution of the poorly water soluble anti-histaminic drug; Meclozine HCl. This was achieved by the incorporation of the drug into certain pharmaceutical systems, namely solid dispersions with certain hydrophilic carriers, inclusion complexes with certain cyclodextrins and adsorbents on the surface of certain adsorbents. These systems were characterized and evaluated concerning the release of the drug. Systems contain Meclozine HCl which exhibited best drug release were formulated into tablets using direct compression and wet granulation methods. Also, meclozine HCl containing suppositories were formulated. Both dosage forms were evaluated. Furthermore, the stability and the bioavailability of the two dosage forms were evaluated.

قسم

العلوم الحيوية

مقدم الرسالة:	حافظ رجب حافظ مذكور
موضوع الرسالة:	'مستويات اللبتين وعامل النمو المشابه للأجسولين - ١ في أمصال السيدات المصابة بمرض تكيسات المبيض' Serum Leptin and Insulin Like Growth Factor - I (IGF-I) Levels in Women with Polycystic Ovary Syndrome
الكلية والقسم:	كلية الصيدلة - قسم الكيمياء الحيوية
تاريخ المحم:	٢٠٠٢/٣/٣ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د. / أميرة مصطفى التويهي د. / عبد الرحيم محمد عبد الحفيظ د. / صفوت عبد الراضي محمد

ملخص الرسالة

لقد أوضحت الدراسات السابقة أن متلازمة مبيض عديد التكيسات لها كثير من المسببات والتي قد يكون السمنة أحد منها . وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن هرمون اللبتين الذي يفرز من الخلايا الدهنية أحد دلالات السمنة يمكن أن يكون له علاقة بمسببات هذه المتلازمة . وبناء عليه قد أجريت هذه الدراسة علي خمسين من السيدات المصابات بالمبيض عديد التكيسات المتلازم وقد تم تقسيمهن إلي خمس وعشرون سيدة سمنة وخمس وعشرون سيدة غير سمنة تبعاً لمؤشر كتلة الجسم ، ومن ناحية أخرى تم أخذ ثلاثون سيدة عادية غير مريضة كمجموعة ضابطة والتي قد تم أيضاً تقسيمهن إلي خمس عشرة سيدة سمنة وخمس عشرة سيدة غير سمنة وقد تم فحص السيدات المرضيات أكلينيكيًا وباستخدام الموجات فوق الصوتية . وقد تم أخذ عينات الدم صائمة من كل من المجموعتين وفصل المصل بجهاز الطرد المركزي وتخزينه عند -

٧٠ درجة مئوية ٠ وقد تم قياس مستويات كلاً من: - اللبتن - الأتسولين - عامل النمو المشابهة للأتسولين - هرمون الحادثة للحويصلات الصفراوية - هرمون الحادثة لحويصلات جراف - التستوستيرون - الاندروستاتنديون - الجلوبيولين المقترن بهرمون الجنس في أمصال كلاً من المرضى والمجموعة الضابطة ٠ ونستخلص من هذه الدراسة أن مستويات اللبتن قد زادت بصفة جوهريّة في أمصال السيدات السمينات سواء كانت مريضات أو غير مريضات وأن هذا الهرمون قد ارتبط بصفة جوهريّة بمؤشر كتلة الجسم وأنه لا يوجد أية ارتباط بصفة جوهريّة بين مستويات اللبتن ومستويات التستوستيرون والاندروستاتنديون والجلوبيولين المقترن بهرمون الجنس علاوة على هذا لا يوجد ارتباط جوهري بين مستوي اللبتن وارتفاع مستوي الأتسولين في المجموعة السميّة للسيدات المريضات مما يوحي بأن مقاومة الأتسولين في هؤلاء ليس فقط معتمداً على السمنة ولكن متلازمة مبيض عديد التكيسات لها دور في هذه المقاومة ٠

على أية حال فإن وجود الارتباط الجوهري بين مستويات اللبتن ومستويات عامل النمو المشابه للأتسولين - ١ في أمصال جميع السيدات المريضات وبالأخص المجموعة السميّة منها بالإضافة إلى وجود الارتباط الجوهري بين مستويات اللبتن ومستويات عامل النمو المشابه للأتسولين - ١ في أمصال جميع السيدات المريضات وبالأخص المجموعة السميّة منها بالإضافة إلى وجود ارتباط جوهري بين مستويات عامل النمو المشابه للأتسولين - ١ ومؤشر كتلة الجسم يوحي بأن اللبتن يمكن أن يلعب راً في تطوير ارتفاع الاندروجينات في السيدات متلازمة مبيض عديد التكيسات ٠

Summary of Thesis

Polycystic ovary syndrome (PCOS) women are frequently associated with obesity and insulin resistance. Leptin, the product of ob gene, is an adipocyte secreted molecule that signals the magnitude of energy stores to the brain and has been shown to have important effect on the reproductive axis of rodents. To assess the potential contribution of leptin to the pathogenesis of PCOS, we measured serum leptin levels in 50 women with PCOS with either amenorrhea or oligomenorrhea and in 30 normal healthy control women with regular menstrual cycles. Fasting blood samples were obtained from all subjects, sera were separated by centrifugation and stored at -20°C. Until analysis of leptin, IGF-1, insulin, LH, FSH and T using ELISA technique and Androstenedione and SHBG using RIA technique. Serum leptin levels were increased in obese women with or without PCOS. In PCOS and control women, serum leptin levels were positively correlated with BMI, but did not show any significant correlations with FSH, LH, testosterone, and androstenedione. Moreover, the absence of correlation between hyperinsulinaemia and hyperleptinaemia in obese PCOS women suggested that insulin resistance is not solely dependent on obesity in these patients, but that PCOS also contributes to develop the insulin resistance. However, the significant correlations between IGF-1 and leptin in PCOS and in obese PCOS group of women, besides the positive correlation

between IGF-I levels and BMI suggested that leptin may play a role in the development of hyperandrogenism in PCOS women . Therefore, the results of the present study did not permit us to conclude whether the increase in serum leptin is involved directly in the development of PCOS or merely reflects the presence of obesity in these women, without any pathophysiologic significance.

مقدم الرسالة:	محمد إبراهيم قطب السيد
موضوع الرسالة:	دور كلاً من عامل النخر الورمي - ألفا والانتريوكين - ٦ وكاسباس - ٣ في أمراض الرئة بعمال مصنع الأسمنت بأسسيوط The Role of Tumour Necrosis Factor - Alpha (Tnf a) Interleukin - 6 (IL- 6) and Caspase - 3 in Lung Diseases of Cement Factory Workers in Assiut
الكلية والقسم:	كلية الصيدلة - قسم الكيمياء الحيوية
تاريخ المحم:	٢٠٠٢ / ٣ / ٣ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ علي حسين علي حسن زرور د/ تحية هاشم سليمان د / أميرة مصطفى النوبهي

ملخص الرسالة

اشتملت الدراسة علي أربعون عامل من غير المدخنين يعملون في مصنع الأسمنت بأسسيوط في قرية منقبا د . اختيروا بشكل عشوائي من العمال المعرضين لترايب الأسمنت. وقسموا طبقاً لفترة التعرض إلي مجموعتين: الأولى تشمل أولئك الذين قد تعرضوا لأكثر من عشر سنوات (العدد = ١٨) ، والثانية تشمل أولئك ، الذين قد تعرضوا لأقل من عشر سنوات (العدد = ٢٢) ، والجميع أعمارهم تتراوح من ٢٤ - ٤٢ سنة ، بالإضافة إلي مجموعة ضابطة مكونة من أربعون ذكر من الأصحاء تقريباً لهم نفس أعمار العمال المعرضين ونفس حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . وقد أجري علي كلتا المجموعتين الآتي:

تساربخ:هنتسي مفصيل - فحص سريري دقيق - سيروميتر (والذي يقيس الاختبارات الوظيفية الرئوية التالية: سعة الدفع الحيوية أكبر - حجم زفيري مدفوع -

نسبة أكبر حجم زفيري مدفوع / سعة الدفع الحيوية - نسبة ذروة التدفق الزفيري -
نسبة ذروة التدفق الشهيق - تحديد مستوي كلاً من عامل النخر الورمي - ألفا ،
والانترليوكين - في بلازما الدم للعمال المعرضين ، وكذلك تحديد نشاط كسباس - ٣
في كرات الدم البيضاء للعمال ، نتائج الدراسة الحالية قد وضحت أن: الاختبارات
الوظيفية الرئوية قد انخفضت انفاض جوهرى في العمال المعرضين بالمقارنة بمجموعة
الضابطة. هذا الانخفاض في الوظائف الرئوية كان من القيمة الهامة في العمال الذين قد
عرضوا لغبار الأسمنت لأكثر من ١٠ سنوات مقارنة بأولئك الذين قد تعرضوا لأقل من
١٠ سنوات ، الزيادة الجوهرية في مستوي كلاً من عامل النخر الورمي - ألفا ،
والانترليوكين - ٦ وكسباس - ٣ ، قد وجدت في العمال المعرضين مقارنة بالمجموعة
الضابطة وخاصة في المجموعة التي قد تعرضت لغبار الأسمنت لأكثر من عشر سنوات
. وقد وجد ارتباطاً وثيقاً بين الثلاثة عوامل التي قد تمت الدراسة عليها .

Summary of Thesis

The present study consisted of forty non- smoker male workers engaged in cement production in Assiut cement factory situated in Mankabad village. They were randomly chosen from workers exposed to free silica and they were divided according to the duration of exposure into two groups: Those who were exposed for more than 10 years of exposure ($n = 18$) and those who were exposed for less than 10 year of exposure ($n = 22$). Their ages ranged from 24-42 years with mean \pm SD (33 ± 1.71). In addition, a control group of forty normal healthy non – smoker male were selected to match as nearly as

possible the exposed group I age and socioeconomic class. For each subject in both groups the following investigations were done:

Detailed occupational history . - Clinical examination .- Spirometry

Forced vital capacity (FVC). - Forced expiratory volume one (FEV1) -

$\frac{\text{Forced expiratory volume one}}{\text{Forced vital capacity}}$ - Peak expiratory flow rate (PEFR) -

Peak inspiratory flow rate (PIFR) - Determination of TNF – and IL – 6 in plasma of exposed workers by enzyme linked immunosorbant assay (ELISA), and caspase-3 activity in white blood cells of exposed workers by calorimetric method.

The results of current study showed that pulmonary function tests were significantly reduced in exposed workers in comparison with those of controls specially in workers exposed to cement dust for more than 10 years compared to those who were exposed for less than 10 years. A significant increase in both TNF and IL-6 levels were also found in exposed workers and their subgroups when compared to those levels of healthy controls. Also the results showed increased caspase – 3 activity in all exposed workers than that of controls. This increase levels of three parameters was of significant value in workers exposed to cement dust for more than 10 years. Significant correlation were also found between TNF-a, IL-6 and caspase-3 activity in both subgroups of exposed workers.

قسم

العلوم الدينية

طبعة

متخدم: أ.ر.س.م.د.	صلاح عبد المطلب عبد العزيز سحمت
موضوع الرسالة:	تثبيد بعض مشتقات ٤ر٢١ - تريازولو (١٥-أ) بيريميدين الفاعلية البيولوجية المحتملة Synthesis of Some Substituted 1,2,4- Triazolo (1,5-a) Pyrimidines with Potential Biological Activity
الكلية والقسم:	كلية الصيدلة - قسم الكيمياء الصيدلانية الطبية
تاريخ المنح:	٢٩ / ٩ / ٢٠٠٢ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ فرغلي عبد الحميد عمر د/ نوال أبو بكر القوصي د / محمد فؤاد رضوان

ملخص الرسالة

تهدف الدراسة الى تحضير بعض مشتقات ٤،٢،١- تريازولو (١٥-أ) بيريميدين كمضادات للبكتريا لمشابتها للبيورين في تفاعلاته البيولوجية . بينما مركبات ٧،٥- فينيل ثنائي الاشتقاق - ٢ - بيريديل - ٤،٢،١- تريازولو (١٥- أ) بيريميدين حضرت بتفاعل الامينوتريازول مع مشتقات الشالكون في الايثيلين جليكول عند ٢١٠ درجة مئوية لمدة ثلاث ساعات، أو صهرهما عند ٢٦٠ درجة مئوية لمدة نصف ساعة ليعطي المركب النهائي ٧،٥ - فينيل ثنائي الاشتقاق - ٢ - بيريديل - ٤،٢،١- تريازولو (١٥-أ) بيريميدين . أما صهر ٥- أمينو - ١يد - ٣- (٣- بيريديل) - ٤،٢،١- تريازول مع مشتقات الشالكون عند ٢٦٠ درجة مئوية لمدة ثلاثة دقائق فأعطي بعض المركبات الوسيطة الغير متوقعة من ٧،٤- ثنائي هيدرو - ٧،٥- فينيل ثنائي الاشتقاق - ٢ - (٣- بيريديل) - ٤،٢،١- تريازولو (١٥-أ) بيريميدين . وقد تم التأكد من الصيغة البنائية للمركبات التي تم تخليقها بواسطة

استخدام الأشعة تحت الحمراء والرنين النووي المغناطيسي للبروتونات كما تم استخدام طيف الكتلة في بعض المركبات بالإضافة إلى استخدام التحليل الدقيق لعناصر الكربون والنيتروجين والهيدروجين . كما أجري اختبار الفاعلية البيولوجية للمركبات المختلفة كمضادات للجراثيم والفطريات بالمقارنة مع عقار الاموكسيسيللين كمضادات للبكتريا ومركب كلوتريمازول كمضادات للفطريات. بعض المركبات المحضرة تمتلك فاعلية كمضادات للبكتريا لكنها أقل من العقار المقارن ولا توجد فاعلية كمضادات للفطريات .

Summary of Thesis

The present study is concerned with the synthesis of some substituted 1,2,4 triazolo (1,5-a) pyrimidines were prepared by reflux the aminotriazole derivatives with chalcone derivatives in ethylene glycol at 210°C for 3- hours, or by fusion at 260°C for 0.5 hours. Fusion of 5-amino-1H-3-(3-pyridyl)-1,2,4-triazole with chalcone derivatives for 3 minutes, gave the intermediate (4,7- dihydro derivatives). The structures of the newly synthesized compounds were assigned by elemental microanalyses, IR, H-NMR and MS spectral data. The antimicrobial activity of the prepared compounds was achieved by comparison to Amoxycillin as a reference drug for the tested bacteria by using cup method inhibition zone test. The antimicrobial screening of the synthesized compounds showed enhanced selectivity of some of these derivatives against certain strains of the tested bacteria and not showed antifungal activity.



كلية

الطب البيطري

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير


بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢

القسم	درجة الماجستير		
	طالب	طالبة	إجمالي
ميكروبيولوجيا	١	٠٠	١
باثولوجيا الحيوان	٠٠	١	١
تغذية الحيوان	١	٠٠	١
الرقابة الصحية علي اللحوم	٠٠	١	١
الرقابة الصحية علي الألبان	٠٠	١	١
إمراض باطنة وتشخيص معمل	٠٠	٣	٣
إمراض أسماك	٠٠	١	١
إمراض دواجن	١	٢	٣
الإجمالي	٣	٩	١٢

بيان بعدد الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط

من عام ٢٠٠٢



قسم

الميكروبيولوجيا

٢٠٢٢

مقدم الرسالة:	سراج الدين عبد العزيز أحمد سلطان
موضوع الرسالة:	تقييم الطرق المختلفة لتشخيص مرض السل في الماشية - Evaluation of Different Methods for Diagnosis of Tuberculosis in Bovine
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى - قسم الميكروبيولوجيا
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/٣/٣١ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د. / عبد الخالق أحمد الطماوى أ.د. / أماني جمال ثابت أ.د. / محمد على الفقى

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على ٨٢ عينة أخذت من الغدد الليمفاوية المصابة من الحيوانات المذبوحة فى صعيد مصر العليا بعد الفحص الظاهرى للذبحة فى المجزر وقسمت العينات إلى ثلاث مجموعات: - المجموعة الأولى (١) وتضم ٢٧ عينة بها إصابة ظاهرية ندرج من الالتهاب حتى التكلس الكامل للغدة الليمفاوية، المجموعة الثانية (٢) وتضم ٥٠ عينة ليس بها إصابة ظاهرية جمعت من حيوانات متقدمة فى العمر. المجموعة الثالثة (٣) وتضم ٥ عينات من حيوانات سليمة سالبة لاختبار التيوبركلين، قد تم فحص الغدد الليمفاوية المصابة بعد معاملتها للبحث عن ميكروب الدرن بطريقة الفحص المجهرى باستخدام صبغة الزيل نلسن والزرع على مستنبت لوفنشتين جونسن والحامض النووى دى اوكسى ريبو نيكليك أسيد. قد وجد أن من بين ٢٧ عينة بها إصابة ظاهرية كان هناك ٢٢ (٨١,٥%) عينة إيجابية تم تحديد ١٤ (٥١,٨٥%) عينة منها بواسطة كلا من الزرع والفحص المجهرى واختبار البلمرة المتسلسل بينما تم تحديد العينات الباقية ٨ (٢٩,٦٥%) بواسطة اختبار البلمرة

المتسلسل فقط. ووجد من النتائج أن من بين العينات التي لم تظهر عليها إصابة ظاهريّة (٥٠ عينة) كانت ٦ (١٢%) عينات إيجابية بواسطة اختبار البلمرة المتسلسل ، اثنين فقط منهم (٤%) لم تحديدهم بطريقة الزرع بينما كانت كل العينات سالبة بطريقة الفحص المجهرى. أما الحالات الخمس الأخرى المأخوذة من حيوانات سليمة وسالبة لاختبار التيوبيركلين كانت كلها سالبة بالطرق المخالف ذكرها. وكانت درجة حساسية الفحص المجهرى ٤٢,٤% والزرع ٤٨,٤٨% بينما فى اختبار البلمرة المتسلسل كانت ٨٤,٨٤% وكانت خصوصية كل من هذه الطرق ١٠٠% من النتائج السابقة يتضح أن: - اختبار البلمرة المتسلسل هو أكثر الطرق حساسية فى تشخيص المرض حتى إذا وجد الميكروب ميتاً أو بعدد قليل كما يستخدم الاختبار لتشخيص المرض فى الحيوانات السليمة ظاهرياً والتي لا يظهر بها أى إصابات أثناء الفحص الظاهري للذبائح والتي تشكل خطورة على الصحة العامة. يستخدم الاختبار أيضاً للتشخيص السريع والدقيق للمرض فى غضون ثلاثة أيام فى حين أن تشخيصه بواسطة الزرع يستغرق عدة أسابيع.

Summary of Thesis

Eighty-two samples of affected lymph nodes were taken from the animals slaughtered in Upper Egypt after routine post-mortem inspection. The taken samples were divided into three groups:- Group (1): included 27 samples showed visible lesions. Group (2): included 50 samples taken from aged animals and showed non-visible lesions. Group (3): included 5 samples taken from healthy tuberculin negative animals. The forementioned samples were examined after their

treatment by Petroff's method to detect the tubercle bacilli by the microscopic examination of smear stained with Ziehl-Neelsen stain, inoculation on Lowenstein -Jensen medium and polymerase chain reaction (PCR). From the 27 samples, which had visible lesions, 22 (81.5%) samples were positive for tubercle bacilli by PCR method while each of microscopic examination and culture were positive for 14 (51.85%) specimens only. From the 50 samples, which had non-visible lesions, 6 (12%) samples were positive by PCR, two (4%) of them were positive by culture. All samples were negative microscopically. The 5 samples, which were taken from health tuberculin negative animals, were negative by microscopical examination, culture and PCR. The sensitivity of microscopic examination, culture and PCR were 42.4%, 48.48% and 84.84%, respectively. The specificity of all methods was 100%. The previous results declared that PCR is the most sensitive method for diagnosis of tuberculosis from bovine samples even organism present viable in low number or non-viable or fragments of its DNA. PCR could detect the disease in apparently healthy animals, which show non-visible lesions during routine post-mortem inspection, which constitute a public health hazard. The PCR also, used for rapid and accurate diagnosis of tuberculosis within days which take long time (several weeks) by traditional culture method.

قسم

بالتوليد الحيوان

مقدم الرسالة:	فاطمة على محمود أحمد
موضوع الرسالة:	دراسة لبعض الضغوط البيئية المؤثر على سلوكيات الماشية الحلوب Studies of Some Environmental Stressors Affecting the Behavioural Patterns of Dairy Cattle
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى - قسم باثولوجيا الحيوان
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / ريم محمود دسوقي أ.د. / فاروق أمين أحمد

ملخص الرسالة

تم فى هذه الدراسة معرفة مدى تأثير كلا من معامل الحرارة ومستوى قوة الصوت (الضوضاء) وطريقة الحليب على سلوكيات وإنتاج الماشية الحلوب فى ثلاث مزارع مختلفة وهى: - (أ) مزرعة إنتاج اللبن ببنى مر - محافظة أسيوط - والتي تحتوى على عدد ٢٠٣ من الأبقار الفريزيان مسكنة بنظام المزارع المفتوحة (ب) مزرعة كلية الزراعة - جامعة أسيوط - والتي تحتوى على عدد ٣٩٧ من الأبقار الفريزيان مسكنة بنظام المزارع المفتوحة. (ج) قطع إنتاج اللبن والموجود فى مستشفى كلية الطب البيطرى - جامعة أسيوط - والمكون من عدد ٧ أبقار فريزيان وعدد ١ بقرة بلدى. وأوضحت نتائج الدراسة ما يلى: - أولاً: تأثير درجة الحرارة على سلوكيات وإنتاج اللبن فى الماشية الحلوب: أعلى وأقل درجة حرارة تم رصدها داخل المزارع التى تم فحصها خلال مدة البحث كانت داخل المزارع المفتوحة ، بينما كانت الرطوبة النسبية أعلى داخل المزارع المغلقة طوال العام وخاصة فى فصل الشتاء. بالنسبة لعلامات الصحة للحيوانات التى تم فحصها كانت غير مستقرة للحيوانات

الموجودة في هذه المزارع خاصة في الموسم الحار ، بالنسبة لإنتاج اللبن لوحظ نقص تدريجي في إنتاج اللبن أثناء موسم الصيف في الثلاث مزارع ، عند تعرض الماشية الحلوب لدرجة حرارة عالية في فصل الصيف حدث نقص في كمية البروتين الكلى في السيرم والجلوبيولين وهو نقص عالى المعنوية بينما نسبة الألبومين ونسبة الألبومين إلى الجلوبيولين كانت هناك زيادة عالية المعنوية. أما بالنسبة لمستوى الأدرينالين والكورتيزون والبرولاكتين فقد حدث زيادة في مستوى الهرمونات في الدم. ثانياً: تأثير مستوى قوة الصوت. (الضوضاء) على سلوكيات وإنتاج اللبن للماشية الحلوب ، عند تعرض الماشية الحلوب لمستويات مختلفة من شدة الصوت حدث نقص في إنتاج اللبن وكذلك كمية البروتين الكلى ونسبة الألبومين إلى الجلوبيولين في السيرم وذلك خلال اليوم الأول من التعرض للصوت وأيضاً نقص عالى المعنوية في مستوى الكورتيزون في السيرم خلال اليوم الأول بينما حدثت زيادة عالية المعنوية في اليوم السابع وبالنسبة لمستوى هرمون الأدرينالين فقد حدثت زيادة عالية المعنوية خلال اليوم الأول في الثلاث مزارع. ثالثاً: عند دراسة تأثير طريقة الحلاب على إنتاج اللبن وبعض مكونات السيرم في الحيوان لوحظ أن إنتاج اللبن في مزرعة بنى مر والتي تحلب آليا أعلى من حيث إنتاج اللبن عن كل من مزرعة كلية الزراعة ومستشفى كلية الطب البيطرى والمثلان تحلبان يدوياً ولكن عند إجراء تجربة على عشرة حيوانات من مزرعة بنى مر والتي اعتادت على الحلب الآلى وتم إجراء حلب يدوى لها وجد أن إنتاج اللبن أثناء الحلب اليدوى أعلى منه أثناء الحلب الآلى وقد سجل هرمون البرولاكتين زيادة عالية المعنوية خلال الحلب اليدوى في الصباح والمساء بينما سجل هرمون الكورتيزون زيادة عالية المعنوية بعد ١٠ دقائق من بداية الحلب اليدوى أما بالنسبة لهرمون الأدرينالين فقد سجل زيادة معنوية أثناء الحلب الآلى في الصباح والمساء ،

Summary of Thesis

The present work was carried out on three different farms: a) Dairy farm of Beni Morr, contained 203 Friesian dairy cows & 30 calves, cattle were housed by milk-house system. b) Farm of Agriculture Collage. Assuit University contained 502 Friesian head housed by milk – house system. c) Dairy herd at the clinic of Veterinary Medicine, Assuit University contained 22 animals as: 7 dairy Friesian 10 Friesian calves, 1 Baladi cow and 4 bulls housed by cow-house system. I- The effects of heat stress on behavioural patterns and productive responses of dairy cattle. The maximum and minimum environmental temperature during the time of work were recorded inside milk-house while, the relative humidity measured inside the cow house is considered higher, specially during winter season. The incidence of play behaviour showed higher percentages during summer season than winter season, at the three examined farms. There were gradual decrease in milk production during hot season at the same examined farms. There were a highly significant decrease in serum total proteins and serum globulin levels during summer season but the serum albumin levels and A/G ratio were highly significantly increased during summer season. at the three examined farms. There are a significant increase in serum adrenaline. cortisone and prolactin levels of examined animals during summer season. II- sound pressure levels or noise: The three examined farms

were exposed to five sound pressure levels for successive "seven" days. The results revealed the following: There was a decrease in milk yield and recumbancy. At the 1st day of sound exposure, there was a significant reduction of serum albumin, globulin levels, Serum A/G ratio, and a highly significant decrease of serum cortisone. A highly significant increase of heart beats, significant increase of serum prolactin levels at the three farms. III- Effect of milking methods (hand and machinery milking) on milk production, and hormonal levels: There were a significant increase in milk production at machinery milked farm than hand milked farm. Experiment was carried out at Beni morr farm using 10 dairy cattle, there were a significant increase in milk yield at evening hand milking than machinery milking. Highly significant concentration of serum prolactin levels during hand milking, but the serum adrenaline levels were significantly decreased in cattles exposed to hand milking. However, there were no significant differences in cortisone levels between hand and machinery milking.

قسم

تخفيف الحوائج

مقدم الرسالة:	شريف محمد عبد الرحيم
موضوع الرسالة:	تأثير مستويات الطاقة والبروتين على التمثيل الغذائي لبعض العناصر المعدنية وتركيز فيتامين ج في الماعز Effect of Energy and Protein Levels on the Utilization of Some Minerals and Concentration of Vitamin C in the Blood of Growing Kids
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطري - قسم تغذية الحيوان
تاريخ المسم:	٢٠٠٢/٩/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	١٠٠١ / نبيله عبد الهادي جازيه ١٠٠٢ / عبد الستار محمد عبد اللاه ١٠٠٣ / عبد الباسط نصر سيد

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة لمعرفة أثر تغذية مستويات مختلفة من الطاقة والبروتين على التمثيل الغذائي لكل من الكالسيوم والفوسفور والمغنسيوم والزنك والنحاس وكذلك مستوى فيتامين ج في مصل الدم في ذكور الماعز النامية وذلك من خلال عدد ٤ تجارب تضمنت ١٢ محاولة على عدد ٩ من ذكور الماعز المخبرية تم تقسيم الحيوانات إلى ثلاث مجموعات (أ ، ب ، ج) بكل منها ثلاث حيوانات. غذيت المجموعة الأولى (أ) في كل التجارب على العليقة الضابطة بينما غذيت المجموعتين الأخريين (ب ، ج) على العلائق التجريبية التي تحتوي على بروتين أو طاقة أو كليهما مرتفع أو منخفض بمقدار يماثل ١٥% أكثر أو أقل عن الموصى به وقد خلصت الدراسة إلى أنه عند تغذية الحيوانات إلى على علائق مرتفعة الطاقة بغض النظر عن مستوى البروتين أدى إلى زيادة معدل إمتصاص كل من الكالسيوم والفوسفور والزنك والنحاس ، معدل تخزين

الكالسيوم ، مستوى الفوسفور وكذلك فيتامين ج في مصل الدم في حين أدت إلى انخفاض مستوى النحاس والزنك في مصل الدم بينما لوحظ عند تغذية الحيوانات على علائق منخفضة الطاقة والبروتين انخفاض معدل إمتصاص وتخزين كل من الكالسيوم والفوسفور والزنك والنحاس وكذلك مستوى الفوسفور والنحاس وفيتامين ج في مصل الدم.

Summary of Thesis

The effect of different levels of energy and protein on the utilization of some macro elements (Ca and P), microelements (Zn and Cu) and serum vitamin C were evaluated in four metabolic experiments 3 trails each, A total number of nine growing castrated male balady kids were randomly divided into 3 groups. 3 kids per each (A, B & C). Group A was fed on the control ration according to (NRC, 1981) for goat all over the experiments and used as a control, while the other two groups (B&C) were fed on the experimental rations which were differ in their DE&CP ranging from extremely low to more than the requirements by about 15%. The obtained results showed that high energy rations irrespective of the protein level increase the apparent absorption and retention of Ca & P, serum P concentrations and serum C level at the same time decrease serum Ca level. However, feeding kids on the low energy low protein ration decreases in the apparent absorption of Ca, P, Zn and Cu and serum P, Cu and vitamin C.

قسم

الرقابة الصحية

على اللحوم

مقدم الرسالة:	غلاف عبد الباسط محمود
موضوع الرسالة:	'مستويات أشعة جاما فى بعض منتجات اللحوم المسوقة فى صعيد مصر' Levels of Gamma Rays in Some Meat Products Marketed in Upper Egypt
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى - قسم الرقابة الصحية على اللحوم
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/٣/٣ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د. / شوكت محمد فتحى أ.د. / محمد نور الدين إسماعيل د. / احمد محمد نصار

ملخص الرسالة

تم جمع ١٠٥ عينة من منتجات اللحوم المحلية والمستوردة من عدة محلات مختلفة بمدينة الأقصر وتم اختبار جميع العينات بالكشف عن أشعة جاما باستخدام جهاز جيجر ميللر وعداد أشعة جاما (جهاز معدلات مدرج نوع ٦-٩٠) وكانت الفروق بين أقصى مستوى لأشعة جاما لعينات منتجات اللحوم المحلية مقارنة بعينة التضيييط للخلفية الإشعاعية (الهواء) تتراوح ما بين الصفرة و ١٥١ بيكريل / كجم ، بينما كانت الفروق للعينات المستوردة تتراوح ما بين ٥٠, ١٥٢ - ٥٠, ٢٩٩ بيكريل / كجم وتبين من النتائج السابقة أن مستوى أشعة جاما فى العينات المستوردة أعلى من العينات المحلية ولكن دون الحدود المسموح بها عالميا ولهذا فإنه يجب على أجهزة الرقابة البيطرية والصحية والمسئولة عن المنتجات الغذائية أن تولى اهتماما كبيرا بتسهيل عمليات الكشف على الإشعاع فى اللحوم ومنتجاتها وذلك لحماية المواطنين من خطر المواد المشعة.

Summary of Thesis

A total of 105 locally produced and imported meat products were collected from different supermarkets in Upper Egypt. All samples were prepared and examined for detection and determination the gamma radiation by using Geiger Muller and gamma counter (scaler ratemeter type 6-9). The differences between the highest levels of gamma for the locally produced meat products in comparison to background (air) were between 0 and 15/Bq/kg, while in imported meat products were between 152.50 and 299.50 Bq/kg. The examined imported canned meat products appeared to be contaminated by gamma rays particularly canned luncheon.

قسم

الرقابة الصحية

على الألبان

مقدم الرسالة:	كريمة جلال عبد الحميد
موضوع الرسالة:	"دراسات عن الحالة الصحية اللبن الخام في محافظة قنا" Studies on the Sanitary Condition of Raw Milk in Qena Governorate
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى - قسم الرقابة الصحية على الألبان
تاريخ المصم:	٢٨/٧/٢٠٠٢م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / أحمد عبد الحميد أحمد أ.د. / فاروق أمين أحمد أ.د. / ايناس البرنس محمد

ملخص الرسالة

اشتملت الدراسة على فحص ١٦٠ عينة من اللبن جمعت عشوائيا من كل من مزارع الألبان (لبن بقرى) ، بيوت الفلاحين ، محلات الألبان ، الباعة الجائلين (لبن جاموسى) بواقع ٤٠ عينة من كل نوع وبمقارنة النتائج بالاشتراطات الواجب توافرها فى اللبن الخام المتداول طبقا لقانون الألبان ومنتجاتها يتبين أن عينات بيوت الفلاحين ومحلات الألبان والباعة الجائلين (لبن جاموسى) غير مطابقة للاشتراطات من حيث نسبة الدهن والمواد الصلبة الكلية فى حين أن عينات المزارع (لبن بقرى) كانت مطابقة لهذه الاشتراطات. أما عن الكشف عن المواد الحافظة والمواد المثبطة فقد وجد من نتائج اختبار Wynter Blyth أن ٩ (٢٢,٥%) من عينات بيوت الفلاحين ، ١٣ (٣٢,٥%) من عينات محلات الألبان ، ١٢ (٣٠%) من عينات الباعة الجائلين كانت إيجابية للاختبار أما عينات المزارع فقد كانت جميعها سلبية. أما عن الكشف عن وجود الفورمالين وحمض الساليسيك وحمض البوريك وفوق أكسيد الهيدروجين فقد ثبت من الفحص سلبية العينات لاختبارات الكشف عن وجود الفورمالين ، حمض الساليسيك ، أما حمض البوريك فقد كانت ٢ (٥%) من عينات بيوت الفلاحين فقط إيجابية أما عينات

المزارع ومحلات الألبان والباعة الجائلين فقد كانت جميعها سلبية. وقد وجد من نتائج اختبار فوق أكسيد الهيدروجين أن ٤ (١٠%) من عينات بيوت الفلاحين ، ١ (٢,٥%) فقط من عينات الباعة الجائلين كانت إيجابية للاختبار أما عينات المزارع ومحلات الألبان فقد كانت جميعها سلبية. أما عن الاختبارات الميكروبيولوجية فقد تبين زيادة متوسط العدد الكلى للميكروبات في المليلتر الواحد من العينات التي تم فحصها. ويعزو الباحث زيادة عدد الميكروبات الكلية والميكروبات المختلفة خاصة في عينات محلات الألبان والباعة الجائلين إلى عدم تطبيق القواعد الصحية السليمة في إنتاجها وتداولها.

Summary of Thesis

A total of 160 random samples of milk were collected from Qena Governorate. The results of chemical analysis of this study proved that there were both types of adulteration, partial skimming and addition of water in samples of farmers houses, shop keepers and street vendors milk samples. Regarding to samples collected from dairy farms and shop keepers one may safely conclude that fat% and TS% comply with legal requirement, On the other hand, the examined samples show wide variation in water %, solid non fat % and specific gravity. Concerning the heat treatment of the examined samples, it is clear that all dairy farms milk samples were in raw state, The dairy farms and shop keepers milk samples were negative for all types of preservatives, while all of the examined milk samples show variation in Wynther Blyth test for inhibitory substances. The bacteriological examination show that the sanitary conditions of raw farmers, houses, shop keepers and street vendors milk samples are not up to standard.

قسم

امراض باطنية

وتشخيص محلي

مقدم الرسالة:	فاطمة الزهراء محمد مصطفى عبد الرحيم
موضوع الرسالة:	نصورة الدم واختبار وظائف الكبد والكلى للأبقار الموجودة بأماكن محتملة التلوث بالرصاص Blood Picture, Liver and Kidney Function Tests of Cows Grazing at Possible Lead Contaminated Areas
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطري - قسم أمراض باطنية وتشخيص معمل
تاريخ المزمع:	٢٨/٧/٢٠٠٢ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د. / حمدي عبد الحميد إبراهيم أ.د. / محمد نجيب عبد السلام أ.د. / أبو المجد محمود محمد

ملخص الرسالة

احتوت هذه الدراسة على عدد ٦٠ حيوان من الأبقار والعجول الصغيرة تراوحت أعمارهم بين شهرين إلى أربع سنوات من الجنسين. ٥٠ بقرة وعجل ترعى في مناطق تبعد من ٢:١ كم من مصنع سكر دشنا محافظة قنا حيث كان هناك احتمال تلوث هذه المنطقة بالرصاص كما تم فحص عدد عشرة أبقار كانت ترعى في مناطق تبعد ٣٠ كم من هذا المصنع ظهرت عليها علامات الصحة الإكلينيكية كمجموعة ضابطة، تم إجراء الفحص الإكلينيكي لجميع الحيوانات تحت الدراسة وذلك إما في الحقل أو في المجزر قبل الذبح، تم أخذ عينات مياه مباشرة من ماسورة الصرف الصناعي للمصنع ومن مياه النيل في المنطقة التي يصب فيها الصرف الصناعي وكذلك عينات مياه من مناطق تبعد ٣٠ كم جنوباً من المصنع تم أخذ عينات دم وشعر وبراز ومن نسيج الكبد والكلى من الأبقار المعرضة للتلوث بالرصاص وكذلك من المجموعة الضابطة لتعيين مستوى

الرصاص فى هذه العينات ، تم أخذ عينات دم مضاف إليها مانع تجلط لعمل صورة دم كاملة . تم جمع عينات من مصل الدم من مجموعة معرضة للتلوث وكذلك من المجموعة الضابطة لتقييم وظائف الكبد والكلى . أثبت تحليل المياه التى أخذت من مياه الصرف الصناعى لمصنع السكر وجود زيادة نسبية فى مستوى الرصاص عن مستوى الكاديوم والنيكل . من نتائج الدراسة أمكن أن الأبقار التى ترعى فى مناطق تبعد ٢:١ كم من مصنع سكر دشنا تتعرض لمستوى تحت الملام بالرصاص الناتج عن الصرف الصناعى لهذا المصنع وقد اقتصر تأثير هذا المستوى من التلوث إلى أحداث حالة من فقد الشهية أدت بدورها إلى ظهور الإيمياء وانخفاض مستوى السكر فى الدم وانخفاض انتاجية الحيوانات المعرضة للتلوث يجب أن يعطى اهتمام خاص لأمهات الأبقار التى يحتفظ بها لأعمار كبيرة لتلافى التسمم المزمن بالرصاص . القيم التى تم الحصول عليها من تعيين مستوى الرصاص فى الدم والبراز والشعر ونسيج الكبد والكلى غير كافية لتحديد مدى مستوى التلوث بالرصاص ومن الضرورى أخذ عينات من العظام الطويلة والضلوع لتحديد مستوى التعرض للتلوث بشكل ضئيل ولمدة طويلة.

Summary of Thesis

The present study constituted sixty cattle, two months to four years old of both sexes. This study was take place between December 2000 to December 2001 and it was performed on 50 animals which are kept in area near (1-2 Kilometer) northerly to sugarcane factory found in Deshna city belonging to Qena Governorate . These animals are sub-divided into three separate groups (Group I, II & III) as shown in table 8 Clinically healthy 10 animals (group IV) which are kept

away (30 Kilometers) south to the same factory, were used as control group. All animals under investigation were examined clinically in the field and in the abattoir before slaughtering. Estimation of lead levels in whole blood, feces, hair, liver tissue and kidney tissue in both lead-exposed cattle group (I) and non-lead exposed, (30 kilometer away from the sugarcane factory) clinically healthy group (IV) revealed higher lead content in whole blood samples than in fecal and hair samples, and higher lead content in kidney tissue than liver tissue. Moreover there was significant ($p < 0.05$) difference between lead content in both examined cattle group in case of whole blood samples. While there was no significant difference in case of fecal, hair, liver tissue and kidney tissue samples. Estimation of lead content in whole blood, fecal and hair samples collected from cows (group II) their calves (group III) indicated the presence of lead in calves's sample while not exposed to lead contamination, but borne from lead-exposed mothers. There was highly significant ($p < 0.01$) difference in lead content between the two examined groups. Haematological study of blood samples of lead-exposed cattle (group I) and clinically healthy one group (IV) showed normocytic, normochronic anemia in group I, where there was high significant ($p < 0.01$) lower total erythrocytic count, significant ($p < 0.05$) lower PCV% and non significant difference Haemoglobin content and concentration in group I if compared with those in group IV. There was no significant change in total leucocytic count between the two groups. Biochemical analysis

of serum proteins of lead-exposed cattle (group I) and clinically healthy one (group IV) refers to non-significant change between the two group in total serum proteins. However group I showed significant ($P<0.05$) lower a albumin than group IV. Estimation of liver serum enzyme levels (ALT,AST and AP) of lead exposed cattle (group I) and clinically healthy one (group IV) showed no significant difference between the two group. Biochemical serum analysis for the levels of glucose, urea and creatinine of lead-exposed cattle (group I) and clinically healthy one (group IV) significant ($P<0.05$); lower glucose level in group I than in group IV. There were no significant differences in the levels of urea and creatinine between the two groups. The studied are around the sugarcane factory is exposed to lead contamination through its industrial drainage. This was appeared in the higher lead content in the samples of cattle kept 1-3 kilometer than that in cattle kept away (30 kilometers) south from the factory.

مقدم الرسالة:	غاده عبد العظيم محمد
موضوع الرسالة:	دراسات على تشخيص الدودة الكبدية فى الحالات الإكلينيكية وتحت الإكلينيكية فى الأغنام فى محافظة أسيوط Studies on Diagnosis of Clinical and Subclinical Fascioliasis in Sheep in Assist Governorate
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى - قسم أمراض باطنة وتشخيص معلى
تاريخ المقدم:	٢٠٠٢/٩/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د. / سيد عبد الرحيم العمروسى د. / عرفات صادق سيد د. / أحمد مصطفى سيد

ملخص الرسالة

تعد الإصابة بالديدان الكبدية واحدة من الأمراض واسعة الإنتشار فى العالم وهى تصيب بكثرة الحيوانات المجترة وخاصة الماشية والأغنام وأكدت الدراسات العلمية الحديثة إصابة الإنسان بهذه الديدان وأصبحت تمثل خطرا كبيرا على صحته لهذا أقبل الباحثين فى مجال علم الحيوان وعلم الطفيليات البشرية والبيطرية على إجراء المزيد من الأبحاث على هذا الطفيل . يمثل التشخيص المعلى لهذه الديدان صعوبة خاصة فى بداية الإصابة وحتى المزمدة . يعتمد التشخيص المعلى على الكشف عن البويضات فى البراز ونظرا لأن هذا الطفيل يتسبب فى إحداث تغيرات دموية وإكلينيكية ضارة تظهر على الحيوان وعلى إنتاجيته وتؤدى إلى فقد إقتصادى كبير فى حالة تأخر إكتشاف المرض لذلك إستهدف البحث الحالى ما يلى: ١- دراسة الأعراض الإكلينيكية والتغيرات البيوكيميائية فى الأغنام المصابة بالفاشيولا ، ٢- إلقاء الضوء على الطرق الحديثة فى التشخيص والتشخيص المبكر للفاشيولا فى الأغنام بإستخدام أختبار الأليز

٣- المقارنة بين نتائج الفحص الباراسيتولوجى لبراز الحيوانات بنتائج الإختبارات السيرولوجية (إختبار الأليزا) وقد تكشف لنا من خلال فحص البراز وجود ببويضات الفاشيولا فى ٢٢ حيوان من إجمالى الحيوانات بينما ظهرت ببويضات للطفيليات الأخرى فى ٣٥ حيوان. أظهر الفحص السيرولوجى لسيرم الدم إصابة عدد ٧٤ حيوان (كانت موجبة لأختبار الإليزا) ووصلت نسبة درجة حساسية الإختبار إلى ٩٠,٩١% و نسبة درجة تخصص الإختبار إلى ٩٤,٨٧% مما يوضح أهمية هذا الإختبار فى إكتشاف الحالات المصابة مبكرا ولا تظهر عليها أعراض إكلينيكية واضحة مع صعوبة وجود ببويضات الطفيل فى البراز وعلمنا بأن هذا الإختبار يعتبر مكلفا شيئا ما ولكن مع التقنية ممكن إستخدامه فى المستقبل نظرا لخطورة هذا المرض على الإنسان والحيوان.

Summary of Thesis

Fascioliasis is a disease caused by liver flukes and is distributed throughout the world. Many Egyptian authors recorded the disease in many part of Egypt and studied the life cycle of the parasite along the Nile valley. The importance of the disease lies on its economic importance beside the fact that it has a zoonotic nature. Diagnosis depends largely on the detection of fasciola eggs in the feces of infested animals, however, in the recent records serological test were introduced as an early detection of the parasite in the liver of affected animals. The present work aimed to study the following items. Studying the clinical signs and assoicating biochemical changes in sheep infested with fasciola spp. Throw a light on the recent methods

of diagnosis and early detection of fascioliasis in sheep with the use of ELISA test . Comparing between results of ELISA test and that of parasitological examination of feces for the detection of fasciola egg to determine the accuracy of ELISA. In this study a total number of 145 Balady sheep of both sexes 3-7 years constitute the investigated number and location of the examined sheep were recorded in their respective villages. Breeding system and feed offered were also recorded. The character of feces: points out that positive animals exhibited diarrhea (different form, soft to soft mucoid were seen in other animals with internal parasite or those with other disease (negative to both egg examination or ELISA). The other parasites detected during examination group III included trichostrongyle, Neoscaris, trichuris, Nematodirus, coccidian. Group IV examination showed Nematotodrius, coccidian, paramphistomum spp, and others. Results pointed out that parasitological diagnosis of fascioliasis and detection of the respective specific eggs in feces is generally inadequate because the incubation period presenting clinical findings is from 2-3 months yet the flukes require a period of at least 3- 4 month to attain sexual maturity. This proves that infested animals had clinical signs long before eggs could be found in feces. The results here proved that serological tests (ELISA) gave a promise indication, 74 positive case. When compares with 22 animals showing fasciola eggs in examined feces. One can safely judge the probability by which the infested animal is identified by ELISA test as positive in

this work was 90.91% sensitivity of ELISA. False positive cases reached 9.1% and false negative cases among the examined cases reached 5.3% ELISA results also were indicative as it revealed negative result in sheep infested with helminth parasite other than fasciola and also with these suffering illhealth not associated with the parasitic infestation (group V). Biochemical investigations. Reduction in blood serum levels of albumin in those infested with fasciola and also in those sheep with other internal parasite.

مقدم الرسالة:	مها حلمى سيد
موضوع الرسالة:	دراسة مقارنة على صورة الدم باستخدام طريقتى العد اليدوى والإجهزة الآلية فى الأبقار والأغنام والماعز Comparative Haematological Studies on Blood Picture Using Manual and Full Automated Methods in Cattle, Sheep and Goats
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى - قسم أمراض باطنية وتشخيص معلى
تاريخ المنع:	٢٧/١٠/٢٠٠٢م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / على السباعى حسين أ.د. / على حسن صديق

ملخص الرسالة

يحتل التشخيص المعلى الإكلينيكى مكان الصدارة فى مجال علم التشخيص البيطرى ومع التقدم المضطرد فى طرق التشخيص المعلى فإن تحاليل الدم البيطرية شهدت تقدما ملحوظا وأدخلت فى مجال تحليل صورة الدم الأجهزة الآلية. وأصبح لتواجد كل من طرق العد اليدوى لصورة الدم الواسع الإنتشار والطرق الآلية مسار جدلا بين مدى دقة نتائج كل منهما وحيث أن قسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى جامعة أسيوط قد استخدم منذ أكثر من ٢٠ عاما ثلاثة أجيال مختلفة من أجهزة عد الدم النصف الآلية وأخيرا الآلية المتقدمة ولكى نقف على مدى الفارق بين كل من الطرق اليدوية والطرق الآلية كانت خطة البحث لهذه الدراسة والتي استهدفت مقارنة صورة الدم باستخدام كل من الطرق اليدوية وطرق العد الآلى فى بعض الحيوانات. اشتملت هذه الدراسة على اجمالى ١٤٥ راسا من الأبقار، الماعز، الأغنام وقسمت الحيوانات إلى ثلاثة مجموعات ويمكن إيجاز نتائج هذه الدراسة فيما يلى: ١- إن استخدام جهاز عد

الدم الآلى Abbott cell dyne 1700 يعتبر وسيلة متقدمة فى مجال عد الدم الآلى
ويسهل عملية العد. ٢- أنه باستخدام كل من النظام اليدوى والآلى لعمل صورة الدم
فكل من النظامين يصاحبه نسبة خطأ تصل إلى ٣٠% فى العد اليدوى و ١٠% فى العد
الآلى .

Summary of Thesis

Veterinary haematology is indisperable to asses the bolld status of domestic, pet and labonatory animals. Adequac performance, accuracy and precision are expected. Automated cell counters provide competitive advantage by increased sample through put and reduced processing costs, on the other hand, manual techniques are generally low cost with regard to equipment and reagent. The manual techniques remain the basis of hameatological practice. A total number of 145 animals including cattle, goats and sheep were used in this study all healthy individuals were examined clinical and proved to be apparently healthy while the diseased cow, goats, sheep were examined clinically. Blood samples were collected. Only significant difference between manual and automated techniques has been observed between the means values of healthy, diseased sheep.

قسم

احراض اسكان

مقدم الرسالة:	إيتسام سيد حسن عبد الله
موضوع الرسالة:	دراسات عن مرض الإستریتوکوکوز فى أسماك البلطى فى صعيد مصر
	Studies on Streptococcosis in Tilapia <i>Oreochromis Niloticus</i> in Upper Egypt
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى - قسم أمراض الأسماك
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٩/٢٩م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ. د. / طه أحمد أحمد العلوى أ. د. / شعبان محمد أحمد أ. د. / عرفات صادق سيد

ملخص الرسالة

تناولت الرسالة دراسة معدل وجود وانتشار ميكروب الإستریتوکوکس فى أسماك البلطى النيلى فى صعيد مصر حيث تم عزل ميكروب الإستریتوکوکس فيشيم من أسماك البلطى النيلى ومن عينات المياه حيث أوضحت النتائج التشابه الكبير بين ميكروب الإستریتوکوکس فيشيم المعزول من المياه والمعزول من أسماك البلطى النيلى وقد أثبتت نتائج العزل من الأعضاء الداخلية للأسماك أن الكلية تمثل أفضل عضو لعزل هذا الميكروب. من خلال البحث وجد أن معدل إنتشار المرض أعلى فى فصل الصيف (١١,٤%) منه فى فصل الشتاء (٨,٤%) على مدار العام. ومن خلال دراسة الجرعة المميتة المتوسطة (LD_{50}) لميكروب الإستریتوکوکس فيشيم فى أسماك البلطى وجد أنها 3×10^4 لمدة ٩٦ ساعة و 6×10^4 لمدة ١٦٨ ساعة. بمقارنة أغلب أنواع الإجهاد المستخدمة فى الأبحاث وجد أن الإجهاد بواسطة النقل أو الإزدحام مع حقن الميكروب فى التجويف البريتونى يؤدى لنفوق الأسماك كلها فى خلال ٢١٦ ساعة.

عندما غمست الأسماك المجهدة بالإزدحام فى محلول بكتيرى يحتوى على ١٠^٨ خلية/مل وجد أن النفوق يحدث فقط بعد عمل تشريط فى جلد هذه الأسماك محدثا نفوقا قدرة ٣٢,٥% من الأسماك بعد ٣ أسابيع من الإجهاد والتشريط. عند عمل مزرعة لميكروب الإستربتوكوكس فيشيم وجد أن الميكروب شديد الحساسية للأوكسيتتراسيكلين و الدوكسيسيكلين وإنه متوسط الحساسية للتتراسيكلين والفانكوميسين وأنه مقاوم لبقاء المضادات الحيوية المستخدمة وقد سجلت النتائج انخفاض ملحوظا فى مستوى الأجسام المناعية ليصل إلى ١٦ بعد ٣ أشهر من التحصين وقد سجلت نتائج إختبار التحدى فى أسماك البلطى نسبة نفوق مقدارها ١٠% فى الأسماك المحصنة سابقا والمحقونة بنفس الميكروب بينما كانت نسبة النفوق ٥٠% فى الأسماك المستخدمة كضابط للتجربة.

Summary of Thesis

Five hundred Nile tilapia, *Oreochromis niloticus*, were collected from the River Nile and EL-Ibrahemia canal at different Localities in Uppcr Egypt. Bacteriological examination of fish revealed that 50 isolates of *Streptococcus faecium* were recovered from 50 infected fish. It was found that the kidney represents the best organs for the isolation. Also, *Streptococcus faecium* was isolated from the collected water samples. The prevalence rate of naturally infected Nile tilapia was 11.6% in the summer and 8.4% in the winter, The calculated *Streptococcus faecium* LD₅₀ for 96 hours was 3×10^4 CFU/ml. and for 168 hour was 6×10^2 CFU/ml. It was found that injection of *Streptococcus faecium* in fish stressed by transportation or overcrowdness produced 100% mortalities within 216 hours. When

the overcrowded fish were immersed in bacterial solution containing 1×10^8 CFU/ml, mortalities occurred only when the skin was injured producing a cumulative mortality of 32.5% after 3 weeks post-immersion. Antibiotic sensitivity tests showed that the isolated *Streptococcus faecium* was highly sensitive to oxytetracycline, doxycycline; moderately sensitive to tetracycline, vancomycin, and resistant to other tested antibiotics. It was found that the antibodies against injected *Streptococcus faecium* bacterin could be detected for 3 months post-injection. The challenge test revealed that the cumulative mortalities in vaccinated and challenged fish was 10% compared with 50% in challenged non-vaccinated (control).

قسم

اصراض دواجن

أمل أحمد محمود بخيت	مقدم الرسالة:
دراسات مبدئية عن إصابة الأنف والقنصة الهوائية ببكتريا الأورنيث في الدواجن بصعيد مصر Studies on Bacterial Agents Associated with Ohronic Eases of in Feotioun Corgza in Ohiokns	موضوع الرسالة:
كلية الطب البيطرى - قسم أمراض الدواجن	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١٢/٢٩ م «ماجستير»	تاريخ المقدم:
أ.د. / مصطفى عبد المطلب شحاته أ.د. / طلبة يونس عبد المطلب د/ سهير زين العابدين حسين	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تناولت الرسالة فحص ٦٤٦ عينة من الدجاج والبط الرومى من محافظات الصعيد المختلفة وقد أمكن عزل ١٩ عينة من دجاج اللحم والبياض بنسبة ٨,٥% و ١١ عينة من البط بنسبة ٣,٩% و ٥ عينات من الرومى بنسبة ٥,٢% وقد تم عزل الميكروب من الرنتين والقنصة الهوائية والأكياس الهوائية ومن خلال هذه الدراسة تم عزل ميكروب الأورنيثو من البط لأول مرة في جمهورية مصر العربية. تبين أن أفضل المستنبطات لنمو هذا الميكروب هو بيئة أجار الدم وخصوصا مع دم الأغنام تحت ظروف غير هوائية. تم تصنيف العترات المعزولة سيرولوجيا بطريقة الترسيب الاجارى وأوضحت نتيجة الفحص أن العترات المعزولة جميعها تنتمي إلى نوع A أظهرت نتائج اختبار الحساسية أن نسبة الحساسية للاموكسيسيلن والامبيسلين والكلورامفيكول (١٠٠%) وعلى الجانب الآخر أتضح أن الجنتاميسين ، موكبات السافا ، ريفاميسين مقاومة لتلك الأدوية. تبين من إجراء إختبار الضراوة للعترات المعزولة في دجاج

التسمين والبط البلدى بميكروب الأورنيثوبلاكتريم رينوتركياى بمفرده عن طريق الرش ظهرت أعراض تنفسية خفيفة مع وجود بعض الإلتهابات بالقصبة الهوائية والرئتين مع سمك بسيط فى الأكياس الهوائية بينما كانت النتائج أشد ضراوة عندما سيق إعطاء الميكروب جرعة من فيروس النيوكاسل بالنسبة للدجاج ولم يحدث تفوق نتيجة لهذا الميكروب. أظهرت نتائج الفحص الباثولوجى للعينات المأخوذة من القصبة الهوائية ، الرئتين والأكياس الهوائية للطيور التى تم إحداث العدوى الصناعية لها بميكروب الأورنيثوبلاكتريم رينوتركياى وفيروس النيوكاسل إلهاب تنكزى بالقصبة الهوائية ، إلهاب شديد فى الأكياس الهوائية. نستخلص من نتائج هذا البحث أن نسبة عزل ميكروب الأورنيثوبلاكتريم رينوتركياى من الدجاج والبط والزوى فى محافظات الصعيد كانت ٥,٨ % ، ٩,٣ % وأيضاً ٢,٥ % بالتتابع من الطيور الحية والمذبوحة. الصفات التشريحية فى الطيور المصابة كانت فى صورة التهابات القصبة الهوائية والرئتين والأكياس الهوائية كذلك وجود سائل يشبه اللبن الزبادى فى التجويف البطن.

Summary of Thesis

Thirty five isolates of ORT could be isolated from 646 samples from chickens, ducks and turkeys from Upper Egypt Governorates. We could isolate 19 isolates from broiler and layer chickens, 11 isolates from ducks and 5 isolates from turkeys with percentage of 5.8, 9.3 and 2.5% respectively and this isolation occur from trachea, lung and air sacs. Bacteriological and biochemical identification of 35 isolates reveal typical ORT characters. Serotyping of ORT isolates using-Agar gel precipitation test (AGPT) proved that all ORT isolates belonged to serotype A. Sensitivity test was carried out and revealed

that ORT isolates were highly sensitive to amoxycillin, ampicillin and chloramphenicol while the rest of the tested antibiotics were resistant to gentamycin, sulphadiazine and rifampcin. Pathogenicity test was carried out in broilers and ducks, through aerosol challenge with ORT alone which revealed mild respiratory signs with mild tracheitis, unilateral pneumonia and mild airsacculitis while the affection become more severe in case of oncomitant ORT with NDv. The histopathological picture of ORT infected groups were necrotic tracheitis, the air sacs severely thickened with accumulation of large amount of fibrinoheterophilic exudation overlaying the epithelial layer and lungs showed fibrinoheterophilic pneumonia.

مقدم الرسالة:	وائل أنور على رشوان
موضوع الرسالة:	بعض الدراسات عن الاستسقاء فى الدجاج Some Studies on Ascites in Chickens
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى - قسم أمراض الدواجن
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١٢/٢٩ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	٠.١ / الزفاعةى محمد رفاعة ٠.٢ / محمد محمود على

ملخص الرسالة

فى الدراسة الحالية تم دراسة الأعراض والصفة التشريحية والحجم الخلوى ودلالة القلب لطيور مصابة من الاستسقاء وبالتحليل الاحصائى للنتائج وجدت زيادة مهمة فى الحجم الخلوى ودلالة القلب فى الطيور المصابة وتبين أن الميكروب القولونى هو الميكروب الرئيسى فى الطيور المصابة تم عزل من ٨٠,٤ % من الطيور المصابة من ثماني سلالات تم عزلها وتصنيفها وتبين أن O_1 هو الاكث مرضية وفق تجربة محاولة العدوى الصناعية تبين أن الظروف الجوية السيئة قادرة على حدوث الاستسقاء وأن الميكروب القولونى يزيد نسبة الحدوث والوفيات

Summary of Thesis

In The present study the clinical symptoms, gross lesions, P.C.V and heart index of ascitic birds of broiler chicks with an ascitic syndrome were examined, and by statistical analysis of the result we found that the heart index and P.C. V were significantly increased in

ascitic birds and the body weight was lower in ascitic birds than in normal birds *E. coli* were the predominant bacteria isolated from 80.4% from ascitic birds eight strains of *E. coli* were isolated and identified. The pathogenicity of isolates revealed that *olis* the most pathogenic isolate and trial for experimental induction of ascites. The result indicate that bad environmental condition poor ventilation with mild cold stress induce ascites and *E. coli* increase mortality and incidence of the ascites syndrome.

مقدم الرسالة:	وفاء عيد عبد الناصر محمد
موضوع الرسالة:	'دراسات عن العوامل البكتيرية المصاحبة للحالات المزمنة من مرض الزكام المعدى فى الدجاج' Studies on Bacterial Agents Associated with Chronic Eases of in Feitioun Corgza in Chickens
الكلية والقسم:	كلية الطب البيطرى - قسم أمراض الدواجن
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/١٢/٢٩م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د. / صلاح عبد الرحمن موسى أ.د. / محمد محمود أحمد على د/ رجب سيد إبراهيم

ملخص الرسالة

تم دراسة مدى إنتشار مرض الزكام المعدى فى الطيور فى صورتيه البسيطة المعقدة فى قطعان التسمين والبياض فى محافظات الوجه القبلى: بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج وكانت هذه القطعان تعاني من أعراض مرض الزكام المعدى وتم عزل عدد ٣٢٨ عترة من ميكروب الهيموفيلس بنسبة ٥٧% وتم تصنيفها سيولوجيا إلى المجموعات أ ، ب ، س وتم عزل الميكروبات المصاحبة فى الحالات المعقدة: وقد عزل عدد ٨٢ عترة من ميكروب الميكروبلارما جالسييتكم وعدد ٩٥ عترة من الميكروب القولونى وعدد ٣٦ من البروتيس وعدد ٢٧ من الكليسيالا وعدد ٣٣ من السيدوموناس وعند إحداث عدوى مركبة لميكروب الهيموفيلس مع ميكروبات أخرى تبين أن الحالات ذات العدوى المركبة أظهرت أعراضا أشد خطورة ونتج أيضا من هذه الدراسة إمكانية عزل ميكروب الهيموفيلس من أعضاء داخلية بخلاف الجهاز التنفسي فى الحالات ذات العدوى المعقدة.

Summary of Thesis

The prevalence of infectious coryza in its two forms, The simple and complicated from were investigated in 17 broiler chicken flocks and 31 layer chicken flocks in upper Egypt. 328 isolates were recovered from 577 examined cases (57%). These isolates represented. The 3 setovars (A,B,C) *M.gallisepticum* were recovered from 82 cases. *E. coli* were recovered from 95 cases. *Pseudomonas* were recovered from 33 cases. *Proteus* were recovered from 36 cases. *Klebsiella* were recovered from 27 cases. In this study isolation of *H. Paragallinarum* from organs other than the upper respiratory tract such as liver, spleen, ovary and oviduct.



حلية التجارة


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلية التجارة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢

درجة الماجستير			البيان
أجمالي	طالبة	طالب	القسم
٢	٢	٠٠	إدارة الأعمال
٢	٢	٠٠	الإجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية التجارة جامعة أسيوط
من عام ٢٠٠٢



قسم

إدارة الأعمال

مقدم الرسالة:	مى مرعى كامل محمود
موضوع الرسالة:	تقييم عملية التدريب الإدارى بالتصديق على مديريات الخدمات بمحافظة أسيوط . Evaluation of the Process of Administrative Training An Empirical Study Applied on the Directorates of Services in Assiut Governomate
الكلية والقسم:	كلية التجارة - قسم إدارة الأعمال
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٩/٢٩ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	د / عادل ريان محمد ريان د / مصطفى مصطفى كامل د / أمير أحمد السيد النونى

ملخص الرسالة

استهدف البحث تقييم عملية التدريب الإدارى فى مديريات الخدمات بمحافظة أسيوط من خلال معرفة ما إذا كان هناك علاقة بين مدى نجاح نشاط التدريب الإدارى فى تحقيق أهدافه وبين النظم المتبعة فى تخطيط التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية وكذلك تنفيذ التدريب وتقييمه وقياس نتائجه ولتحقيق أهداف البحث وأعمالاً لمبدأ وحده الموضوع قام الباحث بتقسيم البحث إلى ستة فصول مترابطة متكاملة تقع فى (١٦٥) صفحة بخلاف الملحق وهذه الفصول كالتالى. الفصل الأول: ويتناول مقدمة الدراسة ومشكلتها وأهدافها وأهميتها وحدودها وخطتها . والفصل الثانى: ويتناول الإبعاد الأساسية المتعلقة بالعملية التدريبية وكذلك عرض اهم الاسس والمبادئ التى تستند اليها عملية تقييم التدريب الإدارى . والفصل الثالث: ويتناول أهم الدراسات وجهود السابقين فى موضوع البحث . والفصل الرابع: ويتناول منهج الدراسة وخطواته

الإجرائية . والفصل الخامس: ويتناول تحليل نتائج الدراسة والمعالجة الإحصائية
لاختبار صحة الفروض . والفصل السادس: اعدده الباحث بغرض عرض أهم النتائج
والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

Summary of Thesis

This research aims at clarifying the importance of the relationship between the success of the training activity in the units studied and the systems followed to plan, and execute its programmes as well as evaluating its results. To realizing this aim the researcher divided this study into six chapters as follows: The First chapter: It deals with the general frame of the research and contains the research problem, objectives of study, its importance, limits and research plan. The Second chapter: It deals with the main dimensions of the training process (planning, implementation and evaluation). The Third chapter: It includes the literature review on the subject. The Fourth chapter: It contains research design and methodology the researcher followed to achieve the objectives of the study. The Fifth chapter: It includes data analysis and hypothesis testing. The Last chapter: It contains the discussion of the study's results and the most important recommendations.

مقدم الرسالة:	عبيد مختار سويفى مصطفى
موضوع الرسالة:	دور الإعلان التليفزيونى فى اتخاذ قرار شراء السلع الاستهلاكية للمستهلكين بمحافظة أسيوط - دراسة ميدانية * Television Advertising and Consumer Buying Decision Making of Consumer Goods (With Specific Reference to Assiut Government)
الكلية والقسم:	كلية التجارة - قسم إدارة الأعمال
تاريخ الـنـم:	٢٤/١١/٢٠٠٢ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / فتحي إبراهيم محمد د / حسنى محمد حماد

ملخص الرسالة

أستهدف البحث تقييم دور الإعلان التليفزيونى فى إتخاذ المستهلك لقرارات شراء السلع الاستهلاكية فى محافظة أسيوط من خلال معرفة درجة تأثير الإعلان التليفزيونى فى حالة شراء السلع الميسرة ، ودرجة هذا التأثير فى حالة السلع المعمرة ، والتعرف على دور الإعلان إذا ما قورن ذلك بدور الخبرة الشرائية للمستهلك ، ولتحقيق أهداف البحث وأعمالاً لمبدأ وحدة الموضوع تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول مترابطة تقع فى (٢١٠) صفحة بخلاف الملاحق ، وهذه الفصول كالتالى: - الفصل الأول: ويتناول الإطار النظرى لعلاقة الإعلان التليفزيونى بقرارات شراء السلع الاستهلاكية . والفصل الثانى: ويعرض أهم الدراسات العربية والأجنبية فى موضوع البحث . الفصل الثالث: ويتناول تصميم الدراسة والمنهج الذى اتبعته . الفصل الرابع: ويتناول تحليل البيانات والمعالجة الإحصائية لاختبار صحة الفروض . الفصل الخامس: ويتناول مناقشة وتفسير النتائج وأهم التوصيات التى توصلت إليها الدراسة .

Summary of Thesis

The aim of this research was identifying the extent of the consumer's response to the TV advertising for consumer Goods. To realizing this aim the researcher divided this study into five chapters as follow: Chapter 1: Relationship between the TV advertising and purchasing decisions making. Chapter 2: the previous studies. Chapter 3: The study Methods. Chapter 4: The Main Results. Chapter 5: Discussion.



كلية التربية

كلية التربية

قسم

أصول الفقه

مقدم الرسالة:	أحمد عبد الله الصغير
موضوع الرسالة:	دراسة تقييمية لنظام التعليم الثانوى العام فى مصر فى ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة An Evaluating Study of the General Secondary Education System in Egypt in the Light of some Contemporary Global Trends
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم أصول التربية
تاريخ المضم:	٢٠٠٢/٣/٣١ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / عبد الله السيد عبد الجواد أ.د / عبد التواب عبد اللاد عبد التواب د / أحمد محمد الســــــــــــمان

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التعرف على موقع نظام التعليم الثانوى العام المصرى من بعض الاتجاهات التربوية العالمية المعاصرة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى ، كما استخدمت الاستبانات والمقابلة الشخصية كأدوات للدراسة الميدانية ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها • لم ترصد الدراسة أى تعديل أو تغيير فى نظام القبول وسياسة التشجيع ، والأهداف بمرحلة التعليم الثانوى العام ، وذلك على الرغم من صدور القانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٤م المنظم للثانوية العامة الجديدة • أسفرت الدراسة النظرية والميدانية عن أن نظام الثانوية العامة الجديد يتميز باتاحة فرصة اختيار الطالب للمواد الدراسية التى يرغب فى دراستها ، وإعطائه فرصة دخول الامتحان أكثر من مرة • كشفت نتائج الدراسة النظرية والميدانية عن أن نظام التعليم الثانوى العام الجديد عاجز عن مساعدة طلابه على الاستجابة الايجابية لمتغيرات العصر

، تدريبهم على وسائل تكنولوجيا المعلومات الجديدة ، وتنمية التفكير التوقعي والمستقبلى ، والتكيف مع مجتمع سريع التغير ، أضف إلى ذلك عدم مواكبة المناهج للتقدم العلمى والتكنولوجى ، وزيادة محتواها وتعمده ، مما يدفع الطلاب على الدروس الخصوصية ، واستخدام الكتب الخارجية ، وافقه معظم أفراد عينة الإداريين والأكاديميين على أن نظام التعليم الثانوى الشامل هو أفضل التوجهات لإصلاح المدارس الثانوية العامة فى مصر .

Summary of Thesis

The study aimed at viewing, the secondary education system from the contemporary global educational trends of developing the secondary educational system. The study adopted the descriptive approach and used a questionnaire and an interview to collect data from the field. The study reached several results, the most important of which are: No changes or modifications have been made in the admission policy or the system of specialization and even the aims of the stage, in spite of the issuing of the law number (2) in 1994 which reorganized the general secondary education certificate. One of the advantages of the new order of the secondary is that it gives the student a chance to choose the school subjects that he prefers and also a chance to take the test more than once. One of the disadvantages of the new system of the secondary education is that it does not help students to respond to the new positive changes of the age, by training them the new technological tools. This is in addition to the inability of

the present syllabi to catch the technological progress, and this leads to the prevalence of private lessons. Most of the sample members agreed that the comprehensive secondary education system is the best way to reform the secondary education school in Egypt.

مقدم الرسالة:	رائدا رفعت محمد محفوظ
موضوع الرسالة:	الرضا المهني عن العمل مع الأطفال ومدى تأثيره بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة لدى طالبات شعبة رياض الأطفال بكلية التربية - جامعة أسيوط (دراسة ميدانية) Job Satisfaction about Working with Children and its Influence by Family Socio-economic Background of Kindergarten Students, Faculty of Education, Assiut University (Field Study)
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم أصول التربية
تاريخ المنع:	٢٠٠٢ / ٣ / ٢١ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / عبد التواب عبد اللاد عبد التواب أ.د / عواطف محمد حسن

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة الرضا المهني للعمل مع الأطفال لدى طالبات شعبة رياض الأطفال بكلية التربية ، والتعرف على أثر المستوى الاجتماعي - الاقتصادي للأسرة على الرضا المهني للطالبات نحو مهنة التدريس ، والتوصل إلى المقترحات التي يمكن أن تسهم في رفع درجة الرضا المهني للعمل مع الأطفال لدى طالبات شعبة رياض الأطفال، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما استخدمت مقياس المستوى الاجتماعي - الاقتصادي للأسرة من إعداد أ.د. عبد التواب عبد اللاد عبد التواب وأستبيان من إعداد الباحثة . وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: ارتفاع درجة الرضا المهني لدى طالبات شعبة رياض الأطفال بكلية التربية _ جامعة أسيوط حيث بلغت نسبتها (٨٩,٤ %) إن مرحلة الإعداد بكلية التربية ليس لها تأثيرا كبيرا على درجة الرضا المهني لدى طالبات شعبة رياض الأطفال حيث جاءت درجة رضا

طالبات الفرقة الأولى أكثر من درجة رضا طالبات الفرقة الرابعة، لا يوجد ارتباط بين درجات الرضا المهني لطالبات شعبة رياض الأطفال ودرجات المستوى الاجتماعي - الاقتصادي لهن، لا يوجد فروق دالة إحصائية بين درجات الرضا المهني للطالبات المنتميات إلى الطبقة الدنيا ودرجات الرضا المهني للطالبات المنتميات إلى الطبقة العليا.

Summary of Thesis

This study aimed at identifying kindergarten students, faculty of education, degree of job satisfaction on working with children, identifying the effect of family, socio-economic background on students' directions towards teaching job and introducing suggestions that can help in rising kindergarten students' degree of satisfaction with working with children. The researcher used the descriptive method, Scale of family socio-economic background (by Abdel-Tawab Abdelah) and a questionnaire designed by the researcher. The study reached several results, the most important of which are: kindergarten students' Faculty of Education, Assiut University, level of job satisfaction has been raised to (89.8%). Faculty of Education preparation stage does not have a big effect on kindergarten students' degree of job satisfaction as first year kindergarten students showed a higher level of job satisfaction than those of the fourth year. There is no correlation between job satisfaction grades of kindergarten students section and their socio-economic background grades. There is no statistically significant differences between low level students degree of job satisfaction and those of high level.

مقدم الرسالة:	دعاء محمد مصطفى حسن
موضوع الرسالة:	"العدوان والمشاركة الإجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة من خلال اللعب الحر والمنظم وعلاقتها بتفاعل الطفل مع الوالدين" Aggression an Social Participation of Prechoooers Through Free and Organized Play and their Relation to the Child Parents Interaction
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم أصول التربية
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/٥/٢٦ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د / عبد الرقيب أحمد إبراهيم د / شهيناز محمد عبد الله

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى قياس العدوان والمشاركة الإجتماعية ومعرفة ظهورهما وذلك بالنظر في علاقة الطفل بوالديه والتنشئة الإجتماعية للطفل والموقف الأديبي لديه . وتكونت العينة من (٣٠) طفل وطفلة من العاديين وقد تم استخدام الأدوات التالية: إستمارة ملاحظة العدوان لدى أطفال ما قبل المدرسة أثناء اللعب الحر والمنظم ، إستمارة ملاحظة المشاركة الإجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة أثناء اللعب الحر والمنظم ، اختبار رسم الرجل لجودائف ، مقياس عين شمس لأشكال السلوك العدواني لدى الأطفال ، اختبار الكفاءة الإجتماعية ، مقياس رسم الأسرة والمدرسة الجركي ، إستمارة مقابلة مقننة مع الطفل والمعلمة ، وقائمة تقدير التوافق . وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: اختلف العدوان اختلافاً جوهرياً في موقف اللعب الحر عنه في موقف اللعب المنظم لصالح اللعب المنظم . اختلفت المشاركة الإجتماعية اختلافاً جوهرياً في موقف اللعب الحر عنه في موقف اللعب المنظم لصالح اللعب المنظم . لم توجد فروق

ذات دلالة إحصائية بين الأولاد والبنات في المشاركة الإجتماعية في موقفى اللعب الحر والمنظم ، وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين الأولاد والبنات في المشاركة الإجتماعية فى موقفى اللعب والمنظم لصالح البنات ، وجد ارتباط دال إحصائياً بين العدوان والمشاركة الإجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة أثناء اللعب الحر والمنظم ويبين الأفعال والديناميات والتفاعلات كما تعكسها رسوم الطفل والمدرسة وكما يقيسها مقياس الرسم الحركي للأسرة والمدرسة .

Summary of Thesis

The study aimed at detecting aggression and social participation during free and organized play through observation and determining how far child parents relationship affects them. The sample of the study consisted of (30) 5 – 6 year old children. The coming tools were used: Draw - A man test, observation checklist of aggression of free and organized play, observation checklist of social participation in free and organized play, interview form for child and teacher, and the kinetic drawing system for family and school. Results of the study were as follows: Organized play situation revealed more aggressive behavior than free play situation. There are significant difference between social participation in free play and social participation in organized play in favor of organized play situation. No statistically significant differences were found between boys and girls in aggression in free and organized play. Significant statistical differences were found between boys and girls in social participation

in free and organized play in favor of the girls. Significant correlation were found between aggression and social participation of preschoolers during free and organized play and actions, dynamics and interactions as reflected in the child's drawings of family and school as measured by the kinetic drawing system of family and school.

مقدم الرسالة:	آمال شحاته مصطفى على
موضوع الرسالة:	بعض المشكلات المهنية التي تواجه المعلمين والمعلمات في المعاهد الإعدادية الأزهرية Some Professional Problems which Face Teachers at Al-Azhar Preparatory Schools
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم أصول التربية
تاريخ الج�م:	٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / عواطف محمد حسن د / ماجدة أمين السمالوطى

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التعرف عل بعض المشكلات المهنية التي توجه المعلمين والمعلمات فى المعاهد الإعدادية، والتوصل إلى المقترحات التى يمكن تفيد فى تذليل بعض المشكلات التى يعانى منها المعلمون والمعلمات بالمعاهد الأزهرية وذلك للنهوض بالعملية التربوية ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصف ، كما قامت الباحثة بأعداد استبانة ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج: أن المعلمين والمعلمات بالمعاهد الإعدادية الأزهرية المؤهلين تربويا لديهم إحساس أكبر بالمشكلات المهنية وعدم وجود أبواب الفصول الدراسية وطول المقررات الدراسية ونقص التجهيزات المادية فى المعاهد الأزهرية وعدم الاهتمام بالأنشطة التربوية وأما بالنسبة لعامل الخبرة ، فكتشفت نتائج الدراسة كلما زادت سنوات الخدمة قل الشعور فى بعض المشكلات وذلك لوعيهم لحل تلك المشكلات ، كما كتشفت الدراسة أن هناك بعض المشكلات قد يزيد الشعور بها بزيادة سنوات الخدمة وأن هناك بعض المشكلات قد لا تتأثر بسنوات الخدمة .

Summary of Thesis

Objectives of the study: The recent study aims at identifying the professional problems which teachers encounter in Al-Azhar preparatory institutes. Coming to some suggestions and recommendations which might be helpful in overcoming some of the problems which teachers encounter in Al-Azhar institutes in order to promote the educational process. The results of the study: The educationally qualified teachers in Al-Azhar preparatory institutes suffer from many professional problems more than uneducationally qualified teachers. These problems are stated in the following lines. The lack of doors in some educational classes. The enlargement of the scholastic courses which are not related to the surrounding environment and which deal only with the religious aspect. The shortage of equipments in Al-Azhar institutes. Paying no attention to the educational activities, and the shortage of the financial funds devoted for these activities. There is no co-operation between parents and teachers to solve the problems of the students. As to the element of experience, the results of the study brought to light the fact that the more the years of service increase, the less are the professional problems which teachers encounter, because they become more aware of the ways of solving these problems. The results of the study showed also that there are some problems that can be felt more as years of experience increase. It revealed also that some problems may not be affected by number of years of experience.

قسم

علم النفس

مقدم الرسالة:	عزّه عباس محمود
موضوع الرسالة:	تأثيرات الكافيين على بعض المتغيرات النفسية والعقلية لدى الطلاب Effects of Caffeine on some Psychic and Mental Variables in the Students
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم علم نفس تعليمي
تاريخ المنح:	٣ / ٣ / ٢٠٠٢ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / صلاح الدين جبين الشريف أ.د / أمام مصطفى سيد

ملخص الرسالة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثيرات الكافيين على بعض المتغيرات النفسية والعقلية لدى الطلاب وتكونت عينة الدراسة من (١٦٨ طالب وطالبة) من ثلاث كليات تربية وصيدلة وهندسة وتعددت الأدوات المستخدمة في هذه الدراسة حيث تم استخدام مقياس القلق إعداد عبد الرقيب أحمد إبراهيم ١٩٨٤م ومقياس الاكتئاب إعداد غريب عبد الفتاح ١٩٨٥م ومقياس الذاكرة إعداد إمام مصطفى سيد ، صلاح الدين حسين الشريف ، على أحمد السيد ١٩٩٨م واستبانته جمع بيانات إعداد الباحثة وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج ومن أهمها: وجود فروق دالة إحصائية في متوسطات درجات القلق النفسي بين مرتفعي استهلاك الكافيين ومنخفضي استهلاك الكافيين لصالح مرتفعي استهلاك الكافيين من طلبة وطالبات كليات التربية والصيدلة والهندسة كل كلية على حده ووجود فروق دالة إحصائية في متوسطات درجات الاكتئاب النفسي بين مرتفعي استهلاك الكافيين ومنخفضي استهلاك الكافيين من طلبة وطالبات كلية التربية لصالح مرتفعي استهلاك الكافيين وعدم وجود فروق دالة إحصائية في متوسطات درجات

الاكتئاب النفسى بين مرتفعى استهلاك الكافيين ومنخفضى استهلاك الكافيين لطبية
وظالبات كلية الهندسة والصيدلة كل كلية على حده .

Summary of Thesis

The aim of the study was to know the effects of caffeine on some psychic and mental variables in the students. The number of subjects was 168 students from three faculties; Education, Pharmacy and Engineering. The methods of the study were: Scale of irritability by Abd El-Rakip Ahmad Ibrahim. Scale of depression by Gharib Abd El-Fattah 0 Scale of memory by Eman Mostafa Sayed, Salah El-Din El-Sharif and Ali Ahmad Sayed. A form of data collection by the researcher. The main results of this study: There were statistically significant variable differences in the mean scores of anxiety between caffeine users and non-caffeine users in favour of caffeine users of students of the three faculties., every faculty alone. There were statistically significant variable differences in the mean scores of depression between caffeine users and non caffeine users of faculty of Education students whereas there were no statistically significant variable differences in mean scores of depression between caffeine users and non-caffeine users of the students of pharmacy and Engineering, every faculty alone.

مقدم الرسالة:	محمود محمد إمام عامر
موضوع الرسالة:	مدى فعالية العلاج السلوكي _ المعرفي لخفض قلق الكمبيوتر لدى عينة من طلاب كلية التربية The Effectiveness of Behavioral-Cognitive Therapy for Alleviating Computer Anxiety of Pre-service Student Teachers
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم علم نفس تعليمي
تاريخ المفهم:	٢٠٠٢/٣/٣ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / صبره محمد علي أ.د / عبد الرقيب أحمد إبراهيم أ.د / عفاف محمد محمود عجلان

ملخص الرسالة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية العلاج السلوكي المعرفي في خفض قلق الكمبيوتر لدى عينة من طلاب كلية التربية . وقد اشتملت عينة الدراسة السيكومترية على ٤١٣ من طلاب وطالبات كلية التربية بالفرقتين الأولى والثالثة جميع الشعب . اشتملت أدوات الدراسة على مقياس تقدير قلق الكمبيوتر ، مقياس الاتجاهات نحو الكمبيوتر ، جهاز الداتا جراف للقياس الفسيولوجي ، المعايير الشخصية لقلق الكمبيوتر (من إعداد الباحث) ، اختبار توريس لرسم الكمبيوتر برنامجا العلاج القائمين على فنيتي التخلص المنظم من الحساسية ، وإعادة ترتيب البنية المعرفية (من إعداد الباحث) ، وقد اشتملت العينة الكليينكية على ١٨ طالبا وطالبة تم تقسيمهم لمجموعتين تجريبيتين وأخرى ضابطة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط سلبي بين قلق الكمبيوتر والاتجاه نحو الكمبيوتر ، كما أن الإناث أظهروا قلقاً أعلى تجاه الكمبيوتر من الذكور ، وأظهرت الخبرة تأثيراً في قلق الكمبيوتر . كما أثبتت الدراسة فعالية كلا

من قنيتي التخلص المنظم من الحساسية وإعادة ترتيب البنية المعرفية في خفض قلق
الكمبيوتر لدى عينة الدراسة .

Summary of Thesis

The study investigated the effectiveness of using cognitive-behavioral therapy represented in systematic desensitization and cognitive restructuring in alleviating computer anxiety of faculty of education students, Assiut University. The Computer Anxiety Rating Scale (CARS) (translated by the researcher), the Computer Anxiety and Apathy Scale (CAAS) (translated by the researcher), the Draw-a-Computer Test (DCT), the physiological measurements using Datagraph, and the Computer Anxiety Diagnostic Criteria (CADC) were administered on 431 faculty of education students selected randomly from first year and third year students. The role of gender and computer experience in computer anxiety was investigated. The relationship between computer attitudes and computer anxiety was explored. A clinical sample of 18 students who showed severe symptoms of anxiety and high scores on the CARS was selected. The sample was divided into experimental groups and control group. The two experimental groups received counseling and therapeutic programs based on systematic desensitization and cognitive restructuring. The results of the study showed a statistically significant role of both gender and computer attitudes. Also the systematic desensitization and cognitive restructuring proved effective in alleviating computer anxiety.

مقدم الرسالة:	صابر حسن حسين حسن
موضوع الرسالة:	أساليب التفكير وعلاقتها بوجهة الضبط والتوافق الدراسي لدى طلاب المرحلة الثانوية Thinking Styles and its Relationship with Locus of Control and Academic Adjustment Among Secondary School Students
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم علم نفس تطبيقي
تاريخ المنع:	٢٠٠٢ م / ٣ / ٣١ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / أمام مصطفى سيد أ.د / صلاح الدين حسين الشريف د / محمد رياض أحمد

ملخص الرسالة

تهدف هذه الدراسة إلى بحث علاقة أساليب التفكير بوجهة الضبط والتوافق الدراسي ، وتكونت عينة الدراسة من (٢٤٠ طالب وطالبة) من الصف الثاني الثانوي ، وتعددت الأدوات المستخدمة في الدراسة حيث تم استخدام: مقياسي أسلوب التفكير الخارجي والداخلي إعداد الباحث ، ومقياس وجهة الضبط " لروتر Rotter تعريب علاء الدين كفافي ومقياس التوافق الدراسي إعداد الباحث وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج ومن أهمها: يسود أسلوب التفكير الخارجي لدى عينة البحث الكلية، ووجود تأثير دال موجب لكل من الجنس والتخصص الدراسي على أسلوب التفكير وعدم وجود أثر لتفاعل الجنس والتخصص الدراسي على أسلوب التفكير ووجود علاقات ارتباطية دالة بين أسلوب التفكير وجهة الضبط لدى عينة الطلاب فقط، ووجود علاقات ارتباطية دالة بين أسلوب التفكير وأبعاد التوافق الدراسي لدى عينة البحث ووجود

فروق دالة إحصائياً بين مرتفعي أسلوب التفكير في أبعاد التوافق الدراسي لدى عينة
البحث .

Summary of Thesis

The study aims at identifying the relationship of thinking styles to locus of control and academic adjustment. The sample of the study consisted of 240 second-year secondary school students. The researcher used the following roles: Two scales of internal and external thinking prepared by the researcher. Locus of control scale by Rotter, translated by Alaa Kafafy. Academic achievement scale, prepared by the researcher. The study reached the following results: The external thinking style was more prevalent in the study sample, and there was a significant effect of sex. academic major on the style of thinking and there was no effect for the interaction between sex and academic major on the style of thinking. There was a significant correlation between style of thinking and locus of control for the male students, and there was a significant correlation between style of thinking and dimensions of academic adjustment for the study sample. There were significant differences between the higher thinkers in dimensions of academic adjustment for the study sample.

مقدم الرسالة:	غلاف عبد اللاد عثمان على
موضوع الرسالة:	مدى فعالية برنامج لتنمية التفاعل الاجتماعي وأثره على النمو المعرفي لدى أطفال المرحلة الابتدائية The Effectiveness of a Program to Develop Social Interaction and its Effect on the Cognitive Development of Elementary School Children
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم علم نفس تعليمي
تاريخ المصم:	٢٠٠٢ / ٥ / ٢٦ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / أمام مصطفى سيد د / على أحمد سيد د / سمير د محمد أحمد

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية برنامج لتنمية التفاعل الاجتماعي وأثره على النمو المعرفي لدى أطفال المرحلة الابتدائية ، وتكونت عينة الدراسة من (٣١٦) تلميذ وتلميذه بمدارس مختلفة بمحافظة المنيا وقد تم استخدام الأدوات الآتية: برنامج لتنمية التفاعل الاجتماعي - مقياس التفاعل الاجتماعي - اختبار مراحل بياجيه للنمو المعرفي ، وقد تم التوصل إلى النتائج الآتية: وجدت علاقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائية بين التفاعل الاجتماعي للأطفال ونموهم المعرفي ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ومتوسط أداء المجموعة الضابطة في التفاعل الاجتماعي لصالح المجموعة التجريبية وذلك بعد تطبيق البرنامج ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ومتوسط أداء المجموعة الضابطة في النمو المعرفي لصالح المجموعة التجريبية وذلك بعد تطبيق البرنامج

ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين تلاميذ الصفين الرابع والخامس في التفاعل الاجتماعي والنمو المعرفي لصالح تلاميذ الصف الخامس .

Summary of Thesis

The study aimed at identifying the effectiveness of a program to develop social interaction and its effect on the cognitive development of elementary school children. The sample of the study consisted of (316) children from different school located at El-Minia Governorate. The following tools were used: A program for developing social interaction, social interaction measure for children, cognitive development test. The results of the study were as follows: Positive significant correlation were found between social interaction of children and their cognitive development. Statistically significant differences were found between the mean performance of the experimental group and the mean performance of the control group in social interaction in favor of the experimental after using the program. Statistically significant differences were found between the mean performance of the experimental group and that of the control group in cognitive development in favor of the experimental group after using the program. Statistically significant differences were found between the forth and fifth graders' in social interaction and cognitive development in favor of the fifth graders.

مقدم الرسالة:	محمد إبراهيم محمد أحمد خير الله
موضوع الرسالة:	الإلتواء المدرسي وعلاقته بالقلق في مرحلة المراهقة School Belongingness and its Relationship with Anxiety in Adolescence-Stage
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم علم نفس تعليمي
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ملجستير »
لجنة الإشراف:	د / رجب أحمد على د / شهيناز محمد عبد الله

ملخص الرسالة

تتكون من ٥٤٤ تلميذاً بالصف الثاني الإعدادي • أدوات الدراسة: مقياس الإلتواء المدرسي (إعداد الباحث) إستمارة المقابلة الكلينيكية (إعداد الباحث) مقياس القلق كسمة (إعداد عبد الرقيب البحيري) اختيار تفهم الموضوع (التات) (إعداد موري ومورجان) • نتائج الدراسة: توجد علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائية بين المدرسي والقلق عدم وجود فروق إحصائية بين البنين والبنات في الإلتواء المدرسي • توجد إختلافات دينامية في البناء النفسي بين مرتفعي ومنخفضي الإلتواء المدرسي •

Summary of Thesis

Sample of study: 544 students in second class of preparatory school. Tools of study: School belongingness scale (prepared by the researcher). Clinic interview questionnaire (prepared by researcher). Anxiety trait scale (prepared by Abdel – Rakeeb Ahamed Ibrahim Al

– Behery). TAT (prepared by Morry and Morgan). Result of study: There is a statistically negative relationship between school and anxiety. There were no statistical differences between the mean degree of males and that of females in school belongingness. There is a dynamic relationship between hidden motives and school belongingness of our cases of study.

مقدم الرسالة:	نادية عبد اللاه عبد الثواب
موضوع الرسالة:	'مفهوم الذات لدى الأطفال وعلاقته بأساليب المعاملة الوالدية' Children's Self Concept and its Relation Ship with Parental Socialization Styles
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم علم نفس تعليمي
تاريخ المسم:	٣٠ / ٦ / ٢٠٠٢ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / عبد الرقيب أحمد إبراهيم أ.د / رجب أحمد على

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقة الارتباطية بين مفهوم الذات وأساليب المعاملة الوالدية لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية ، والاستفادة من نتائج الدراسة في تحديد أفضل أساليب المعاملة الوالدية التي يتحقق معها مفهوم الذات الإيجابي لدى الأطفال وتحددت فروض الدراسة في ستة فروض وللتحقيق من فروض الدراسة تم إعداد مقياس مفهوم الذات لدى الأطفال ، مقياس المعاملة الوالدية وتم إخضاع هذه المقاييس لإجراءات التقنين للتأكد من كفاءته ، وطبقت الدراسة الميدانية على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي بلغ حجمها (٥٣٦) تلميذاً واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي . وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها بالنسبة للفرض الأول ، فقد تحققت صحة الفرض ، حيث وجدت علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين مفهوم الذات لدى الأطفال وأساليب المعاملة الوالدية لكل من الأب والأم ممثلة في: القسوة ، الإهمال ، الحماية الزائدة ، السواء وأوضحت النتائج أن أساليب المعاملة الوالدية السوية واللاسوية تؤثر إيجابياً وسلباً على مفهوم الأطفال لذواتهم وتقديرهم لها . وبالنسبة للفرض الثاني ، فقد تحققت صحة الفرض ، حيث أوضحت نتائج تحليل

الاتحادار المتعدد وجود تأثيرات دالة إحصائية عند مستوى (٠,٠١) ، (٠,٠٥) لأساليب المعاملة الوالدية لكل من الأب والأم على مفهوم الذات لدى الأطفال ، فقد تركت أساليب المعاملة السوية أثرا إيجابيا على مفهوم الذات لدى الأطفال والعكس صحيح وبالنسبة للفرض الثالث ، فقد تحققت صحة الفرض جزئيا ، حيث أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة البنين والبنات في مفهوم الذات العام . وبالنسبة للفرض الرابع ، فقد تحققت صحة الفرض ، حيث أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى (٠,٠٥) بين متوسط درجات أفراد عينة البنين والبنات في أساليب المعاملة الوالدية للأب لصالح البنين ، بينما لا يوجد فروق بينهما في المعاملة الوالدية للأم . وبالنسبة للفرض الخامس ، فقد تحققت صحة الفرض ، حيث وجدت فروق دالة إحصائية عند مستوى (٠,٠١) بين متوسط درجات عينة الريف والحضر في مفهوم الذات العام لدى الأطفال لصالح عينة الحضر . وبالنسبة للفرض السادس ، فقد تحققت صحة الفرض حيث أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى (٠,٠٥) بين متوسط درجات عينة الريف والحضر في أساليب المعاملة الوالدية للأب في جانب الحضر ، بينما لا يوجد فروق بينهما في أساليب المعاملة الوالدية للأم .

Summary of Thesis

The present study investigated the nature of the correlation between elementary graders' self-concept and parental upbringing styles. The study aim was to identify the best parental upbringing practices which achieve a positive self-concept for children – Children's self-concept (css) parental upbringing styles scale (puss),

prepared by the researcher, were administered on a sample of 536 elementary fifth graders from both genders. The study adopted the analytical descriptive approach. Statistical analyses were performed to test the study hypotheses. The results of the study showed that there was a significant correlation between children's self-concept and parental upbringing practices represented in cruelty, neglect, overprotection and normality. Multiple regression analyses showed a significant effect of ($P > 0.01$) parental upbringing practices on children's self-concept. There were no statistically significant gender differences in the general self concept. There were statistically significant differences ($P > 0.05$) between males and females in the father upbringing styles in favour of the males, whereas these differences vanished in the mother upbringing styles. There were statistically significant differences between the rural sample and the town sample in the general self-concept ($P > 0.01$) in favour of the town sample. Finally, there were statistically significant differences between the town sample and the rural sample ($P > 0.05$) in the father upbringing styles in favour of the town sample, whereas these differences disappeared in the mother upbringing styles.

مقدم الرسالة:	منتصر صلاح عمر سليمان
موضوع الرسالة:	بعض أبعاد البنية المعرفية وأثرها في مستويات معالجة المعلومات لدى الطلاب العاديين وذوى صعوبات التعلم Some Dimensions of Cognitive Structure and Their Effect on Levels of Information Processing in Normal and Learning Disabled Students
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم علم نفس تعليمي
تاريخ المحرم:	٢٠٠٢/٩/٢٩ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د / إمام مصطفى ســــــيد أ. د / صلاح الدين حسين الشريف

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الفروق بين الطلاب العاديين وذوى صعوبات التعلم (الفهم القرائي) في أبعاد البنية المعرفية (الترابط التمايز ، التنظيم الكم المعرفي) ، وفي مستويات معالجة المعلومات (الضحل ، المتوسط العميق) ، والتعرف على مدى تأثير تفاعل أبعاد البنية المعرفية المحددة الكيفية والكمية في مستويات معالجة المعلومات (الضحل ، المتوسط العميق) ، تكونت عينة الدراسة من (٢٧٤) طالباً من طلاب الصف الأول الثانوى العام بمدينة أسبوط بمتوسط عمرى ١٤,٢٥ وانحراف معيارى ٠,٨٦ ، استخدمت الدراسة الأدوات التالية: قائمة مهارات الفهم القرائى ، تحليل محتوى كتب القواعد النحوية والصرفية للمرحلة الإعدادية ، اختبار الفهم القرائى ، اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن ، مقياس أبعاد البنية المعرفية (الترابط ، التمايز ، التنظيم) لطلاب الصف الأول الثانوى ، مقياس يعد الكم المعرفى (التعرف ، الاستدعاء لطلاب الصف الأول الثانوى اختبار مستويات معالجة المعلومات .

وقد توصلت الدراسة إلى: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الطلاب العاديين وذوى صعوبات التعلم على كل من: مقياس أبعاد البنية المعرفية الكيفية (الترابط التمايز ، التنظيم)، مقياس الكم المعرفي (التعرف ، الاستدعاء)، اختبار مستويات معالجة المعلومات لصالح العاديين ووجود أثر دال إحصائياً لأبعاد البنية المعرفية المحددة الكيفية والكمية على مستويات معالجة المعلومات لدى الطلاب العاديين وذوى صعوبات التعلم.

Summary of Thesis

The study aimed to disclose the differences between normal students and students with learning disability of reading comprehension in the dimensions of cognitive structure (association, discrimination, organization, cognitive quantity). The study, likewise, sought to identify the differences between normal students and students with learning disabilities of reading comprehension in levels of information processing (shallow, intermediate, deep). Identify the extent of effect of qualitative and qualitative dimensions of cognitive structure on levels of information processing. Reading comprehension test (RCT), prepared by researcher, Raven Matrices Test (RMT), Cognitive Structure Scale (CSS), prepared by the researcher, levels of information test prepared by the researcher, were administered on 274 preparatory first graders with average age 14.25, SD, 0.86. Results of the study showed that there were statistically significant differences between mean scores of normal students and mean scores of students

with learning disability on the CSS in favour of normal students. There were statistically significant differences between normal students and LD students on each of the cognitive quantity scale and levels of information processing scale in favour of normal students. There is a significant effect of the qualitative and quantitative cognitive structure dimensions on the levels of information processing in both normal and learning disabled students.

مقدم الرسالة:	على محمود محمد عبد المنطلب
موضوع الرسالة:	<p>* هروب الطلاب من مدارس التعليم الفني الزراعي وعلاقته بمستويات القلق وموضع التحكم لديهم - دراسة تحليلية في ضوء التحليل النفسي</p> <p>The Student Runaway from the Agriculture Technical Schools and its Correlation to Anxiety Level and their Locus of Control Analytical Study in the Light of Psychoanalysis</p>
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم علم نفس تعليمي
تاريخ المنسم:	٢٠٢٢/١١/٢٤ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د / عبد الرقيب أحمد إبراهيم د / عفاف محمد أحمد محمود جعيسى

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن المتغيرات المرتبطة بهروب طلاب التعليم الفني الزراعي وكذلك التوصل إلى مدى دلالة الفروق بين هذه المتغيرات . تم تطبيق أدوات الدراسة السيكومترية (مقياس العوامل المسببة لهروب الطلاب من المدرسة للمراهقين . اختبار حاله وسمه القلق للكبار - موضوع التحكم) على عينة قوامها ٣٠٠ طالب من طلاب الصف الأول الثانوي الزراعي . قام الباحث باختيار حالتين طرفيتين طبقت عليها أدوات الدراسة الكلينية (استمارة المقابلة الكلينية - اختبار تفاهم الموضوع) وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة ودالة بين عوامل الطلاب وكل من حاله وسمه القلق وكذلك توجد علاقة ارتباطية موجبة ودالة بين عوامل هروب الطلاب وكل من التحكم الخارجي والتحكم الداخلي كما كشف

البناء النفسي لشخصية الطالب الأعلى في درجة الهروب والأدنى في درجة الهروب عن
وجود بعض المؤشرات الدالة على ارتفاع درجة الهروب وكذلك وجود بعض المؤشرات
الدالة على انخفاض درجة الهروب

Summary of Thesis

The present study aims at psychological causes the student runaway from agricultural technical. The researcher applied the following scales. (the scale of the factor causing the runaway of students from schools the state – trait anxiety for adults scale – locus of control scale) selected 300 students from the first year secondary in 3 Agricultural schools is an important issue and emphasis should be placed on it in order to find suitable solutions (clinical) interview from – TAT test results. The study results can be stated in the following points there is a positive correlation between the factors of the student runaway and both state anxiety and trait anxiety among the samples of the study correlation between the student runaway and external control correlation between external control and both state anxiety and trait anxiety among the samples of the study the psychological structure of the personalities of the students representing the sample reveals that there are some indication of high as well as low degrees of runaway this was revealed through their responses to the TAT test.

قسم

المنهج وطرق

التدريس

المعتر بالله زين الدين محمد	مقدم الرسالة:
أثر استخدام الكمبيوتر في تدريس الفيزياء على تنمية التفكير الابتكاري لدى طلاب المرحلة الثانوية The Effect of Using Computer in Teaching Physics on Developing Creative Thinking for Secondary Stage Students	موضوع الرسالة:
كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس	الكلية والقسم:
٢٦ / ٥ / ٢٠٠٢ م (ماجستير)	تاريخ المزمع:
أ.د. / السيد شحاته محمد	لجنة الإشراف:
أ.د. / تحيه حامد عبد العال	

ملخص الرسالة

هدف البحث الحالي إلى قياس أثر استخدام الكمبيوتر في تدريس الفيزياء على تنمية التفكير الابتكاري لدى طلاب الصف الأول الثانوي ولتحقيق الهدف من هذا البحث تم إعداد برنامج كمبيوتر تعليمي في وحدة قوانين البقاء من مقرر الفيزياء للصف الأول الثانوي كما تم إعداد اختبار التفكير الابتكاري في الفيزياء وقد تطبيق اختبار التفكير الابتكاري في الفيزياء قبلها على مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية ، ثم درست المجموعة الضابطة الفيزياء بالطريقة المعتادة ، بينما درست المجموعة التجريبية باستخدام الكمبيوتر ، وتم تطبيق اختبار التفكير الابتكاري في الفيزياء بعديا على مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي للتفكير الابتكاري في الفيزياء عند مستوى دلالة ٠,٠٥ لصالح التطبيق البعدي ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق

البدى لاختبار التفكير الابتكارى فى الفيزياء عند مستوى دلالة ٠.٠٥ ، لصالح
المجموعة التجريبية .

Summary of Thesis

The present study aimed at measuring the effect of using computer in teaching physics on developing the creative thinking among first year secondary students. In order to achieve the research aim, an instructional computer program was designed in the unit of retention rules in the first grade secondary physics syllabus. A test of creative thinking in physics was also designed. The test of creative thinking in physics was administered as a pretest on the control and the experimental groups. The control group studied physics using the traditional method. While the experimental group studied using computer. The test of creative thinking in physics was administered as a post test on the control and experimental groups. The following results were concluded: The existence of statistically significant differences between the mean scores of the experimental group in the pre and post application of the creative thinking test in physics at the level of 0.05 in favor of the post application. The existence of statistically significant differences between the mean scores of the control and the experimental groups in the post application of the creative thinking in physics at the level of 0.05 in favor of the experimental group.

مقدم الرسالة:	عبد الله عبد المطلب عبد الرحمن
موضوع الرسالة:	أثر استخدام الدراسة العملية في تدريس بعض الصناعات الصغيرة في تنمية بعض المهارات العملية في العلوم لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الوادي الجديد The Effect of using the Practical Study in Teaching some Small Industries on Developing some Practical Skill in Science for Preparatory-two Students in New Valley
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ الـنـسـم:	٢٠٠٢/٥/٢٦ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د / عمر سيد خليل د / إبراهيم أحمد غنيم د / محمد سعد طه

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الدراسة العملية في تدريس بعض الصناعات الصغيرة في تنمية بعض المهارات العملية في العلوم لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الوادي الجديد . وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الوادي الجديد . وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي إحداهما مجموعة تجريبية عددها (٣٠) تلميذا بمدرسة الأمل الإعدادية بالراشدة والأخرى ضابطة عددها (٣٠) تلميذا بمدرسة الموشية الإعدادية وقد تمثلت أدوات الدراسة في إعداد قائمة بالمهارات العملية موضوع الدراسة المتضمنة بوحدة " أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة " بمقرر

العلوم للصف الإعدادي وإعداد استطلاع رأى لتحديد الأهمية النسبية للمهارات العملية وإعداد دليل للمعلم وإعداد دليل للمعلم وإعداد اختبار معرفي لقياس الجانب المعرفي للمهارات العملية و إعداد بطاقات ملاحظة لقياس الجانب الأدائي للمهارات العملية . وباستخدام اختبار (ت) تم التوصل إلى النتائج التالية: يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي للاختبار المعرفي وبطاقات الملاحظة معا عند مستوى (٠.٠١) لصالح المجموعة التجريبية - حيث جاءت قيم (ت) المحسوبة أكبر من قيم (ت) الجدولية لكل المهارات العملية . أن للدراسة العملية أثر قووى في تنمية المهارات العملية لدى تلاميذ المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة حجم الأثر لدور الدراسة العملية في تنمية المهارات العملية (٢٩ - ٥٦) حيث هذه النسبة أكبر من (٠.٠٨) والتي حددها كارل Carl فى معالته لقياس حجم الأثر . فعالية وصلاحية استخدام الدراسة العملية فى تنمية المهارات العملية المتضمنة بوحدة " أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة " من مقرر العلوم للصف الثانى الإعدادي حيث بلغت نسبة الكسب المعدل (١٣ - ١٤٥) وهى نسبة أكبر من (١٢) والتي حددها بلاك دليلا على فعالية طريقة الدراسة العملية فى تنمية المهارات العملية .

Summary of Thesis

The study aimed at investigating the effect of using the practical study in teaching some small industries on developing some practical skills in science for preparatory - two pupils in the new valley Governorate. The sample of the study consisted of two groups of preparatory two pupils one of them as an experimental group, which

contained (30) students in Al – Amal prep. School in Al-Rashda and another one as a control group, which contained 30 students in Al – Mosheya prep school. The tools of the study were represented in the preparation of the practical skills inventory included in the unit titled “the effect of some beings on the human being and the environment” in the science course for preparatory two students. Second questionnaire eliminate ratio importance for practical skills and the preparation of a teacher’s guide. Third, the preparation of a cognitive test to measure the cognitive aspect of the practical skills. Fourth, the preparation of observation sheets to measure the performance aspect of the practical skills. Using T- test as a statistical style, the researcher reached the following results: There are statistically significant difference between the two means of the experimental group and the control group students scores of the post administration of the cognitive test and the observation sheets at the level of (0.01) in the favor of the experimental group. The calculated T value was higher than table value for all the practical skills. The practical study has a strong effect on developing the practical skills of the experimental group pupils for the effect size percent for the role of the practical study on developing the practical skills (from 2.9- 5.6) for this percent is higher than 0.8 that karl identified in his equation for measuring the effect size. The effectiveness and feasibility of the practical study in developing the practical skills included in the unit titled. ”The effect of some beings on the human being and the environment“ in the

science course for preparatory – two students for the percent of the gain ratio (1.3 – 1.45) and this percent is higher than (1.2) which Blak recognized this is an evidence on the effectiveness of practical study skills an developing the practical skills.

أحمد بهاء الدين / فوزى محمد	مقدم الرسالة:
تنمية بعض كفايات التدريس لدى طلاب الفرقة الرابعة تخصص طبيعة وكيمياء بكلية التربية جامعة أسيوط باستخدام التدريس المصغر	موضوع الرسالة:
Developing some Teaching Competencies of the Fourth year Physics and Chemistry of the Faculty of Education Assiut University by Using the Microteaching	
كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس	الكلية والقسم:
٢٨ / ٧ / ٢٠٠٢ م « ماجستير »	تاريخ المنع:
أ. د / عمر سيد خليل	لجنة الإشراف:
د / عياده أحمد عياده	
د / محمد سعد طه	

ملخص الرسالة

هدف البحث إلى دراسة أثر أسلوب التدريس المصغر في تنمية بعض الكفايات التدريسية لدى الطلاب المعلمين " عينة البحث " وأدوات البحث: عشر بطاقات ملاحظة من إعداد الباحث لتقويم الكفاءات المهنية والتخصصية لدى عينة البحث وأشارت النتائج الإحصائية إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح أفراد المجموعة التجريبية بالنسبة لكفاءات (تقديم الدرس _ الشرح والتفسير - تنوع المثير -الغلق - تصنيف الأسئلة - توجيه الأسئلة - التعليق على إجابات التلاميذ - استخدام التعزيز في تعديل السلوك - أداء العرض العملي - مراعاة احتياطات الأمان - عرض النتائج ببيانياً - تفسير النتائج - تدارك الأخطاء العشوائية والمنظومة) وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي

البحث بالنسبة لكفاءات (صياغة الأسئلة - استخدام الميورة الطباشيرية - باستخدام المشاركة الوجدانية فى تعديل المملوك - عرض النتائج حسابيا).

Summary of Thesis

The present research aimed at investigating the effect of the microteaching approach on developing some of the teaching competencies of the student teachers (Research Sample). The tools of the research: Ten Cards for observation prepared by the researcher to evaluate the professional specialized efficiency for the sample of the research. Results of the research: The research results indicated that there were statistical significant differences between the experimental and the control groups favouring the experimental group concerning these competencies 9 presenting the lesson - explaining the lesson - varying the stimulus - classifying the questions - directing the questions - commenting an the answers of the behaviours of the students- projection the Results diagrammatically and last explaining the results - the systematic and random errors. The Results indicated that there were no significant differences between the two groups concerning competencies of (formulating the questions - using the chalkboard - using the emotional participation to change behaviours - projecting the results mathematically).

مقدم الرسالة:	أيمن يونس شلقامي على
موضوع الرسالة:	أثر استخدام خريطة المفاهيم في تدريس العلوم لتلاميذ الصف الثالث الإعدادي على التحصيل والميل نحو دراسة العلوم The Effect of Using Concepts Map in Teaching Science to Second Year Prep School Pupils on Achievement and Tendency Towards Studying Science
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ المصم:	٢٨ / ٧ / ٢٠٠٢ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / عمر سيد خليل أ.د / السيد شحاته محمد د / عباده أحمد عباده

ملخص الرسالة

هدف البحث إلى الآتي: التعرف على خريطة المفاهيم كأداة للتعليم وبناء خريطة المفاهيم التي تشتمل عليها الوحدة الثانية (الفضاء الخارجي) " النجوم والكواكب " في كتاب العلوم للصف الثاني الإعدادي ومعرفة أثر استخدام خريطة المفاهيم الناتجة على تحصيل المفاهيم العلمية ومعرفة أثر استخدام خريطة المفاهيم الناتجة على ميل التلاميذ نحو دراسة العلوم ومعرفة أثر الجنس بالنسبة لاستخدام خريطة المفاهيم على تحصيل تلاميذ الصف الثاني الإعدادي للمفاهيم العلمية ومعرفة أثر الجنس بالنسبة لاستخدام خريطة المفاهيم على ميل تلاميذ الصف الثاني الإعدادي للمفاهيم العلمية ولقد اقتصر البحث على الحدين الآتيين: دراسة الوحدة الثانية " الكواكب والنجوم " في كتاب العلوم للصف الثاني الإعدادي وعينة البحث ، واقتصر على مجموعتين هما: المجموعة

التجريبية وتكونت من فصل من تلاميذ الصف الثانى الإعدادي بمدرسة ملوى الإعدادية بنين (٤٤ تلميذا) وفصل من تلميذات مدرسة ملوى الإعدادية بنات (٦٦ تلميذة) والمجموعة الضابطة وتكونت من فصل تلاميذ الصف الثانى الإعدادي بمدرسة ملوى الإعدادية بنين (٤٤ تلميذا) وفصل من تلميذات مدرسة ملوى الإعدادية بنات (٦٦ تلميذة) وقام الباحث بإعداد مجموعة من الأدوات تمثلت فى استبيان لتحديد الصبغة العلمية واللغوية للمفاهيم بكراسة الأنشطة المصاحبة للتدريس باستخدام خريطة المفاهيم - كتيب التلميذ - دليل للمعلم. لإعداد اختبار تحصيلي فى الوحدة الثانية فى كتاب العلوم للصف الثانى الإعدادي - استخدام مقياس الميول الدراسية من إعداد فؤاد أبو حطب وتمثلت النتائج فيما يلى: أن المجموعات التجريبية (بنين وبنات) والتي استخدمت خريطة المفاهيم فى التدريس تفوقت فى التحصيل على المجموعات الضابطة والتي استخدمت الطريقة المعتادة وعدم وجود فروق إحصائية بين البنين والبنات فى التحصيل وأن المجموعات التجريبية (بنين وبنات) والتي استخدمت طريقة خريطة المفاهيم أوضحت زيادة فى الميول نحو دراسة العلوم أكثر من المجموعات الضابطة والتي استخدمت الطريقة المعتادة وعدم وجود فروق إحصائية بين البنين والبنات فى الميل نحو دراسة العلوم ثم قدم البحث مجموعة من التوصيات المرتبط بنتائج البحث وكذا مجموعة من البحوث المقترحة.

Summary of Thesis

Objectives of the study: Recognizing the concept map as a teaching tool. Building a concept map for the second unit (stars & Planets) of science book. Knowing the effect of using the concept map on the achievement of scientific concepts. Knowing the effect of

using the concept map on students' tendency to learning science. Knowing the effect of sex on the students' achievement of scientific concepts. Knowing the effect of sex on the students' tendency towards scientific concepts. The study is limited to: The second unit (stars & Planets) of the science book. The study group includes two groups: The experimental group that includes two classes: one from the Malawi secondary school for boys (44) and the second is from Malawi secondary school for boys (44) and the second is from Malawi secondary school for girls (66). The researcher prepared the following of tools: A questionnaire to determine the scientific and linguistic formulation of concepts in the note book activities. Student's book. Teachers' guide. Achievement test in the second unit of science book for second year secondary student. A scale for tendency (prepared by foad Abu Hatab). Results of the study: There are statistically significant differences between the control and experimental groups in the post achievement test in favour of the experimental group. There are no statistically significant differences between boys and girls in achievement. There are statistically significant differences between the control and experimental groups in tendency to learning sciences. There are no statistically significant differences between boys and girls in tendency to learning science. Based on the results of the study, the researcher presented some recommendations and suggestions for further research.

مقدم الرسالة:	سماح حمدي أحمد عبد الرحمن
موضوع الرسالة:	أثر استخدام برنامج مقترح لتنمية مهارات صياغة الأسئلة لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي The Effect of Using a Suggested Programme to Develop Question Formation Skills Among Second Year Preparatory Stage Pupils
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ المصنف:	٢٠٠٢/٧/٢٨ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	د / منير فؤاد نظير د / فاطمة على عبد الحق

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات صياغة الأسئلة لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي . تعتبر الأسئلة واحدة من الأساليب الهامة في تنمية كفاءة الاتصال عند التلاميذ كما تعتبر جزء من العملية التعليمية وقد لاحظت الباحثة في المرحلة الإعدادية أن معظم التلاميذ غير قادرين على تكوين الأسئلة التي يوجهونها للمعلم أو التي يطرحونها على بعضهم البعض في المواقف التعليمية المختلفة وقد أجرت الباحثة دراسة تتكون من ٨٠ تلميذة من تلميذات الصف الإعدادي وقد تم تقسيمهن إلى مجموعتين مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة وقد تم تدريب المجموعة التجريبية على مهارات صياغة الأسئلة من خلال البرنامج المقترح بينما لم يتم تدريب المجموعة الضابطة على مثل هذه المهارات وقد جاءت نتائج الدراسة بان البرنامج قد أدى إلى تحسين مهارات صياغة الأسئلة لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي وكان له دور فعال في تحسين مستوى تلاميذ المجموعة التجريبية في تكوين المحادثات وصياغة الأسئلة في المواقف التعليمية المختلفة .

Summary of Thesis

The study aimed to identify the effectiveness of the programme to develop question formation skills among second year preparatory stage pupils. The researcher noticed that most pupils were unable to form questions to ask and answer in the real situations. Eighty female pupils of second year preparatory stage have been chosen as the subjects for the present study. They were divided into two groups: an experimental group and a control one. The experimental group was trained in the skills of question formation. The researcher prepared two different tools: a suggested programme to develop question formation skills and a question formation pre – post test. To answer the research questions and test its hypotheses the researcher used the “t” test and blake’s modified gain ratio. The following results were reached. The experimental group subjects showed high gains on a pre-post test comparison as well as high superiority over the control group on a post-test comparison. Thus in the light of these results the suggested programmes was found to be effective in developing some of the second year preparatory stage pupils question formation skills. The control group subjects did not show significant improvement in question formation skills. The suggested question formation programme had significant effect on developing the question formation skills of the second year preparatory stage pupils.

مقدم الرسالة:	أنور محمد محمود سيد
موضوع الرسالة:	تأثير برنامج مقترح في اللغة الإنجليزية على تنمية القراءة والكتابة واستخدام المصطلحات الخاصة لدى طلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات بجامعة الأزهر بأسبوط The Effect of a Suggested English Program on the Development of Reading Writing and Use of Special Terminology of the 3 rd Year Librarianship Department Students at Al-Azhar University, Assiut
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/٩/٢٩ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / كوثر إبراهيم محمد قطب د / فاطمة على عبد الحق

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى تأثير استخدام برنامج مقترح في اللغة الإنجليزية على تنمية القراءة والكتابة واستخدام المصطلحات الخاصة لطلاب الفرقة الثالثة بقسم المكتبات بجامعة الأزهر بأسبوط. وتكونت عينة الدراسة من خمسين طالبا تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وتم استخدام الأدوات التالية (من أعداد الباحث): (١) اختبار تشخيصي للتحقق من ضعف الطلاب في دراسة اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة (٢) استبيان للتحقق من احتياجات الطلاب لتعلم اللغة الإنجليزية ، (٣) مقابلة شخصية مع عشرة من المتخصصين في علم المكتبات للتحقق من احتياجات الطلاب لتعليم اللغة الإنجليزية ، (٤) برنامج مقترح في اللغة الإنجليزية للأغراض المكتبية ، (٥) اختبار قبلي - بعدي في القراءة والكتابة واستخدام المصطلحات الخاصة. وقد كشفت

نتائج الدراسة على أن البرنامج المقترح في اللغة الإنجليزية للأغراض المكتبية بالفرقة
الثالثة بجامعة الأزهر.

Summary of Thesis

The present study aimed at investigating the effect of using a suggested English program on the development of reading writing and use of special terminology of the 3rd year librarianship department students at Al-Azhar University Assiut. The sample of the study consisted of fifty male students who and used in this study: (1) a diagnostic test to identify students weaknesses in ESP, (2) a questionnaire for assessing students needs for learning English (3) a structured interview with ten specialists in library science to identify students needs of English (4) a program of English for library purposes "E.L.P" and (5) a pre – post test in reading writing and use of special terminology. The results of the study revealed that the suggested ELP program was effective on the development of reading writing and use of special terminology of the 3rd year librarianship department students at Al-Azhar University Assiut.

عبد الرحمن على حسين محمد	مقدم الرسالة:
فعالية استخدام طريقة التعليم التعاوني في تدريس القواعد النحوية على التحصيل والميول نحو دراستها لدى طلاب الصف الأول الثانوي	موضوع الرسالة:
The Effectiveness of Using the Cooperative Learning Method of Teaching the Grammar Rules on Achievement and the Interest Towards Studying it to the First Year Secondary Students	
كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس	الكلية والقسم:
٢٩ / ٩ / ٢٠٠٢ م «ماجستير»	تاريخ المقدم:
أ. د / أحمد محمد على رشوان	لجنة الإشراف:
د / عبد الوهاب هاشم سيد	
د / حسن عمران حسن	

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية طريقة التعليم التعاوني في تدريس القواعد النحوية على التحصيل والميول نحو دراستها لدى طلاب الصف الأول الثانوي ، وتكونت عينة الدراسة من (١٠٠) طالب وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين إحداهما ضابطة درست بالطريقة السائدة وبلغت (٥٠) طالبا وطالبة والأخرى تجريبية درست بطريق التعليم التعاوني وبلغت (٥٠) طالبا وطالبة وأعد الباحث مجموعة من الأدوات المستخدمة في الدراسة وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى (٠.٠١) بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار

التحصيل البعدي وبمقياس الميول البعدي لصالح المجموعة التجريبية، كما توصلت إلى أن الطلاب الضعاف أكثر إفادة من هذه الطريقة يليهم المتوسطون ثم المتفوقون .

Summary of Thesis

The study aimed at identifying the effectiveness of the cooperative leaning method in the teaching of the grammar rules on achievement and the interests towards studying it to the first year secondary students. The sample of the study consisted of (100) male and female students who were divided into two equal groups. The first was the control group that studied with the usual method and it was (50) male and female students. The other was the experimental group that studied with the cooperative leaning method and was (50) mal and females students. The researcher prepared a group of tools for the study. The results of the study proved that there are significant differences on the level of (.01) between the means of scores of the total of the degrees of the control and experimental group in the post achievement test and the post interest scale in favor of the experimental group. The study also proved that the weak students benefited more from this method then average then the excellent

مقدمة الرسالة:	جميلة تاجي أحمد سعيد
موضوع الرسالة:	تقويم كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي في الجمهورية اليمنية Evaluating the Islamic Education Textbook for the Third Grade of the Elementary Education Stage in the Yemen Republic
الكلية والقسم:	كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ المصم:	٢٠٠٢/١١/٢٤ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د / أحمد سيد محمد إبراهيم د / محمد علي رشوان د / عبد الوهاب هاشم

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التوصل إلى معايير يسترشد بها القائمون على إعداد الكتاب موضع الدراسة ومعرفة مدى توافر هذه المعايير في الكتاب موضع الدراسة واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واختبرت العينة بطريقة مقصود (٨١) معلما و(٢٤) موجهاً وموجهه وأهم نتائج الدراسة أن الجانب التربوي جاء في المرتبة الأولى يليه الجانب الفني ثم الجانب الأكاديمي وقد تم التوصل إلى تصور مفتوح لصحيح بعض عيوب الكتاب المقرر .

Summary of Thesis

This thesis aimed at reaching criteria that guide those who are reaching criteria that guide those who are responsible for preparing

the Islamic education textbook for the third grade of the elementary education on stage in the Yemen Republic, and also knowing to what extent these criteria are reflected in the book which is the subject of this research. The study came to many results, the most important of which are stated as follows. The educational aspect occupied the first rank according to its availability in the textbook, then comes the technical aspect and the academic aspect.



كلية التمريض

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير


بكلية التمريض جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢

درجة الماجستير			البيان
أجمالي	طالبة	طالب	
٢	٢	٠٠	إدارة التمريض
١	١	٠٠	التمريض الباطني والجراحة
٣	٣	٠٠	تمريض النساء والتوليد
١	١	٠٠	تمريض الأطفال
٢	٢	٠٠	تمريض نفسي وعقلي
٩	٩	٠٠	الإجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية التمريض جامعة أسيوط

من عام ٢٠٠٢



قسم

إدارة القريض

مقدم الرسالة:	فاطمة رشدي محمد
موضوع الرسالة:	<p>دراسة العلاقة بين الغياب والرضا الوظيفي بين الممرضات في مستشفى أسبوط الجامعي</p> <p>The Relationship Between Absenteeism and Job Satisfaction Among Nurses in Assist University Hospital</p>
الكلية والقسم:	كلية التمريض - قسم إدارة التمريض
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/٧/٢٨ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	<p>أ. د / مناء سليمان عبد الحميد كروش</p> <p>أ. د / محاسن إسماعيل عبد المجيد</p> <p>د / إحسان أحمد جابر</p>

ملخص الرسالة

أجريت الدراسة لاستكشاف العلاقة بين الغياب والرضا الوظيفي بين الممرضات اللاتي يعملن في أقسام (الباطنة العامة ، الأطفال ، النساء والتوليد ، أقسام الجراحة العامة) في مستشفى أسبوط الجامعي من خلال التعرف على أعداد الأيام الفعلية للغياب سنويا وتحديد معدل الغياب والتعرف على العوامل التي تؤدي إلى زيادة أو نقصان معدل الغياب بين الممرضات واستكشاف العوامل التي تؤثر على الرضا الوظيفي و أجريت الدراسة على ٢٤٩ ممرضة ومشرفة تمريض موزعات كالاتي: - ٢٢٨ ممرضة وممرض ، ٢١ مشرفة تمريض وأسفرت الرسالة على أن هناك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين الغياب والرضا الوظيفي وأن معدل الغياب كان عاليا بين أفراد الفريق التمريضي .

Summary of Thesis

between absenteeism and job satisfaction among nurses working in the following departments (General medical, pediatric, Gyneacological and obstetrics, and General surgical) in Assiut University Hospital through identify the actual number of days of absence during one year and determine the absence rate of nursing personal & identify the factors increasing or decreasing the rate of absenteeism among nurses and to explore factors which affect job satisfaction. The study was carried out on 249 staff and head nurses distributed as follows 228 staff nurses. And The purpose of the present study is studying the relationship 21 head nurses. The results of the study revealed that absenteeism have a significant negative correlation with job satisfaction and absence rate is higher among nursing personal.

مقدم الرسالة:	ناهد شوكت أبو المجد عبد العال
موضوع الرسالة:	دراسة العلاقة بين مكان العمل و حدوث الأخطاء الدوائية لدى مرضات مستشفى أسيوط الجامعي The Relationship Between Work Setting and the Occurrence of Medication Errors Among Nurses of Assiut University Hospital
الكلية والقسم:	كلية التمريض - قسم إدارة التمريض
تاريخ المنع:	٢٤ / ١١ / ٢٠٠٢ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د / حريصة محمد علي الشيمى د / إحسان أحمد جابر د / محمد حسام الدين حسن مغربى

ملخص الرسالة

استهدفت هذه الدراسة تحليل العلاقة بين مكان العمل و حدوث الأخطاء العلاجية وذلك من خلال تقدير مرحلة نقل العلاج الموصوف : مرحلة التخزين ، مرحلة التجهيز والإعطاء ، و مرحلة التوثيق وأجريت هذه الدراسة على (٢٠٠) ممرضة ممن يعملن في مستشفيات أسيوط الجامعية بكل أقسام الباطنة والجراحة العامة ، وكل أقسام العناية المركزية للباطنة والجراحة ولقد تم تجميع المعلومات من خلال قوائم مراجعة وقائمة ملاحظة .

وأظهرت نتائج الدراسة ما يلى: عدم وجود نظام تسجيل جيد ومحدد مثل عدم وجود تقرير إعطاء العلاج في كل وحدات الجراحة والباطنة العامة ، وأيضاً عدم وجود تقرير أخطاء العلاج في كل الوحدات المختارة للدراسة ، الأخطاء أثناء عملية تخزين

الدواء تتأثر بسنوات عمر وخبرة الممرضة وأيضا باختلاف مؤهلاتها الدراسية في حين أنها كانت لا تتأثر باختلاف وظيفة الممرضة.

وقد أوصت الدراسة بما يلي: — وضع نظام توجيه للحد من الأخطاء في مرحلة إعطاء الدواء ، وتوفير تقارير تسجيل الأخطاء الدوائية في جميع وحدات المستشفى ، وأيضا السجلات اللازمة لتسجيل عملية إعطاء الأدوية وكما يوصى بإقرار مناخ غير عقابي للإبلاغ عن الأخطاء والذي يدعم عملية المشاركة بالمعلومات عن مسببات الأخطاء وإستراتيجية منعها، وأيضا توفير نظام توزيع العلاج بالجرعة لكل وحدة واستخدام نظام الحاسب الآلى فى وصف الدواء بنظام داخلى ، وتشجيع استخدام الكمبيوتر أو نظام تسجيل عملية إعطاء الدواء إلكترونيا .

Summary of Thesis

The present study aimed at investigating the relationship between the work site and the occurrence of medication errors through assessment of transcription phase of the prescribed treatment, the storage phase the preparation and administration phase, and the documentation phase. The study was conducted on (200) nurses working at Assiut University Hospital at all general medical and surgical units and medical and surgical intensive care units. Data collection was done through chart review and observation. The results indicated the absence of a well-defined documentation system. Medication administration and the medication errors records at all general medical and surgical units. Poor nurses skills in the

medication administration process. The errors in storage process of drugs had a statistically significant relationship with the nurses' age, years of experience. And educational qualifications. The present study recommended that: adopt systems-oriented approach to medication errors reduction promote the use of medication errors records, and medication administration records, provide a non-punitive atmosphere for reporting of errors, and apply on-site training and educational programs for proper care and strategies for good handling and storing of drugs. Future perspectives include the implementation of computerized systems and medication administration records.

قسم

التعريض الباطني

والجراحة

مقدم الرسالة:	جيهان رفعت محمد مصطفى
موضوع الرسالة:	تقييم كيفية الحالة الصحية للمسنين المصريين " Assessment of the Quality of Health Status of Egyptian Elderly
الكلية والقسم:	كلية التمريض - قسم التمريض الباطنى والجراحي
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/١١/٢٤م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / ثناء محمد أحمد علاء الدين أ.د / إجلال محمد شوقي حامد د / سوسن محمد أحمد علاء الدين

ملخص الرسالة

من المشاكل التي تواجه التمريض هذه الأيام هي مقابلة التعقيدات المتنامية في احتياجات رعاية المسن، وتهدف الدراسة الحالية إلى تطوير أداة التقييم في حقل التمريض وتقوم كذلك بمهمة تحديد الاحتياجات الضرورية والمشاكل العامة للمسن وكذلك تقوم بتقييم نوعية حياتهم الصحية وكذلك تقييم كيفية إدراك المسنين المصريين لحالتهم الصحية ومستوى رضاهم عن حياتهم. وأجريت هذه الدراسة من خلال مجموعتين مختلفتين في الواقع، الأولى بمستشفى المنيا الجامعي بعيادة الباطنة والثاني بنادي المسنين بمدينة المنيا. والعينة التي أخضعت للدراسة تتكون من ١٠٠ مسن إذ يبلغ أعمارهم الخمسة والستين فما فوق. وجمعت المعلومات بواسطة ثلاث أدوات طورتها الباحثة بعد فحص متقن في مراجع وحقول الاختصاص تحتوى الأداء الأولى على ورقة تدرس الحالة الصحية لأفراد العينة و الأداء الثانية وهي تقييم الوظائف أو الحالة الجسمانية والتي عادتاً تتمثل في إدراك المسن لحالته الصحية و الأداء الثالثة وتمثل مجموعة أسئلة عن مدى رضى المسن عن حياته. ونتيجة الدراسة

أوضحت أن هناك علاقة طردية بين أداة المسن للنشاطات اليومية العادية وإدراكه لصحته، بينما هناك علاقة عكسية بين أداة المسن للنشاطات اليومية العادية وحالة رضاه عن حياته.

Summary of Thesis

The challenge of nursing today in to meet the growing complexity of the care needs of the aging. This study aims to develop a comprehensive nursing assessment tool, to determine the major needs and common problems of elderly and to identify the different patterns of their functioning. Also to assess how the Egyptian elderly perceive their health status and their life satisfaction level. The study was conducted in two settings. The first setting (1) is El-Minia Hospital in medical out patient clinic and the second setting (2) is El-Minia geriatric club. The study sample consisted of 100 elderly persons, who were 65 years or more. The first tool was a physical health status assessment sheet, second is the health functioning and the third tool is life satisfaction questionnaire . The results indicated that there were positive relationship between functional health status and perceived health status while there were negative relation between functional health status and life satisfaction.

قسم

تحرير النساء

والجوارح

مقدم الرسالة:	انتصار محمود محمد مخلوف
موضوع الرسالة:	دراسة عشوائية لمدى تأثير المشورة ما قبل وبعد إجراء المناظير الجراحية والتشخيصية Random Study on the Effect of Pre-operative Counseling on Patient, Before and After Endoscopic Operations
الكلية والقسم:	كلية التمريض - قسم تمريض النساء والتوليد
تاريخ المصمم:	٢٠٠٢/٧/٢٨ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / محمد علاء الدين محمود يوسف أ.د / سناء على نور الدين د / سحر نجيب محمد

ملخص الرسالة

اشتملت العينة على ١٥٠ مريضة تم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين وإعطاء المشورة إلى ٧٥ مريض في مجموعة الدراسة بينما تم تقديم الرعاية المعتادة بالمستشفى للمجموعة الضابطة وقامت الباحثة بعمل مقابلة مع جميع المريضات لقياس مستوى التوتر قبل وبعد العملية وشدة الألم ومدى الاحتياج للمسكنات كذلك قامت بقياس زمن العملية وملاحظة أى شكوى أو مضاعفات وأوضحت الدراسة ان للمشورة تأثير على مستوى القلق قبل وبعد العملية وعلى تقليل مستوى الألم.

Summary of Thesis

Random study on the effect of pre-operative counseling on patients before and after Endoscopic operations. The total sample consisted of one hundred and fifty women. The sample was divided into two groups, the study group 75 women received pre-operative counseling by the investigator, and the control 75 women received routine hospital care. The results of study have indicated that pre-operative counseling affected the level of anxiety and pain.

مقدم الرسالة:	سحر أحمد على أحمد
موضوع الرسالة:	دراسة الأعراض المتزامنة التي تسبق حدوث الدورة الشهرية بين طالبات الجامعة بأسسيوط A Study of Premenstrual Syndrome Among Assiut University Students
الكلية والقسم:	كلية التمريض - قسم تمريض النساء والتوليد
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٧/٢٨ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د. / سناء على نور الدين د. / صفوت عبد الرزاق محمد د. / سيف نجيب محمد

ملخص الرسالة:

الأعراض المتزامنة للدورة الشهرية ، لفظ يطلق على مجموعة من الأعراض والعلامات الجسدية والنفسية التي تحدث في النصف الأخير من الدورة الشهرية وتزول بمجرد الطمث وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة وقياس معدل انتشار هذه الأعراض بين طالبات الجامعة بأسسيوط وأيضاً تحديد العلاقة بين هذه الظاهرة وعدة عوامل مختلفة مثل السن ، التعليم ٠٠٠ الخ . ولقد أجريت هذا البحث على ٨٠٠ طالبة بخمس كليات مختلفة تتراوح أعمارهن بين ١٨ - ٢٤ سنة ، ولقد وجد أن ٧٤ % من الطالبات يعانين من هذه الأعراض وأيضاً وجدت علاقة بين الطالبات اللاتي يتناولن مشروبات دافئة ، ومزاولة الأنشطة اليومية وأخذ حمام دافئ قبل الدورة وبين حدوث هذه الأعراض ومن أهم التوصيات: عقد الندوات العلمية وتصميم بعض البرامج التي يتم التخطيط لها لتشجيع العادات الصحية السليمة وللتغلب على هذه الأعراض .

Summary of Thesis

Premenstrual Syndrome is a cyclical disorder that involves emotional and physical symptoms during the luteal phase of the menstrual cycle . The aim of this study is to assess prevalence of premenstrual syndrome among students in Assiut University and to assess the practice of relief measures taken by students regarding the premenstrual syndrome, The sample were included 800 students, from 18-24 years of age with regular cycle. The main finding of this study were: the prevalence of PMS was detected in 74% of the students, There is a highly significance relationship between consuming hot drinks, daily activities and the prevalence of PM S.

مقدم الرسالة:	هناء رشاد محمود مطاوع
موضوع الرسالة:	تأثير أخذ مسحة من عنق الرحم للاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم والعناية التمريضية الوقائية للسيدات اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية (بروجيسترون) * Effect of Pap Smear Screening Test on Early Detection of Cancer Cervix and Short Term Nursing Intervention Among Women Using Progesterone -Only Contraceptives
الكلية والقسم:	كلية التمريض - قسم تمريض النساء والتوليد
تاريخ المسم:	٢٤ / ١١ / ٢٠٠٢م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	د / شادية عبد القادر حسن د / عاطف محمد مصطفى درويش د/ شكرية عدلسى لبيب

ملخص الرسالة

تهدف هذه الدراسة إلى تأثير أخذ مسحة من عنق الرحم للاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم مع إعطاء العناية التمريضية للسيدات اللاتي تستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية للمدة من ثلاث سنوات فأكثر ، وقد تم تطبيق هذه الدراسة في عيادة تنظيم الأسرة بمستشفى أسبوط الجامعي ، أنه من الممكن أن يشفى سرطان عنق الرحم إذا تم اكتشافه مبكراً ، وهناك وسائل كثيرة لاكتشاف سرطان عنق الرحم مبكراً ومن أهم هذه الوسائل والتي تعرضنا لها في دراستنا هذه هو اختبار بابا نيكولاو واستخدام المنظار لدراسة أنسجة عنق الرحم ، وقد وجد أن أخذ مسحة من عنق الرحم ودراستها بالمعمل يساعدنا في اكتشاف المراحل الأولى من السرطان وقد وجد أيضاً أن معدل الشفاء مع الاكتشاف المبكر يصل إلى ٩٥% وكانت عينة الدراسة ٣٢٥ سيدة وكان لكل

سيدة شريحتان مختلفتان لأخذ المسحة ، وكانت أفضل نتيجة هي التي أخذت من داخل عنق الرحم حيث سجلت النسبة ١٩% ، و١٧% على التوالي ومن هذه الدراسة أمكن استخلاص أنه توجد عوامل مساعدة بجانب الوسيلة تساعد على حدوث الدرجات الأولى للمرض ومنها: عدم الاهتمام والمتابعة قبل وبعد الوسيلة ، الزواج المبكر وكذلك الإنجاب المبكر ، التعرض الفارط للسجائر والأشعة . وتوصي الدراسة بما يلي: - يوصى بعمل دورات تدريبية لخريجات التمريض على كيفية عمل المسحة والتعامل معها، وتزويدهن كذلك بمزيد من المعلومات الخاصة بسرطان عنق الرحم، يقترح تيسير الوسائل التي تفيد في مجال هذه المسحة سواء بإنشاء عيادات مخصصة لهذا الغرض أو تخصيص وحدات لذلك .

Summary of thesis

This study was designed to assess the effect of Pap smear test on the early detection of cervical among women using hormonal contraceptive methods for three years or more. The sample was composed of 325 women. The frequency of CIN was 19% Vs 17.6% in study and control groups respectively; the majority of them were grade 1. There was no statistically significant difference between hormonal and non-hormonal contraceptive methods regarding the incidence of CIN . The positively rate for CIN was higher by the endocervical brush than the ectocervical Ayer's technique 19% and 17.6% Vs 12% and 7.5% in the study and control groups respectively. The recommendations of this study were: Pap smearing Service should be extended to cover the females in the child bearing period .

this requires proper supply of the needed tools, experienced nurses, cytologists and clopscopists. Regular training of nurses about the Pap smear test to give correct information to women in mandatory. Women must carry out Pap smear test before and after using any method of contraception. Emphasizing premarital counseling.

قسم

تفريض الأطفال

مقدم الرسالة:	ناهد ثابت محمد حسن
موضوع الرسالة:	معتقدات وممارسات الأمهات في تغذية أطفالهن أثناء الإسهال في مستشفى أسيوط الجامعي
	Maternal Beliefs and Practices in Feeding Infants and Young Children During Diarrhea in Assiut University Hospital
الكلية والقسم:	كلية التمريض - قسم تمريض الأطفال
تاريخ الترميم:	٢٠٠٢/١١/٢٤م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / نعمات محمد على يوسف د / فاطمة عبد الفتاح على د / فتحية نكسي محمد

ملخص الرسالة

تم إجراء دراسة وصفية على ٣٠٠ طفل مصابين بعدوى الإسهال في المستشفى الجامعي بأسيوط ، وذلك من أجل التعرف على معتقدات وممارسات الأمهات في تغذية أطفالهن أثناء الإسهال ، وقد تم تصميم استمارة استبيان خاصة للدراسة الحالية لجمع المعلومات التي تتصل مباشرة بمعتقدات وممارسات الأمهات ، وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن النتائج التالية أن متوسط عمر الأمهات (٧، ٢٦ + ٥، ٥) سنة و (٦٧، ٣ %) كن أميات لا يجدن القراءة والكتابة (٧٤ %) من الأمهات كن من المناطق الريفية. أن الغالبية العظمى من الأمهات ليس لديهن أى معلومات عن الإسهال أو الجفاف من حيث الأسباب أو طرق العدوى أو أعراض الجفاف ، وضعف وقلة المهارات العملية لدى الغالبية العظمى من الأمهات في كيفية حماية أطفالهن ضد مرض الإسهال والعناية بجلد

الطفل وكيفية منع انتشار العدوى وتحضير محلول معالجة الجفاف ، وكلما ازداد سن وخبرة الأمهات ، كلما ازداد مستوى المعلومات والمهارات للعناية بأطفالهن.

Summary of Thesis

A descriptive study on 300 children with diarrheal infections conducted at Assist University Hospital in order to identify maternal beliefs and practices in feeding infants and young children during diarrhea. The study was carried out through using a questionnaire sheet which was designed specifically for this study to collect data related to maternal beliefs and practices. The main results of the study were as follows: The mean age for mothers was $26,7 \pm 5,5$ years. (67,3%) were illiterate. (74%) from rural areas. The majority of studied mothers did not know the cause behind illness which related to feeding and weaning the cause which related to types of infection and did not know the mod of transmission of diarrhea. (40%) of studied mothers with children 6-12 months used Oral dehydration .Solution (ORS), (66,1%) of them were right in preparation of ORs and more than half of mother (56,1%) of the studied mothers added sugar to ORS. (27,3%) of the mothers did not know how to prevent the spread of infection. There were statistically significant relationships between mothers level of education and each of the use of ORS and the amount of fluids given during diarrhea.

قسم

تقریریں

وفاقی

مقدم الرسالة:	سحر محمد عبد الحميد
موضوع الرسالة:	دراسة الصورة النفسية والاجتماعية لمدمنى المخدرات * Assessment of Psychosocial Profile of Drug Addict Clients
الكلية والقسم:	كلية التمريض - قسم التمريض النفسى والعقلى
تاريخ المنسم:	٢٨/٧/٢٠٠٢م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / مارسيل نجيب ميخائيل أ.د / محمد أحمد عيسى هدهود د / شكرية عدلى لبيب

ملخص الرسالة

يهدف هذا البحث إلى دراسة الصورة النفسية والاجتماعية لمدمنى المخدرات لعدد ٥٠ مريض من مستشفى أسبوط الجامعى مع ٥٠ شخص من الأسوياء ، و معرفة النواحي النفسية والاجتماعية لمدمنى المخدرات لمعرفة الخصائص الشخصية لهؤلاء المدمنين ،

واتبعت الدراسة عدة طرق لجمع المعلومات لهؤلاء المرضى وهى أولا استمارة بيانات شخصية ومعلومات عن طبيعة العلاقات العائلية لهؤلاء المدمنين وثانيا: عدة اختبارات عن طبيعة الإدمان ونوعية المواد التى يتعاطونها واختبارات لمعرفة نوعية الشخصية وقد توصلت الدراسة إلى تميز هؤلاء المدمنين بصغر السن والاختفاض فى مستوى التعليم مع ارتفاع المستوى الاجتماعى لهؤلاء المدمنين وأيضا قد تميزوا بالأنيساطيه ومن العوامل المحفزة على الإدمان الأصدقاء وحب الفرفشة والقلق والاكتئاب ،

وأوصت الدراسة بالآتي: أولاً: برامج تطعيمية للشباب عن خطورة الإدمان
والمواد المخدرة وخاصة الحشيش والبانجو ، وثانياً: وجود الأسرة كجزء في البرنامج
العلاجي لهم حيث إنها ركيزة هامة في هذا العلاج ، ثالثاً شغل فراغ الشباب ومنهم في
السن الحرجة عن طريق الرياضة والأنشطة المنتجة .

Summary of Thesis

This study was carried out to assess the psychosocial profile of drug addicts and their personality traits. A sample of 50 drug addicts were selected from the psychiatric in patient unite of Assist University Hospital and 50- control group. The present study revealed that hospitalized drug dependants were characterized by a relatively young age, low educational level land high social level . Their family relationship were quarrelsome with overcritisim and overproduction. They started drug abuse at young age. The main motivations for abuse were peer influence, trial, and depression and the main desired effects were tranquility and happiness. The drug addicts were more extroverted than controls and had high scores anxiety and depression and low scores of phychoticisim and paranoid ideation.

أمانى عنتر محمد	مقدم الرسالة:
دراسة تأثير العمل على نوعية الحياة بين المرضى النفسيين Study of the Impact of Work on Quality of Life Among Psychiatric Patients	موضوع الرسالة:
كلية التمريض - قسم التمريض النفسى والعقلى	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/١١/٢٤م (ماجستير)	تاريخ المقدم:
أ.د / عنايات عبد الوهاب خليل أ.د / محمد أحمد عيسى د / شكرية عدلى لبيب	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تعد مشكلة المرضى النفسيين الذين لا يعملون واحدة من أكبر المشاكل التي تؤثر بشدة على نوعية ونمط الحياة لديهم لذا فهي تؤثر على كل من الفرد بوجه خاص والمجتمع بوجه عام ، وعليه فقد استهدف هذا البحث دراسة وتقييم العمل على النواحي المختلفة لنوعية الحياة ومقارنة المرضى العاملين بالمرضى غير العاملين فى ضوء العلاقة بين العوامل المختلفة ومكونات مقياس نوعية الحياة، وقد أجرى هذا البحث على مائتين من المرضى النفسيين بالعيادات الخارجية بمستشفى أسبوط الجامعى ، أظهرت نتائج هذا البحث وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين نوعية الحياة للمرضى العاملين ونوعية الحياة للمرضى غير العاملين بالنسبة لمختلف العوامل التى تمت دراستها فى هذه الدراسة وأن المرضى العاملين يتمتعون بمستوى مرتفع لنوعية الحياة .

Summary of Thesis

Unemployed persons with psychiatric disabilities are a major problem with great clinical relevance, this presents significant problem for individuals and society. So this study is carried out to study the work condition and demographic characteristics and assess the impact of work on QOL among employed & unemployed psychotic patients. The sample was conducted in psychiatric out patients clinic of Assist University Hospital and included 200 patients from both sexes with age from 25-55 years . And the main result of this study indicates that a large number of employed patients had high level of QOL . While more than half of unemployed patients had low level of QOL and the difference between the employed & unemployed patients was statistically significant as regard to the impact of most variables on QOL Scale.



12
كلية

التربية الرياضية


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠٢

البيان	درجة الماجستير		
	طالب	طالبة	أجمالي
المواد الصحية	١	٠٠	١
أصول التربية الرياضية والترويج	١	٠٠	١
المناهج وطرق التدريس والتدريب	١	٠٠	١
الألعاب	٥	٠٠	٥
مسابقات الميدان والمضمار	٣	٠٠	٣
المنازلات الرياضية والمائية	٣	٠٠	٣
التمرينات والجمباز	٣	٠٠	٣
الإجمالي	١٧	٠٠	١٧

بيان بعدد الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠٢



قسم

العلوم الصحية

مقدم الرسالة:	عبد الناصر عباس أحمد أحمد
موضوع الرسالة:	الانحرافات القوامية وعلاقتها بالمستوى الاجتماعي - الاقتصاد لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة أسيوط Body Before Mites and Their Relation with Social Economic Standard of Pupils of Basic Education Stage in Assiut
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم المواد الصحية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٥/٢٦ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ صفية عبد الرحمن أبو عوف أ.د/ عمر شكري عمر

ملخص الرسالة

من خلال هذه الدراسة حاول الباحث التعرف على الانحرافات القوامية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط ، والتعرف على نوع العلاقة ، إن وجدت بينها وبين المستوى الاجتماعي الاقتصادي للتلاميذ. فالقوام الجيد يزيد من شعور الإنسان بالثقة بالنفس والحماس والمبادرة بالعمل بينما على النقيض من ذلك يكون التزام الضعيف فيشعر الفرد بقلّة الثقة بالنفس والإكتئاب ويؤثر على الجانب النفسي والاجتماعي للفرد. يهدف البحث إلى التعرف على: انتشار الانحرافات القوامية بين تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساس بالمدارس الحكومية والخاصة بمحافظة أسيوط يفرض التعرف على: ١- العلاقة بين انتشار الانحرافات القوامية والمستوى الاجتماعي - الاقتصادي. ٢- درجة الإجابة بالانحرافات القوامية في كل من المدارس الحكومية والخاصة. ٣- التعرف على الانحرافات القوامية الأكثر شيوعاً في المستويات الاجتماعية - الاقتصادية الثلاث (المرتفع، المتوسط، المنخفض). فروض البحث: ١- توجد علاقة سالبة بين معدل

انتشار الانحرافات القوامية والمستوى الاجتماعي _الاقتصادي للتلاميذ. ٢- يزداد معدل الإجابة بالانحرافات القوامية لدى تلاميذ المدارس الحكومية بينها وبين تلاميذ المدارس الخاصة. ٣- تباين انتشار الانحرافات القوامية بين المستويات الاجتماعية _ الاقتصادية المختلفة. تم تطبيق البحث على عينة بلغت ٧٥٩ تلميذا بالمدارس الحكومية والخاصة بأسبوط. أظهرت نتائج البحث ارتفاع نسبة الإجابة بين تلاميذ المدارس الحكومية والمستوى الاجتماعي _الاقتصادي المتوسط والمنخفض عن المستوى المرتفع فيما عدا تقطع القدمين.

Summary of Thesis

The researcher noticed the effect of economic – social standard of the family on the pupil; the pupil of the low standard seems to have signs of deprivation, bad general appearance, and to the contrary was the pupil of high economic – social standard. The research aims identifying the spread of body deformities among the pupil of second period of basic education in Government and private schools in Assiut, aiming to identify: The relationship between the spread of body of deformities and the economic – social standard, the density of injury of body deformities in both Government and private schools, identifying body deformities most common in the three economic social standards, low average and high.

Assumptions of Research:

- 1- There is a negative relationship between rate of spreading body deformities and the economic – social standard of pupils.
- 2- The rate of injury of physical deformities increases in the pupils of government schools more than the pupils of private schools.
- 3- The spread of body deformities varies among the different economic – social standards

قسم

اصول الشريعة

الرياضية والقروية

مقدم الرسالة:	محمد عبد العظيم محمدـــــــــــــــود
موضوع الرسالة:	تأثير برنامج ترويح رياضي على الأعراض النفسية والجسمية لمرضى الاكتئاب النفسي The Effect of Sportive Recreation Program on the Psychological and Physical Characteristic of the Sack of the Psychological Depression
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم أصول التربية الرياضية والترويح
تاريخ المضم:	٢٠٠٢/٦/٣٠ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د. محمد أحمد عيسى هدهود أ.د. جمال محمد علي يوسف د. عادل حسن سيد أحمــــــــــــد

ملخص الرسالة

أصبحت الأنشطة الترويحية في العصر الحالي تدخل في إطار نسيج النظم الاجتماعية التي يتألف منها المجتمع ، كما بدأ الاهتمام العالمي بحركتها لمواجهة الزيادة المتنامية في الإقبال على ممارسة أنشطته المختلفة ، ويعتبر الترويح من العوامل الهامة بالصحة النفسية والحفاظ عليها ، كما انتشرت الأنشطة الترويحية على نطاق واسع في المصحات النفسية والعقلية واصبح الترويح فرعاً في فن العلاج بالمستشفيات النفسية ويهدف البحث إلى تصميم برنامج ترويح رياضي للتعرف على تأثيره على الأعراض النفسية والجسمية لمرضى الاكتئاب النفسي ، استخدم الباحث المنهج التجريبي ذات المجموعتين التجريبية والضابطة واستخدم القياس القبلي والبعدي للمجموعتين وكما اختيرت العينة من مرضى الاكتئاب النفسي بالمستشفى الجامعي بمحافظة أسيوط على عينة قوامها (٢٠) مريضاً من الذكور أعمار (٤٠/١٨) سنة واستخدم في أدوات جمع البيانات مقياس الاكتئاب : مقياس ايزنك للشخصية ،

مقياس تقرير الشخصية ، فوجد فروقا دالة إحصائية بين متوسطى القياس القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة لصالح القياس البعدى في متغيرات البحث لدى العينة * ووجد فروق دالة إحصائية بين متوسطى القياس القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى في متغيرات البحث لمدى العينة ، وأوصى الباحث باهتمام الدولة بتكوين جمعيات للترويج العلاجى ، وإن تثبت وزارة الصحة مع وزارة الشباب والرياضة للبرنامج المقترح لتطبيقه داخل المستشفيات والمصحات النفسية .

Summary of Thesis

At the present time, the procreative activities has received a universal concern in the social systems which the society consists of, with its movement to face the increased needs towards practicing its variable activities. Recreative activities are becoming an integral part of psychotherapy in psychiatric hospitals. This research aims at designing a sportive recreational program to determine, the therapeutic impact of this suggested program on the physical and psychiatric symptoms of major depression. Sample of the research, the study was conducted at the department of psychiatry at Assiut University Hospitals of (20) male patients with major depression, their ages ranged between 18-40 years. The researcher used statistical measures, there were statistically significant difference between the pre- and post-program measures of depression, the suggested sportive recreation program should be included in the management program for patients with major depression in psychiatric hospitals as a part of non-pharmacological treatment.

قسم

المناهج وطرق

التدريس

والتهريب

أبو بكر محمد محمد مرسى	مقدم الرسالة:
* أثر استخدام أسلوب تحليل المهمة في تعليم بعض مهارات كرة السلة لطلاب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية - جامعة أسيوط The Effect of Using the Task Analysis Technique on Teaching some Basketball Skills to Assiut University Faculty of Physical Education Second Year Students	موضوع الرسالة:
كلية التربية الرياضية - قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٣/٣ « ماجستير »	تاريخ المنح:
أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم أ.د/ طارق محمد محمد عبد العزيز د/ عادل حسني السيد	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

استهدف البحث التعرف على أثر استخدام أسلوب تحليل المهمة في تعليم مهارات المحاور والتصويب السليمة لطلاب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية: ١- ما صورة الوحدات التعليمية المقترحة للتعليم باستخدام أسلوب تحليل المهمة لمهارتي المحاور والتصويب السليمة لطلاب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية - جامعة أسيوط ؟ ٢- ما أثر استخدام أسلوب تحليل المهمة في تعليم مهارة المحاور لطلاب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية - جامعة أسيوط ؟ ٣- ما أثر استخدام أسلوب تحليل المهمة في تعليم مهارة التصويب السليمة لطلاب الفرقة الثانية - بكلية التربية الرياضية - جامعة أسيوط ؟ استخدم الباحث المنهج التجريبي وتم إعداد أدوات البحث في ضوء الخطوات المنهجية المناسبة.

ملخص النتائج: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات الطلاب مجموعتي البحث التجريبية - الضابطة في الاختبار المهاري البعدي عند مستوى ٠,٠١. لصالح المجموعة التجريبية. وهذا يشير إلى أن استخدام أسلوب تحليل المهمة في تدريس وحدتي البحث حقق أثراً واضحاً في مستوى تعلم طلاب المجموعة التجريبية لمهارتي المحاوره والتصويب السليمة: التوصيات: ١- استخدام وحدتي البحث لتعليم مهارتي المحاوره والتصويب السليمة لطلاب كليات التربية الرياضية ، واللاعبين المبتدئين بالأندية المختلفة. ٢- استخدام أسلوب تحليل المهمة في تدريس وتعليم المهارات الرياضية المركبة والتي تتطلب بالضرورة تحليلها إلى مهام فرعية عند بدء تعليمها. ٣- تعريف المعلم بالأسس التي يجب مراعاتها عند استخدامه لأسلوب تحليل المهمة في التدريس. ٤- إعداد دليل للمعلم يتضمن كيفية استخدام أسلوب تحليل المهمة في تدريس مقرر كرة السلة. ٥- استخدام أسلوب تحليل المهمة في تدريس المفاهيم الرياضية الخاصة بالمناهج عن طريق تحليل محتواها.

Summary of Thesis

Aim of the study: the current study aims at identifying the effect of using of task analysis technique on teaching the skills of lay-up shot and dribbling to the faculty of physical education second year student through answering the following questions: what is the prospectus of the suggested instructional units using the task analysis technique for the skills of lay-up skills and dribbling for the faculty of physical education second year students? what is the effect of using the task analysis technique in teaching the skill of dribbling for the

faculty of physical education second year students ? what is the effect of using the task analysis technique in teaching the skill of lay-up shot for the faculty of physical education second year students ? Summary of results: There are statistically significant differences at 0.01 between the mean scores of the experimental and the control groups in the skill test in favor of the experimental group. This refers that using the task analysis technique in teaching the two units of the study yielded a significant effect in the level of the experimental group students for the two skills of lay-up shot and dribbling. Recommendations: 1- using the two units of the study to teach skills of the lay-up shot and dribbling for the faculties of physical education students and the beginners in different clubs. 2- using the task analysis technique in teaching the complex sports skills which should be analyzed to sub-skills when being taught for the first.

قسم الانساب

طارق محمد جابر	مقدم الرسالة:
تأثير برنامج تدريبي للأداء المهاري المركب على فاعلية بعض المبادئ الخططية الهجومية للناشئين كرة القدم The Effect of a Training Programme of Combined Skilful Performance on the Efficiency of Some Attacking Tactical Principles for Soccer Junior	موضوع الرسالة:
كلية التربية الرياضية - قسم الألعاب	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٦/٣٠ « ماجستير »	تاريخ المنع:
د/ حسن السيد أبو عبيدة د/ محمد إبراهيم محمود سلطان د/ محمد فاروق إبراهيم	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

يعد امتلاك اللاعب لأشكال متنوعة من الأداء المهاري المركب بما يشابه متطلبات المباراة تتيح للاعب اختيار أفضل هذه الأشكال في المواقف التي تتطلبها بسهولة وإتقان. ويعتبر الاداء المهاري المركب هو وسائل تنفيذ خطط اللعب واللاعب الذي يجيد الاداء المهارى المركب يستطيع تنفيذ الخطط المطلوبة منه فى المباراة بدقة وسهولة ؛ وبذلك يستطيع تركيز كل تفكيره على الخطط المطلوب منه تنفيذه ، وحيث أن الاداء المهاري المركب هو وسائل تنفيذ خطط اللعب ويجب أن يكون الناشئين قد تدربوا عليها فى ظروف تشبه ما يحدث فى المباراة. فقد لاحظ الباحث قلة الاهتمام والعناية بالتدريب على الاداء المهارى المركب من قبل المدربين بالرغم من أن الناشئ قد يؤدى المهارة بصورة منفردة بدقة الا أنه قد يكون بطيئا فى ادائها مركبة مع مهارة اخرى وهذا ما يحدث داخل الملعب ، كذلك عدم الربط بين الاداء المهارى المركب والمبادئ

الخطية الهجومية. واستخدم الباحث المنهج التجريبي للمجموعة الواحدة بالمقياس القبلي والبعدي على عينة عمدية من ناشئ نادي ديروط الرياضي تحت ١٥ سنة وعددهم ١٨ ناشئ. وكانت أهم النتائج وجود فروق ذات دلالة احصائية بين القياسات الاربع في الاختبارات المهارية قيد البحث في الزمن والدقة للاعب الفريق ككل. لا توجد فروق دالة احصائية بين القياسات الاربع في المبادئ الخطية الهجومية المرتبطة للاعب الخطوط الثلاثة (دفاع - وسط - هجوم).

Summary of Thesis

The players acquisition of different shapes of composite skillful performance to what resemble the match requires made it easy to the player in cliposing the best of these tapes in the situations that would be required easily and accurately. The researcher notice the littleness of concern and careness of excercising on the composite skillful performance from the trainer through the young cumdo the skill in solid way exactly but he is slow. In performing it in compound way with another skill it is that what happened in the playground and also the disconnectance between the composite skillful performance and the offensive plying principles. This is what the researcher aimed to through this study and the utilization of it on the way of what would be resulted in this study.

مقدم الرسالة:	محمود ابراهيم أحمد بغدادي
موضوع الرسالة:	"المشكلات التي تحول دون استمرار أندية الصعيد لكرة القدم في مسابقة الدوري العام"
	Problems Which Don't Allow the Continuity of the Football Uppler Egypt Clubs in the General Competition
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم الألعاب
تاريخ الملم:	٢٠٠٢/٦/٣٠ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ أشرف محمد علي جابر د/ كمال سليمان حسن د/ محمد ابراهيم محمود سلطان

ملخص الرسالة

تهدف هذه الدراسة أساسا تحديد المشكلات التي تحول دون صعود واستمرار أندية الصعيد لكرة القدم في مسابقة الدوري العام القسم " أ " . في ضوء أهداف البحث وفي حدود العينة والادوات والاجراءات التي اتبعها الباحث وما توصل اليه من نتائج يمكن استخلاص ما يلي: ١- يواجه القادة الرياضيين بأندية الصعيد بكرة القدم قيد البحث العديد من المشكلات الحادة والتي تتعلق بالمحاور المختارة. فقد جاءت الامكانات في المركز الأول يليها المدربين ثم اللاعبين ثم الادارة وأخيرا النواحي الصحية ، ٢- يواجه اللاعبين بأندية الصعيد لكرة القدم قيد البحث العديد من المشكلات الحادة التي تتعلق بالمحاور المختارة فقد جاءت مشكلات الادارة في المركز الاول تليها الامكانات ثم اللاعبين ثم النواحي الصحية وأخيرا المدربين ، ٣- يواجه القادة الرياضيين بنادي أسوان العديد من المشكلات الحادة التي تتعلق بالامكانات بينما يواجه لاعبي نادي

أسوان العديد من المشكلات التي تتعلق بالامكانيات واللاعبين حيث كانت هذه المشكلات أكثر يسرا لدى القادة الرياضيين واللاعبين بنادي كيم ، ٤- أكثر أندية محافظة قنا تعرضا للمشكلات التي تتعلق بالمحاور المختارة هو نادي السلام باسنا (قادة - لاعبين) بينما كان نادي الامونيوم بنجع حمادي هو أقل الأندية تعرضا للمشكلات التي تتعلق بالمحاور المختلفة (قادة - لاعبين) ، ٥- أكثر أندية محافظة سوهاج تعرضا للمشكلات (قادة - لاعبين) هو نادي سوهاج بينما جاء نادي السكة الحديد في الترتيب الأخير كأقل نادي من أندية محافظة سوهاج تعرضا للمشكلات التي تتعلق بالمحاور المختارة (قادة - لاعبين) ، ٦- يواجه القادة الرياضيين بمركز شباب مغاغة العديد من المشكلات الحادة ، ٧- أكثر محافظات الصعيد تعرضا للمشكلات المتعلقة بالمحاور المختارة هم محافظات الفيوم - أسيوط - بني سويف ، ٨- جاءت محافظة الفيوم في المركز الأول من حيث تعرضها للمشكلات تليها محافظة أسيوط ثم محافظة بني سويف ثم سوهاج ثم المنيا ثم قنا ثم أسوان وأخيرا البحر الأحمر .

Summary of Thesis

In the light of research goals and in the limitations of sample tools and procedures which the researcher follow it, we can take this points. 1- The leaders of the Upper Egypt clubs of football controlling with a many acute problems which referees to the chosen axis. The first problem is the atireals equipment, the second is the trainers then the players, the administration, at the last the sanitary faces. 2- The players of the Upper Egypt clubs of football controlling with a many acute problems which refers to the chosen axis the first problem; is

the materials equipment. The sanitary faces at the last trainers. 3- The most teams in Quna which expouse to problems which related to the chosen axis was El-Salam team in Essna (leaders-players) while Al-Aluminum team in najhamdia was the fewest team which exposing to the problems which related the difference axis (leaders – players). 4- The most team in Sohag exposed to troubles which related to the chosen axis. 5- The leaders in Beni Sweef team is confused with many acute problems which have a relationship with the players and their health field. While these problems were more easier to El-Wasta health field. 6- The teams in Upper Egypt of football (Second section) was getting trouble more than (first – section) (Players – leaders). 7- The most governorates exposed problems were (Al-Fayoum, Assiut, Beni-Sweef). 8- The governorates of El-Fayoum coming in the first of the most conflicting after this was Assiut, Beni Sweef, Sohag, Al-Menia, Quna, Aswan, Al-Bhar El-Ahmar (Red sea).

مقدم الرسالة:	عادل كمال عبد الوهاب
موضوع الرسالة:	قياس مستوى التحصيل المعرفي لمدربي كرة اليد The Measurement of Cognitives Achievement Level About the Hand-Ball Trainers
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم الألعاب
تاريخ المصم:	٢٠٠٢/٧/٢٨ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ مدحت شوقي طوس أ.م.د/ كمال سليمان حسن

ملخص الرسالة

هذه الرسالة محاولة لتصميم مقياس معرفي لقياس مستوى التحصيل المعرفي لمدربي الفئة الثانية والثالثة بالإتحاد المصري لكرة اليد وإيجاد الفروق بينهما وكان عددهم ١٢٨ مدرباً بنسبة ٧٥% من إجمالي المجتمع الأصلي وهو ١٧١ مدرب ، وقد تم التوصل لبناء المقياس وتصميمه من خلال (عشرة محاور) وذلك بمعاملات صدق وثبات عالية كما كان عدد المفردات للمقاس (١٠٠) مفردة وزمن الإجابة (٩٨/دقيقة) ودرجته (١٠٠/درجة) ، كما تم استخدام سبعة طرق للأسئلة والإجابة عليها ، وتم التطبيق على العينة الأساسية لقياس المستوى وإيجاد الفروق بين الفئة الثانية والثالثة وكانت النتائج كالتالي: ١- حصول مدربي كرة اليد للفئة الثانية على مستوى جيد في محاور (الإعداد الفني، البدني، قياس إدارة الفريق) وبمستوى مقبول في المقياس ككل. ٢- حصول مدربي كرة اليد للفئة الثالثة على مستوى جيد في محور (القواعد الدولية واللوائح الداخلية والقواعد الاستثنائية) وبمستوى ضعيف في المقياس ككل. ٣- حصول مدربي كرة اليد للفئة الثانية والثالثة على مستوى مقبول في محور (الإعداد الزمني والاجتماعي) وحصول مدربي كرة اليد للفئة الثانية والثالثة على مستوى ضعيف في

محور(الثقافة العامة). ٤-حصول مدربي الفئة الثالثة على مستوى ضعيف في محاور(علم التدريب، القياس والتقويم والانتقاء، الطب الرياضي، علم الحركة الرياضي). ٥-وجودة فروق في مستوى التحصيل المعرفي بين مدربي الفئة الثانية والثالثة لصالح الفئة الثانية في أغلب المحاور وفي المقياس ككل ما عدا محاور (الإعداد البدني، القواعد الدولية واللوائح الداخلية والقواعد الاستثنائية، الإعداد الزمني والاجتماعي).
وقد أوصى الباحث باستخدام المقياس المصمم في قياس المستوى المعرفي لمدربي الفئة الثانية والثالثة عند اجتيازهم الدراسات التدريبية وترقيتهم في الدرجات التصنيفية بالاتحاد المصري لكرة اليد.

Summary of Thesis

This study is a training to design a cognitive scale to measure a level of the cognitive achievement of the class (2,3) trainers in the Egyptian union of the hand-ball and fining the differences between them, they were (128) trainers (75%) from the total (171) and we can get the scale from (100 apes) by a high truth and stability confidence the individuals of the scale (100) and the response answer (98) minutes and (100) degree and we use a (7) ways of the answers and questions. the results as following: 1) the trainers of hand-ball (2) class getting a (good) degree in the apes of (technical, preparation, physical and command, administration of team) and degree of acceptable in the scale as all. 2) the trainers of hand-ball (3) class getting a (good) degree in the axes of (international rules, internal

ordeves and expectional rules and a degree of weak in the scale as all). 3) the trainers of hand-ball (2),(3) class getting the degree of acceptable in the apes of (psychological and social preparation) and degree of weak in the general knowledge. 4) the trainers of (3) class getting the degree of weak in axes of (science of training, measuring, evaluating, selecting, sportive medicine and the science of sportive mutation. 5) these were a differences in the level of knowledge learning between the (2),(3) trainers, the (2) were the best in the most times. The researcher recommended with using the scale when designed to measure the cognitive level of the trainers (2),(3), when they passed the training cycles and promotion them in the classification degrees in the Egyptian union of hand-ball.

أحمد عبد الحميد قطب	مقدم الرسالة:
تصميم بطارية اختبارات بدنية مهارة لحراس مرمى كرة اليد Design a Battery of Skillful and Physical Tests for Goalkeepers in Handball	موضوع الرسالة:
كلية التربية الرياضية - قسم الألعاب	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٩/٢٩ « ماجستير »	تاريخ المصم:
أ.د/ مدحت شوقي طوس د/ كمال سليمان حسن د/ حازم كمال الدين عبد العظيم	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

يعتبر حارس المرمى من أهم خطوط أو مراكز اللعب في الفريق دفاعاً أو هجوماً ، بل من أصعب المراكز في فريق كرة اليد ، حيث يشكل من ٣٠% إلى ٤٠% من نتيجة المباراة ، وبذلك فإن نتيجة المباراة تتأثر إلى حد كبير بتوفيق وإجادة حارس المرمى فخطأ اللاعب قد يغتفر أما خطأ حارس المرمى فمغناه هدف ، كما يعتبر معظم المدربين أن حارس المرمى وفي كرة اليد بمثابة نصف الفريق وإجادته إجادته الفريق كله. وفي حدود اطلاع الباحث على الدراسات والمراجع العلمية والأبحاث السابقة وجد أن هناك قصور في الأبحاث التي تتناول حراس المرمى في الألعاب الجماعية بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة كما لم يتمكن الباحث من الحصول على اختبارات بدنية مهارة لحراس المرمى كرة اليد للناشئين مواليد ٨٤م - ٨٦م تساعد المدرب على الاختيار السليم كما أنها تساعد على تحديد مستوى حراس المرمى مما دفع الباحث إلى القيام بهذه الدراسة. أهداف البحث: يهدف البحث إلى بناء بطارية اختبارات بدنية مهارة لحراس المرمى الناشئين من ١٦ ، ١٨ سنة في كرة اليد ، ويتطلب ذلك تحقيق

الأهداف الفرعية التالية: ١- تحديد الاختبارات البدنية لحراس مرمى كرة اليد للناشئين من ١٦، ١٨ سنة. ٢- تحديد الاختبارات المهارية (الهجومية والدفاعية) لحراس مرمى كرة اليد الناشئين من ١٦، ١٨ سنة. الاستنتاجات: ١- توفر البطارية المستخلصة مقياس موضوعي للصفات البدنية المميزة لحراس مرمى كرة اليد. ٢- تعتبر العوامل التي تتكون منها بطارية الاختبارات المهارية (الدفاعية والهجومية) لحراس مرمى كرة اليد عوامل نقية غالباً. ٣- تعتبر اختبارات البطارية اختبارات نقية حيث أن تشبعاتها على العوامل الأخرى تشبعات صفرية غالباً.

التوصيات: ١- إعادة بناء معايير جديدة لمجتمع البحث على وحدات البطاريتين المستخلصتين كل ثلاث سنوات لمسايرة التقدم الحادث في قدرات حراس المرمى. ٢- الاهتمام برفع مستوى اللياقة البدنية لحراس المرمى قيد البحث حيث ظهرت بمستوى متوسط. ٣- الاهتمام ببناء وتقنين بطاريات جديدة للاعبين المراكز الأخرى في كرة اليد.

Summary of Thesis

The introduction and the problem of the research: Goal keeper from important lines or playing center in the team defensive or attack, also from the difficult centers in the handball team, where it from 30% to 40% of the match result, so the match result affected much with guidance to success and masterd the goal keeper, If the player wrong may forgiving but wrong goal keeper meaning goal. The research find there positive relation between goal keeper level and team arrange, as meaning improve goal keeper level due to improve the team arrange also the researcher couldn't find tests physical clever to the youth handball goal keepers from age (84 & 86) help the trainer on the true select, also help him on determine the goal keeper level, where due to

there searcher making physical clever tests battery to the youth handball goal keepers from age (84 & 86).

Purpose of the research:

- 1- what are the physical tests to the youth handball goal keepers ?
- 2- what are the skillful tests (defensive) to the youth handball goal keepers ?
- 3- what are the skillful tests (attack) to the youth handball goal keepers ?

The conclusions:

- 1- extracted battery saving subject measure to physical qualities to handball goal keepers.
- 2- Considered the factors which contents battery tests skill (defensive and attack) to handball goal keepers pure factors often.
- 3- Battery tests considered pure tests where it's satisfaction on other factors zero satisfaction often.

Recommendations:-

- 1- the reconstruction of new criteria to the research society on the extracted batteries departments every three years to the compliance of the happening progress in the goal keepers abilities.
- 2- the interest by the physical fitness level improvement to the goal keepers the research restriction where it appeared by an average level.
- 3- the interest by a construction on a legislation new batteries to the players of the other centers in handball.

مقدم الرسالة:	مصطفى أحمد عبد الوهاب
موضوع الرسالة:	تأثير برنامج تدريبي مقترح للتحمل الدوري التنفسي على إفراز هرمون الأنسولين ومستوى الأداء المهاري للاعبين كرة اليد The Effect of A Suggested Training Programme For the Regular Respiratory Toleration on the Secretion of Insulin Hormone and on the Level of the Skilful Performance of the Handball Players
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم الألعاب
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٩/٢٩ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ مدحت شوقي طوس د/ عمر شكري عمر عيد د/ كمال سليمان حسن

ملخص الرسالة

يعد التحمل الدوري التنفسي من أهم مكونات اللياقة البدنية ، حيث يعد أحد العوامل الهامة في لعبة كرة اليد لما تتطلبه من استمرارية في الأداء لفترة طويلة مع ضمان ثبات هذا الأداء طول فترة المباراة ، بحيث يختتم اللاعب المباراة وهو في حالة لا تقل بأي حال من الأحوال عن بدايتها ، ويرى الباحث أنه نظرا لأهمية التحمل لدى لاعبي كرة اليد قام الاتحاد المصري بوضع قواعد استثنائية لمباريات الناشئين ومراكز تدريب العالقة والموهوبين والتي منها أن يتحتم على كل فريق الدفاع بطريقة الملازمة في النصف الثاني من الشوط الأول والثاني للمباراة ، مما يلقي الضوء على ما يتطلبه ذلك من لاعب كرة اليد بأن يتميز بدرجة عالية من التحمل الدوري التنفسي حتى يستطيع مداومة الأداء طوال المباراة مع تأخير ظهور التعب ، كما يرى الباحث أن

المعلومات المتوفرة عن المتغيرات التي تحدث في النشاط الهرموني نتيجة ممارسة النشاط الرياضي ما زالت محدودة ، هذا مما دفع الباحث في محاولة جادة منه لإجراء هذا البحث. أهداف البحث: تصميم برنامج تدريبي لتنمية التحمل الدوري التنفسي للتعرف على: ١- أثر البرنامج التدريبي المقترح على التحمل الدوري التنفسي للعينة قيد البحث. ٢- أثر تنمية التحمل الدوري التنفسي على مستوى الأداء المهاري للعينة قيد البحث. ٣- أثر تنمية التحمل الدوري التنفسي على النبض وإفراز هرمون الأنسولين والجلوكوز للعينة قد الدراسة. الاستنتاجات: ١- صلاحية البرنامج التدريبي المقترح للتحمل الدوري التنفسي للتطبيق حيث حقق أهدافه التي حددت له. ٢- توجد علاقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠٥ بين متغير الجلوكوز والأنسولين. التوصيات: ١- اهتمام المدربين بتنمية التحمل الدوري التنفسي لما له من تأثير إيجابي في تنمية مستوى الأداء المهاري وبعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية لدى لاعبي كرة اليد. ٢- أن يكون لدى كل مدرب قياسات قبلية واضحة للاعبين من الناحية البدنية والمهارية الفسيولوجية والبيوكيميائية.

Summary of Thesis

Handball is considered one of the sportive fields that have been positively and to a very great extent affected by the development of sportive haining science and modernizing the means and the ways of training and preparing the player. since handball is one of the games that depends greatly on high fitness in addition to becoming skillful in planning and performing, scientific experiments and researches that aim at recognize the factors of preparing the player and team paid great attention to it. Regular respiratory toleration is considered the

most important element in fitness in handball because it requires continuity in performance for a long time and a guarantee of stabilizing the level of performance during the whole match, so that the player ends the match in the same condition he was by its beginning. The researcher also finds that the available information about the changes that take place in the activity of hormones – as a result of practicing sports is limited until now. The results of the researches that were made to examine the effect of sportive activity on the level of hormone concentration in blood vary greatly according to the level of exerted effort and its duration. These points motivated the researcher to carry out this research. Purposes of the research: Designing a training programme to develop the regular respiratory toleration to recognize: 1- The effect of the suggested training programme to develop the regular respiratory toleration of the specimen of the research. 2- The effect of developing the regular respiratory toleration on the level of the skillful performance of the specimen of the research. 3- The effect of developing the regular respiratory toleration on producing insulin of the specimen of the research. 4- The relationship between the concentration of both glucose and insulin in (rest – After work) of the specimen of the research. The conclusion: 1- The efficiency of the suggested training programme concerning regular respiratory toleration since it has achieved. 2- There is a positive correlative relationship that

statistically indicate the variation between glucose and insulin estimated 0.05.

Recommendations:

1- paying more attention to developing the regular respiratory toleration because of its positive effect in developing the skillful performance and some physiological and biochemical variables for handball players. 2- Every coach should have former clear measures about every player from the physical, skillful, physiological and biochemical aspects. In this way every coach would have a basic settlement for planning programmes.

قسم

مساجد البيان

والصغار

أحمد حواس كمال أبو هندي	مقدم الرسالة:
"السمات الشخصية المميزة للاعبين مسابقات الجري بصعيد مصر وعلاقتها بالمستوى الرقمي"	موضوع الرسالة:
The Outstanding Personal Traits for the Runners of the Running Competitions in Upper Egypt and its Relation with the Record Level	
كلية التربية الرياضية - قسم مسابقات الميدان والمضمار	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٣/٣ (ماجستير)	تاريخ المنح:
أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم أ.د/ محمد سمير عبد الفتاح د/ عبد الحكيم رزق عبد الحكيم	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

لاحظ الباحث أن ألعاب القوى في مصر لا تساوي التقدم الرياضي على المستوى العربي والأفريقي ناهيك عن المستوى العالمي مما شجع الباحث لإجراء هذه الدراسة. أهداف الدراسة: ١- محاولة التعرف على بعض السمات الشخصية المميزة للاعبين مسابقات الجري وعلاقتها بالمستوى الرقمي في صعيد مصر. ، ٢- محاولة التعرف على الفروق في بعض السمات الشخصية بين لاعبي مسابقات الجري. اختسرت عينة مميزة من متسابقين الجري مقصورة على مسابقات الجري للمسافات (القصيرة- المتوسطة- الطويلة) بحافظات صعيد مصر المسجلين بالإتحاد المصري لألعاب القوى لهواة الموسم (٢٠٠٠/٢٠٠١) في المرحلة السنوية (١٨:١) سنة وقد بلغ حجم العينة (٩٠) لاعب. أهم الاستنتاجات: جاء ترتيب سمات الشخصية لمتسابقين في مسابقات الجري في صعيد مصر بالترتيب الآتي (الهواء _ الاجتماع _

الإكتئابية _ القابلية للاستشارة _ الضبط _ السيطرة _ العصبية _ العدوانية). لا توجد فروق دالة إحصائية في جميع سمات الشخصية بين مجموعة لاعبي مسابقات الجري المختلفة. أهم التوصيات: الاهتمام بالإعداد النفسي بصفة عامة والسمات الشخصية بصفة خاصة للاعبين الجري. في مجال الانتماء تأخذ العوامل النفسية أهمية خاصة في جميع مراحل الانتقاء المختلفة.

Summary of Thesis

The researcher recorded that track and field athletics in Egypt don't cope with the development of this sport in Arabic and African level, in addition to the world level. These problems should be stood by the researcher. Aims of the researcher: The attempt of recognizing some outstanding promal traits for the runners of the running competition and its relation with the record level in upper Egypt. The attempt of recognizing the difference in some out-standing personal traits between running competition players. The researcher sample: A research sample was chosen from the running competitors, it was only for the running competition for the short, middle and long distance in upper Egypt Governorates and recorded in Egyptian track and field athletics federation for omateurs for the season 2000 –2001 in the ages tage 16-18 year. The sample was 90 players. The basic conclusion: Gelassen hest- Gesellig heet- Depressivital – Erregbarkeit yehemmheit – Dominanz –Narvositat – Agyressivitet, there are no statistical differences in personal traits concerning the group of

different running competition players. The most important recommendations: Giving more concern about the psychological preparation generally and the personal traits of the running players particularly in the field of selection. The psychological factors should be takes special care in all different selecting stages.

مقدم الرسالة:	علي محمد علي محمد
موضوع الرسالة:	تحديد مستويات معيارية لتقييم مسابقات العدو لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط Definition Standard Levels to Evaluate Sprinting Competition for Students of the Faculty of Physical Education in Assiut University
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم مسابقات الميدان والمضمار
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٤/٢٨ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم د/ عبد الحكيم رزق عبد الحكيم

ملخص الرسالة

استهدفت الدراسة تحديد مستويات معيارية لتقييم مسابقات العدو لطلبة كلية التربية جامعة أسيوط ، والتعرف على العلاقة بين المستوى الرقمي وبين السن والطول والوزن ، وقصد استخدام الباحث المنهج الوصفي (الدراسات المسحية) ، وقد بلغ حجم العينة ٧٦٢ طالب مقسمة كالتالي ٢١٠ طالبا من الفرقة الأولى ، ٢٥٠ طالبا من الفرقة الثانية ، ٣٠٢ طالب من الفرقة الرابعة ، وقد استخدم الباحث الأنوات المناسبة لجميع بياناته ، وقد توصل الباحث إلى تحديد مستويات معيارية لسباق ١٠٠ متر عدو للفرقة الأولى ، تحديد مستويات معيارية لسباق ٢٠٠ متر عدو للفرقة الثانية ، تحديد مستويات معيارية لسباق ٤٠٠ متر عدو للفرقة الرابعة حيث يمكن الاستعانة بها لتقييم الطلاب في امتحان أعمال السنة ونهاية العام ، لا يوجد ارتباط بين السن والمستوى الرقمي للمسابقات المذكورة في حين يوجد ارتباط عكسي بين الطول

والمستوى الرقمي، ويوجد ارتباط إيجابي بين الوزن والمستوى الرقمي لسباقات العدو المذكورة.

Summary of Thesis

The study aimed at defining standard to evaluate sprinting competition for the students of the college of physical education in Assiut University and to know the relation between the digital levels and the age, height and weight. The researcher used the descriptive approach (survey) the sample of the study has been chosen the supposedly way and the size of the sample is 767 for students which divided as followed. 210 students in the first year. 250 students the second year. 302 students in the fourth year. the researcher; used the suitable instruments to collect data and the researcher know that definition standard levels for 100 metres sprinting for the first year. Definition standard levels for 200 metres sprinting for the second year. Definition standard levels for 100 metres sprinting for the forth year they may be helpful for evaluating the students. in the year and the final test. There are no connection between age and the digital level. There is a reflexive connection between height and the digital level. There is a positive connection between weight and the digital level.

مقدم الرسالة:	محمود محمد لبيب سليمان
موضوع الرسالة:	برنامج تدريبي مقترح لتحسين زمن رد الفعل لدى متسابقى عدو المسافات القصيرة A Suggested Training Program to Improving the Reaction Time to Enhancing the Small Sprint Races
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم مسابقات الميدان والمضمار
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢/٦/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم د/ عبد الحكيم رزق عبد الحكيم

ملخص الرسالة

تعد سباقات المسافات القصيرة من أمتع سباقات المضمار والتي تحقق المتعة للمشاهدين لأنها تجمع بين السرعة والعدو والتوافق التام والمرونة في حركات الجسم. ويهدف هذا البحث إلى تصميم برنامج مقترح لتحسين زمن رد الفعل لدى متسابقى عدو المسافات القصيرة- ناشئين. ولتحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج التجريبي لملائمة وطبيعة هذا البحث بتصميم المجموعتين (تجريبية - ضابطة) باستخدام طريقة القياس القبلي - البعدي لكل من المجموعتين، اشتملت عينة البحث على ١٥ لاعب من لاعبي مراكز الشباب بمحافظة أسيوط في ١٠٠ متر عدو تحت ٢٠ سنة، واستخدم الباحث الأدوات المناسبة لجمع البيانات متمثلة في تحليل المراجع والأبحاث العلمية، استمارة استطلاع رأي الخبراء، الاختبارات البدنية، أسلوب التحليل الإحصائي وأسفرت أهم النتائج على أن البرنامج المقترح له أثراً إيجابياً على سرعة رد الفعل لدى عينة البحث.

Summary of Thesis

Short-distance competitions are considered the most enjoyable competitions of the race-course. It achieves enjoyment to the viewers because it combines between the speed in running, the perfect compatability, and the flexibility of body movements. The researcher aims at designing a suggested program for improving the reaction time for short-distance running competitors to achieve that the researcher used the experimental methodology for its convenience to the nature of the research by designing two groups, one experimental, and the other control, by using the pre.post measure for both the groups. The sample of research was 15 players taken from the players of the youth centers of Assuit governorate who were under the age 20 and the distance was 100 m running distance. The researcher uses the suitable means to collect the data: Analysis of the resources and scientific research, a questionnaire from the experts, the physical tests. Conclusions: the suggested program has a positive effect on the reaction speed for the research sample.

قسم

المعارف

الرياضية والعلمية

أحمد عبد العاطي حسين	مقدم الرسالة:
تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلي على مستوى الأداء المهاري لناشئي الملاكمة* The Effectiveness of a Proposed Program of Mental Training on the Skill Performance Level of Junior Boxers	موضوع الرسالة:
كلية التربية الرياضية - قسم المنازلات الرياضية والمائية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٤/٢٨ « ماجستير »	تاريخ المنح:
أ.د/ ضياء الدين محمد أحمد العرب د/ أشرف مصطفى أحمد طه د/ كمال عبد الجابر عبد الحافظ مهران	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

اتسع نطاق الحصول على المعارف إلى مجال التجريب ويعتبر التدريب العقلي أحد عقول علم النفس المعاصر القابل للتجريب في المجال الرياضي في مواجهة التقنيات الحديثة في التعلم بصفة عامة وتطوير المهارات المختلفة في الألعاب الرياضية المختلفة ، ويعد التدريب العقلي أحد أساليب علم النفس في خفض حدة التوتر وتركيز الانتباه وإكساب اللاعب المسار الحركي الصحيح للمهارات وخاصة في رياضة الملاكمة التي يتعرض الملاكم فيها إلى ضغط عصبي ونفسي شديد قبل وأثناء سير المباراة. هدف البحث: تصميم برنامج تدريبي عقلي يهدف إلى التعرف على أثر التدريب العقلي على المستوى المهاري لناشئي الملاكمة وأثره على رفع المهارات العقلية للملاكم (القدرة على الاسترخاء - التصور العقلي - تركيز الانتباه). استخدم الباحث المنهج

التجريبي وعينة قوامها (٣٠) ناشئ. وأظهرت النتائج أن التدريب العقلي المصاحب للتدريب البدني يرفع مستوى الأداء المهاري والمهارات العقلية.

Summary of Thesis

Man's ways of investigating the psychological phenomena and his attempts to discover the psychological facts and the overtal life have to multiplied. Moreover, psychology doesn't stick to introspection and daily observations, but rather it has extended to include experimentation. Mental training is considered one of the contemporarily used techniques in psychology for the development and acquisition of different skills. Aim of the study: the effectiveness of mental training on skills performance of junior boxers and on the level of metal abilities. There are statistically significant differences between par and post measurements of the experimental group in the study.

مقدم الرسالة:	أسامة إبراهيم السعيد عمارة
موضوع الرسالة:	علاقة زمن المباراة ببعض المتغيرات الفسيولوجية والمهارية لدى لاعبي المصارعة اليونانية - الرومانية * Relationship Between Match Time and Some Physiological and Skillful Uarables for Greco-Roman Wrestlers
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم المنازلات الرياضية والمائية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٩/٢٩ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ مسعد علي محمود د/ أحمد محمد عبد السلام د/ عماد سمير محمود علي

ملخص الرسالة

قد لاحظ الباحث أن المدربين يفقدون الاهتمام بمعرفة علاقة زمن المباراة وبعض المتغيرات الفسيولوجية والمهارية لدى اللاعبين للاستفادة منها في وضع برامج تدريبية مفيدة للارتقاء بمستوى اللاعبين. أهداف البحث: ١- العلاقة بين زمن المباراة ومستوى المتغيرات الفسيولوجية والمهارية. ٢- العلاقة بين المتغيرات الفسيولوجية ومستوى الأداء المهاري للاعبي المصارعة خلال المباراة. ٣- الفروق بين القياسات الفسيولوجية قبل وبعد المباراة. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لدراسة مشكلة البحث وقد توصل إلى: وجود علاقة ارتباطية ايجابية دالة إحصائيا بين زمن المباراة والمتغيرات الفسيولوجية وأيضا المتغيرات المهارية.

Summary of Thesis

The researcher observed that the trainers neglected the importance at the relationship between the period of match, and some physical and skills changes which had a deep influences upon the players from physical and skills ways. The study aims to recognize the follows: The relationship between the period of match and some changes in physical and functional levels. The researcher used the discipline instruction from the registration studies to suitable the nature of this study. The study showed that there's a positive connecting statistical function between the period of match and the skills change.

مؤلف الرسالة:	خالد محمد عبد الكريم
موضوع الرسالة:	دراسة التكوين الجسمي وعناصر اللياقة البدنية الخاصة بسباحة المسافات القصيرة للناشئين Study of Body Composition and Special Physical Fitness Elements for Joiner Short Distance Swimmers
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم المنازلات الرياضية والمائية
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/١٠/٢٧ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د. محمد علي أحمد د. سمير محمد محيي الدين أبوشادي د. عادل محمد عبد المنعم مكي

ملخص الرسالة

تحتل رياضة السباحة أهمية متميزة بين سائر أنواع الرياضيات الأخرى ، كما حدث تقدم ملموس في السنوات الأخيرة في المستويات الرقمية للسباحين ويرجع ذلك إلى متغيرات عديدة أدركتها الدول المتقدمة وأضعفها للدراسة . كما اشغلت فكرة توصيف الأجسام أذهان العلماء منذ القدم وسعى المجتمع لإيجاد أفضل التصنيفات التي يمكن أن توصف الأجسام في ضوءها وتكمن مشكلة البحث في محاولة التعرف على عناصر اللياقة البدنية الخاصة للسباحين الناشئين ومدى ارتباطها بنسبة الدهون وعلاقتها بالإنتاج الرقمي ويهدف البحث إلى معرفة الفروق بين السباحين المتميزين والأقل تميزاً وفق الإنتاج الرقمي في متغيرات البحث المختارة . وكذا معرفة نسبة مساهمة متغيرات التكوين الجسمي وعناصر اللياقة البدنية الخاصة في مستوى الإنتاج الرقمي ، واستخدم في وسائل جمع البيانات جهاز قياس سمك ثنائي الجلد وقياس زمن

سباحة ١٠٠ م زحف على البطن ، وكذا قياسات خاصة بعناصر اللياقة البدنية الخاصة ، وأجريت الدراسة الأساسية بحمام لسباحة بكل من النادي الأهلي ونادى الزمالك ونادى الصيد على عينة قوامها (٩٠) سباح ، وكانت نتائج البحث متمثلة في وجود فروق دالة إحصائية في التكوين الجسمي لمدى السباحين المتميزين والأقل تميزا لصالح مجموعة السباحين المتميزين ، وكذا وجود فروق دالة إحصائية في بعض عناصر اللياقة البدنية الخاصى لمدى سباحى عينة البحث المتميزين والأقل تميزا لصالح السباحين المتميزين ، وجاءت التوصيات في إجراء مثل هذه الدراسة على المراحل العمرية المختلفة من السباحين وعلى مسافات المسابقات المختلفة ، والاهتمام بنتيجة عناصر اللياقة البدنية الخاصة ، وخفض النسبة المئوية للدهن لسباحى المسافات القصيرة للنشأتين .

Summary of Thesis

Swimming is distinct among sports because of the physical, psychological and social benefits it gives to human. Recently, body description has been studied for many years and scientists worked for finding the best items based on which bodies can be described. The items of special physical fitness are also important to study physical fitness in terms of concept, composition, training and evaluation is allogical reflex to the importance of body composition. This work is to identify the items of physical fitness in young swimmers and their relationships with body fat and record level. To find a scientific accurate method to select and classify swimmers. The work has been done with the following objective, determination of body composition and elements fitness in junior swimmers, study of effects of body

composition variables and physical fitness on record levels of young swimmers. Research tools skin rold caliper, tests and measurements, anthropometrics measurements. Measurements concerned with numerical levels, this study was carried out in Alahly, Elzamalk, El-Said clubs as (90) swimmers. The deductions were made, the existence of statistical differences concerning body composition of the research sample swimmers the elite and under elite swimmers for the sake of the elite ones. The researcher recommend the following, taking care of developing the special fitness elements and decreasing the fat percentage for junior swimmers of short distance.

قسم

التحريات

والبحار

مقدم الرسالة:	محمود فاروق صبره
موضوع الرسالة:	تقويم الجُمباز العام بجمهورية مصر العربية Evaluation of General Gymnastics in A.R.E
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم التمرينات والجُمباز
تاريخ الصنف:	٢٠٠٢/٣/٣ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ ليلى عبد العزيز زهران د/ عمرو حلمي محمد زايد د/ محمود محمد حسن

ملخص الرسالة

من خلال عمل الباحث واحتكاكه بالاتحاد المصري للجُمباز ، وجد أن هناك أربعة أنواع من رياضيات الجُمباز تطبق في جمهورية مصر العربية وهي: "الجُمباز الفني للرجال والسيدات ، الجُمباز الإيقاعي ، والجُمباز العام". ووجد أن الجُمباز العام له أهمية كبيرة نظرا لإمكانية ممارسته للجنسين بمختلف قدراتهم وأعمارهم، وهذا دفع الباحث لإجراء دراسة تقويمية للجُمباز العام بجمهورية مصر العربية للتعرف على دافع الجُمباز العام في جمهورية مصر العربية من خلال المفهوم والأهداف وخطة النشاط والإمكانات المتاحة وأساليب التقويم بالإضافة لمقارنة هذا الواقع بما هو عليه في بعض الدول المتقدمة الذي اتخذها الباحث كمرجعية في دراسته، واستخدم الباحث منهجا وصفيا مستعينا بتحليل الوثائق والمقابلة الشخصية والإنترنت لبناء استبيان يمكن من خلاله جمع المعلومات الخاصة بدراسته التي طبقها على عينة قوامها ٤٥ فردا من أعضاء اللجان الفنية للجُمباز العام وبعض مدربي وإداري الأنديا بمختلف مناطق الجُمباز الست ، وتوصل إلى أن هناك قصور واضح في تطبيق المفهوم والأهداف وخطة النشاط وضعف الإمكانات المتاحة بدرجة كبيرة خصوصا الميزانية بالإضافة

لنقصور في إتباع أساليب لتقويم الجُمباز العام مما يعوق انتشاره وممارسته بجمهورية
مصر العربية كما قام الباحث بعمل مشروع للنهوض بالجُمباز العام وتطويره بجمهورية
مصر العربية.

Summary of Thesis

Throughout the researcher's contact with the Egyptian union of gymnastics, he found out that there were four kinds of gymnastics applied in the A.R.E. they are: technical gymnastics for men and women, rhythmic gymnastics, and general gymnastics which is very important as both males and females can practice it with their varying abilities and ages. This motivated the researcher to conduct an evaluative study on general gymnastics in the A.R.E. so as to indentify the reality of the general gymnastics in the A.R.E. through the concept, the aims, the activity plan, available potentialities, and evaluation styles, in addition to comparing this reality with that in same develop countries that the researcher used as a referential in his study. The researcher used a descriptive methodology using documents analysis, the interview and the internet for constructing a questionnaire through which data related to the study which he applied to a sample consisting of 45 members of technical committees for general gymnastics and some team trainers and managers in different gymnastics zones. the researcher and the activity plan. There is also a weakness to a great extent, in the available potentialities,

especially the equilibrium, in addition to a shortage in following up the general cym, styles inhibiting its spread and practice all over the A.R.E. the researcher also conducted a project for fostering and developing general cym in the A.R.E.

ياسر حسن حامد	مقدم الرسالة:
"محتوى مفتوح لمقررات التمرينات البدنية بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط" A Suggested Content for the Syllabuses of Physical Exercises in Faculty of Physical Education, Assiut University	موضوع الرسالة:
كلية التربية الرياضية - قسم التمرينات والجمباز	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٤/٢٨ « ماجستير »	تاريخ اللم:
د/ طارق محمد محمد عبد العزيز د/ محمد كمال الدين البارودي د/ رجب كامل محمد محمود	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

يعتبر التطور من السمات المميزة للدول المتقدمة في جميع المجالات ، ولذلك حرص خبراء التربية الرياضية على تطوير وتحديث مناهج التربية الرياضية بما يتماشى مع التطورات والتغيرات في كافة مجالات الحياة. والتمرينات البدنية تعتبر من أهم المجالات البدنية التي تسعى الدول المتقدمة لتنشيط ممارستها لقطاعات الشعب المختلفة. ويهدف هذا البحث إلى الوصول إلى محتوى مقترح لمقررات التمرينات البدنية بكلية التربية الرياضية- جامعة أسيوط من خلال تحديد كل من أهداف ومحتوى وطرق وأساليب تدريس وتقديم الخبرات العملية والنظرية لمادة التمرينات. وتقتصر عينة البحث على "١٢" من الخبراء أساتذة التمرينات بكلية التربية الرياضية بجامعة ج.م.ع. خلال العام الدراسي ٢٠٠١م. ولتحقيق ذلك اتبع الباحث الخطوات العلمية لإجراء هذا البحث. ولقد توصل الباحث إلى أنه يجب أن يكون لمادة التمرينات دليل مقرر

يوضح الأهداف والمحتوى وطرق وأساليب تدريس وتقديم هذا المحتوى. وأوصى الباحث بضرورة تطبيق هذا المحتوى على طلاب كليات التربية الرياضية بجامعة جمهورية مصر العربية.

Summary of Thesis

The development is considered one of the qualities of the developed countries in all fields. So the experiments of physical education aspire to improve the curriculums of physical education according to changing in all fields of life. Physical exercises are the most important physical fields which the developed countries work hard to encourage their practice for the different sections of nation. This research aims at building a suggested content for the syllabuses for physical education exercises in the faculty of physical education, Assuit university through determining aims, content, methods and ways of teaching and evaluation of the practical and theoretical experiences for physical exercises. The sample of this research of experts is confined to professors of exercises "12" at the faculties of physical education in Egypt. Through the year 2001. To achieve the aim, the researcher followed the scientific steps for the measures of this research. The researcher discovers that the physical exercises must have a syllabus which clears the aims, content, methods of teaching and evaluation of this content. The researcher recommends applying this content in the Egyptian universities.

مقدم الرسالة:	محمد ضاحي عباس
موضوع الرسالة:	تأثير تنمية الإدراك الحس حركي على أداء مهارة الدورة الهوائية الخلفية كنهاية على جهاز العقلة وفقا لبعض المتغيرات الكينماتيكية The Effect of Developing Kinesthetic Perception to Back Summer Solt Strait as Finish on Horizontal Bar with Kinmatic Variables
الكلية والقسم:	كلية التربية الرياضية - قسم التمرينات والجمباز
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٥/٢٦ «ماجستير»
لجنة الإشراف:	د/ عمرو حلمي محمد زايد د/ محمد فؤاد حبيب د/ محمود محمد محمد حسن

ملخص الرسالة

يستهدف البحث التعرف على تأثير تنمية الإدراك الحس حركي على أداء مهارة الدورة الهوائية الخلفية كنهاية على جهاز العقلة وفقا لبعض المتغيرات الكينماتيكية ويتم ذلك من خلال: فروض البحث: ١- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبليّة والقياسات البعديّة للمجموعة التجريبية في متغيرات الإدراك الحس حركي لصالح البعديّة. ٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبليّة والبعديّة في المتغيرات الكينماتيكية لمهارة الدورة الهوائية الخلفية كنهاية على جهاز العقلة لصالح القياسات البعديّة. ٣- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات القبليّة والبعديّة للمجموعة التجريبية في قياسات مستوى الأداء المهاري لمهارة الدورة الهوائية الخلفية المستقيمة كنهاية على جهاز لصالح القياسات البعديّة.

واستخدم المنهج الوصفي باستخدام التصوير بالفيديو والتحليل الكينماتوجرافي كما استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام المجموعة التجريبية الواحدة بطريقة

القياس القبلي والبعدي وبلغ حجم العينة خمسة لاعبين من لاعبي النادي الأهلي المصري تحت ١٢ سنة كمجموعة تجريبية وكانت أدوات جمع البيانات وتحليل المراجع والأبحاث العلمية ، الاستبيان ، المقابلة الشخصية ، الملاحظة العلمية ، اختبارات الإدراك الحس حركي ، التصوير بالفيديو. وكانت أهم النتائج: ١- برنامج تمرينات الإدراك الحس حركي الخاصة بمهارة الدورة الهوائية الخلفية المستقيمة كنهاية على جهاز العقلة أدى إلى تطوير متغيرات الإدراك الحس حركي الخاصة بالمهارة قيد البحث وهي (إدراك الجهد ، إدراك التوقيت ، إدراك المسافة ، إدراك الدوران). ٢- برنامج تمرينات الإدراك الحس حركي الخاص بمهارة الدورة الهوائية الخلفية المستقيمة كنهاية على جهاز العقلة أدى إلى تحسين مستوى أداء مهارة الدورة الهوائية الخلفية المستقيمة كنهاية على جهاز العقلة. التوصيات: ١- استخدام البرنامج المطبق في البحث عند التدريب لتطوير مستوى أداء مهارة الدورة الهوائية الخلفية المستقيمة كنهاية على جهاز العقلة. ٢- ضرورة تطوير الإدراك الحس حركي لمهارات مختلفة في رياضة الجباز باستخدام الأساليب المتعددة. ٣- استخدام التحليل الكينماتيكي لمهارات مختلفة كمحك دقيق لتقييم تطوير الأداء المهاري وإظهار فاعلية البرنامج.

Summary of Thesis

The study aims at identifying the effect of developing the kinesthetic perception on the skillful performance of the back summer solt straight as dismount on the horizontal bar according to some kinematic variables hypotheses of the research: There are statistically significant differences between the measures of the competent performance of the back summer solt as an end on the horizontal bar for the post tests. The sample of the research was "5" of gymnastics

juveniles in the Egyptian Ahly club under 12 as an experimental group. The tools of gathering data were: Analysing the references and the scientific researches, scientific observation kinesthetic perception tests and photographing by video. The programme of kinesthetic perception exercises which are related to the strength back summer solt skill as a finish on the horizontal bar led to the development of the kynmatic variables such as horizontal distance and flying time.




محلقة الأحاب

**بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير
بكلية الآداب جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠٢**

القسم	البيان	درجة الماجستير		
		طالب	طالبة	أجمالي
اللغة العربية		٣	١	٤
اللغة الإنجليزية		٢	٠٠	٢
اللغة الفرنسية		٠٠	١	١
التاريخ		٢	٠٠	٢
علم الاجتماع		١	١	٢
الأعلام		١	١	٢
الوثائق والمكتبات والمعلومات		٣	٠٠	٣
الإجمالي		١٢	٤	١٦

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الآداب جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠٢



قسم

اللغة العربية

عاطف حسن عبد اللاه عبد الواحد	مقدم الرسالة:
أثر التصوير الفني للجحيم في القرآن الكريم على الإبداع الأدبي حتى القرن السادس الهجري	موضوع الرسالة:
The Effect of Artistic Portrayal of Hell in the Holy Qu'ran on Literary Creation Till the Sixth Century of the Hegira	
كلية الآداب - قسم اللغة العربية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢ / ٣ / ٣١ م (ماجستير)	تاريخ المنع:
أ.د / أحمد محمد جودة السعدني	لجنة الإشراف:
أ.د / عمر محمد سعيد	

ملخص الرسالة

لقد حدد القرآن هدف الإنسان وغايته في هذه الحياة ، وهو تحقيق العبودية وتوثيق الارتباط بالله سبحانه وتعالى ولقد رأيت أن أقف أمام النصوص القرآنية التي تتناول أحوال أهل النار ، وآيات القرآن الكريم التي تصف حال الفاسقين والمنافقين والكافرين هدفها الموعظة والتذكير ، ليرجع كل إنسان إلى نفسه ويقيس بها حاله ، وجاءت هذه الرسالة تحوى الحديث عن تعريف الجحيم ، ووجود النار الآن ، ومظاهر جحيم الآخرة وأشكالها المتعددة ، وموجبات النار ، وخصائص نار الآخرة ، وصفات أهل النار ، ثم التصوير البلاغي لعذاب الجحيم في القرآن الكريم ، والتصوير القصصي لعذاب الجحيم في القرآن الكريم ، ثم تصوير الجحيم في رسالة الغفران ، وتصوير الجحيم في " حي يقظان " لابن طفيل ، وعلاقة الجحيم بالشعر ، وصورة الجحيم في الشعر . كل ذلك من وحي معاني الآيات التي سقتها في مواضعها .

Summary of Thesis

The Holy Quran shows Man's aim and objectives in this world. This aim (or objective) is to realize bondage to God and to strengthen the ties with God. The researcher believes that it is a good idea to analyze the texts of the Quran that deal with the conditions of the people who get into hell. He also analyzes those texts of the Quran that deal with the immoral, the hypocrites and the unbelievers. These texts of Quran aim to remind people of the right way and help them get into knowing truth. This will lead every man to know the right way. This thesis also deals with the definition of " Hell ", the existence of "Hell", manifestation of Hell, its shapes, and factors leading to "Hell" After that the thesis deals with the artistic portrayal of Hell's torture in Quran and the narrating portrayal of Hell's torture in Quran. Then the thesis portrays "Hell, in Message of forgiveness" by Maeri, the portrayal of Hell in "Hai bin Yakzan", the relationship between Hell and poetry and the images of Hell in poetry. All these ideas were taken and discussed in light of the verses taken from Quran. And the researcher set these verses in their position that seem fit, in his opinion, to convey what he wants to assure.

مقدم الرسالة:	أحمد صفوت محمد محمد قراءة
موضوع الرسالة:	"القضايا النحوية والصرفية في فتح القدير للشوكاني ١١٧٣ - ١٢٥٠ هـ"
	Grammatical and Declination Cases in Fatth EL Kadeer for El Showkany (1173 J 1250)
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم اللغة العربية
تاريخ المنع:	٢٩/٩/٢٠٠٢م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د / أحمد محمد عبد الدائم د / يوسف أحمد جاد السرب د/ محمد أحمد عبد الرحمن الطيب

ملخص الرسالة

إن لشوكاني يعد من الموسوعيين في تاريخ الإسلام ، وهو محدث وفقه وأصولي ، وله كتب ومصنفات كثيرة من أهمها في التفسير " فتح القدير " . وقد قمت بحصر القضايا النحوية والصرفية في هذا التفسير ثم تناولتها بالدراسة والتحليل موضحاً آراء الشوكاني ومدى اتفاقه واختلافه مع غيره من علماء النحو والتفسير ، وقسمت هذه الرسالة إلى: مقدمة ، وتمهيد ، وفصلين ، وخاتمة ، ثم ذيلت الرسالة بالفهارس الفنية . الفصل الأول: وجعلته بعنوان: القضايا النحوية ، وتناولت فيه القضايا النحوية التي تعرض لها الشوكاني مرتبها كما يلي: — الضمائر ، بعض المرفوعات كالمبتدأ والخبر ، ١٠ ، النواسخ ، بعض المنصوبات ، بعض التوابع كالعطف والبدل ، إعراب الفعل المضارع ، ثم القضايا التركيبية مثل: اللهم ، كآين ، ويكان الفصل الثاني: وجعلته بعنوان: القضايا الصرفية ، وتناولت فيه القضايا الصرفية التي تعرض لها الشوكاني مرتبها كما يلي: الاشتقاق والمشتقات ، جمع التكسير " القلة

- والكثرة " ، الإعلال والإبدال ، بعض أسماء الأفعال ، ثم الممنوع من الصرف .
- الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات ، ثم الفهارس الفنية .

Summary of Thesis

El Showkany is regarded as one of the greatest writers in the Islamic history. He wrote many books in different Islamic fields. The most important one is "Fatth El Kadeer". I collected the grammatical and analysed them to show El Showkany's opinions and the points of agreement and disagreement with other grammatical scientists. This message contains: introduction, presentation, two chapters, conclusion and technical contexts. Chapter one:- "Grammatical cases" it includes the grammatical cases studied by El showkany as follow: Pronouns, nominative cases, abolathion, erected cases, objective cases, some consequences, present tense and it analyse and structure cases. Chapter two:- " declination cases " and it includes: Derivations, broken plural, changing and defectiveness, verbs names and indeclinable.

مقدم الرسالة:	أحمد محمد عبد الرحمن حسانين
موضوع الرسالة:	بناء الجملة في عبقريات العقاد Sentence Structure in El-Akaad's Abkariate
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم اللغة العربية
تاريخ المصم:	٢٩/٩/٢٠٠٢م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / محمود فهمي حجازي د / محمود عبد العزيز محمد

ملخص الرسالة

البحث بعنوان: "بناء الجملة في عبقريات العقاد"، وهو موضوع اعتمد فيه الباحث على مجموعة من النصوص بهدف استنباط القواعد من خلال الواقع الفعلي المستعمل، وذلك من خلال معرفة مدى الالتقاء والتحالف بين الواقع اللغوي عند العقاد وما قرره النحاة من قواعد وأحكام، ودور ذلك في المساهمة في وضع تعريف واضح ومحدد للجملة يبين ماهيتها وحدودها الفعلية من حيث أين تبدأ؟ وأين تنتهي؟ وكما نوعا هي؟ وأي المعايير التحليلية يعد أكثر ملائمة لاستكناه جوانبها؟ ومحاولة توضيح علاقة نحو الجملة بنحو النص الذي يعتبر النص كله وحدة للتحليل باعتباره كلا متماسكا وهيكل متواصل الأجزاء يمتد إلى ما وراء الجملة إلى الفقرة فالقطعة فالنص، حيث تعمل وسائل متعددة على تناسقه وجمال أجزائه وحسن اتلافه، واعتمد البحث على المنهج الوصفي الذي يعتمد على الشكل والوظيفة دون أن يدخل في اعتبارات أخرى خارجة عن اللغة، وانقسمت الدراسة قسمين: الأول نظري، والثاني تطبيقي. وانقسم التطبيقي إلى خمسة فصول، خصص الأول للجملة الفعلية، والثاني للجملة

السمية، والثالث للإشائية ، والرابع للجملة الشرطية وقضاياها ، والخامس خصص
لدراسة بعض القضايا التركيبية .

Summary of Thes.

The researcher examines El-Akaad's Abkariate aiming to deduce some rules out of the actual linguistic use through the comparison between the author's linguistic use and the syntactic use of sentences. Out of this the researcher tries to present a clear and precise definition of the sentence. He examines the verbal sentence, where it starts and ends, its different types, and what analytical measurements are suitable for its parts. He tries to clarify the relationship between the syntax of the sentence and the syntax of the text, which is treated as a whole unit for analysis. The thesis is handling the text as a unified structure or relative parts i.e. sentences make paragraphs and they make passages. Then, the text is made up of a group of these consistent passages. There are many textual tools that correlate, cohere, and beautify the text's different parts. The researcher depends on the descriptive approach that highlights the form and the function of the text. The present study is divided into two sections: Section one: Theoretical background & section-two is an application. This section comprises five chapters: Chapter one deals with the verbal sentence, chapter two present the nominal sentence, chapter three introduces the exclamatory sentence, chapter four handles the conditional sentence and its types and chapter five deals with different structural patterns.

عواطف عبد الرحيم محمد عبد الكريم	مقدم الرسالة:
<p>'أدب الأطفال في مصر خلال القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين / دراسة تاريخية وصفية'</p> <p>Children's Literature in Egypt Through the Nineteenth Century and up to the Middle of the Twentieth Century: A Historical and Descriptive Study</p>	موضوع الرسالة:
كلية الآداب - قسم اللغة العربية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٩/٢٩ م (ماجستير)	تاريخ المنع:
أ.د / طه عمران وادي	لجنة الإشراف:
د / حامد محمد مرسى	

ملخص الرسالة

تقوم هذه الدراسة على تحديد مراحل أدب الطفل منذ القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين - في ثلاث مراحل زمنية تشكل كل مرحلة فصلا من فصول الدراسة، المرحلة الأولى: مرحلة الإرهاصات (١٨٣٤ - ١٨٨٧ م)، وجاءت في مبحثين، كان أولهما عن جهود رفاعة رافع الطهطاوى وابنه على فهمي في التنويه إلى أهمية الطفولة وترسيمها لملاح أدب الطفل في مصر وثانيهما عن جهود محمد عثمان جلال في ترجمة وتعريب حكايات لافونتين. المرحلة الثانية: مرحلة النمو الإبداعي (١٨٩٨ - ١٩١١) وجاءت في مبحثين أيضاً اهتم الأول منها بدور أحمد شوقي في التعامل مع حكايات لافونتين ومحاولاته لها في حين اهتم الثاني بدراسة النتاج الشعري لإبراهيم العرب. المرحلة الثالثة: مرحلة النضج وتنوع أشكال الإبداع (١٩٢٢ - ١٩٥٢) وجاءت في أربعة مباحث، اهتمت جميعها بدراسة أدب محمد الهوارى وكامل كيلاني، وحامد القصبي، ومحمد سعيد العريان. وخلصت الدراسة إلى بعض

النتائج المهمة التي نبحث من التركيز على النصوص الشعرية والنثرية الموجهة للطفل
المصري خلال الفترة المحددة.

Summary of Thesis

The present study attempts to specify the stages of children's literature in Egypt since the nineteenth century until twentieth century as three chronological stages each of which is handled in a separate chapter: I. The Stage of Precursors (1843-1887): The discussion of this stage pivots around two major points. First, the contributions of Rifaa Rafei El- Tahtawi and his disciple, Ali Fahmi, illuminated the importance of childhood and delineated the features of children's literature in Egypt. Second, the efforts of Mohamed Othman Galal to translate and Arabicize La Vontaine's stories. II. The Creative Development Stage (1898-1911): Through the study of this stage, the researcher tackles two main points First the role of Ahmed Shawki in dealing with as well as imitating La Vontaine's stories is clarified. Second, the thesis is interested in Ibrahim El-Arab's verse works. III. The stage of maturity and the diversity of the forms of creativity (1922 –1952): The researcher handles here four points all of which are concerned with the study of the literature of Mohamed El-Harawi, Kamel Kilani, Hamed El-Kasabi and Mohamed Said El-Erian. To conclude, the study has reached some important findings which spring from the focus on the verse and prose texts which addressed the Egyptian children in the specified period.

قسم

الخط العربي

عبد المحسن إبراهيم هاشم	مقدم الرسالة:
الإحباط والتفاؤل في قصائد مختارة لـ باتريك كافانا (١٩٠٤ - ١٩٦٧) Frustration and Optimism in Selected Poems by Patrick Kavanagh (1904 - 1967)	موضوع الرسالة:
كلية الآداب - قسم اللغة الإنجليزية	الكلية والقسم:
٢٠٠٢ / ٩ / ٢٩ م «ماجستير»	تاريخ المضم:
أ. د / أحمد المختار محمود	لجنة الإشراف:
د / ممدوح علي أحمد	

ملخص الرسالة

تحاول الدراسة الكشف عن موضوعي الإحباط والتفاؤل في شعر باتريك كافانا ، تتكون الدراسة من أربعة فصول وخاتمة يلقي الفصل الأول الضوء على حياة الشاعر وعمله الأدبي ، كذلك يحاول هذا الفصل استكشاف المشهد الأدبي في أيرلندا منذ بداية القرن العشرين وحتى الستينيات ، وهي الفترة الزمنية التي عاش خلالها الشاعر . ثم يأتي الفصل الثاني ليكشف عن موضوع الإحباط في شعر باتريك كافانا ، القصائد التي كتبها هذا الشاعر في مراحلها الأولى تعبر عن حالة شخص محبط: عاطفياً أو جنسياً أو دينياً أو ذهنياً أو جسمانياً أو نفسياً أو اجتماعياً أو شعرياً . أما الفصل الثالث فيتناول موضوع التفاؤل في شعر باتريك كافانا ، لقد شهد عام ١٩٥٥ نقطة تحول في حياة وشعر هذا الكاتب فقد أجرى عملية جراحية ناجحة استعاد نفسه بعدها صحياً ونفسياً ، وبدأ يكتب نوعاً جديداً من الشعر يتميز بالأمل والتفاؤل والسعادة ، ويناقش الفصل الرابع الأساليب الفنية المستخدمة في شعر باتريك كافانا كذلك يوضح هذا الفصل كيف أن الشاعر يستخدم هذه الأساليب الفنية بشكل يعكس موضوعي الإحباط والتفاؤل في

شعره. في النهاية ، تأتي الخاتمة لتعطي تلخيصاً للأفكار والنقاط الأساسية التي تناولتها
فصول الدراسة الأربعة. كذلك تقدم بعض التوصيات الخاصة بالبحث المستقبلي في شعر
باتريك كافانا.

Summary of Thesis

The study attempts to trace the element of frustration and that of optimism as two remarkable themes in Patrick Kavanagh's poetry. The study is divided into four chapters and a conclusion. The first chapter consists of two parts. Part one tries to explore the literary scene in Ireland from the 1900s to the 1960s. The influence of that literary background on Patrick Kavanagh as well as his reaction to it are given in part two which discusses the poet's life and career. The second chapter clarifies the element of frustration in Patrick Kavanagh's poetry. Many of Kavanagh's poems reflect emotional, sexual, religious, intellectual physical, psychological, social and poetic frustration. The third chapter indicates the element of optimism in the poetry of Patrick Kavanagh. In 1955, a major turning-point took place in the poet's life and changed the direction of his poetry from frustration into optimism. The fourth chapter deals with the technical devices used in Kavanagh's poetry and shows how they reflect his themes of frustration and optimism. Finally comes the conclusion to sum up the main ideas handled in the four chapters of the study. Additionally, recommendations for further research on Patrick Kavanagh's poetry are given.

علاء الدين مصطفى خليفة	مقدم الرسالة:
صورة رجل الأعمال الأمريكي كما تعكسها روايات مختارة لديفيد مامت (١٩٤٧ - ٠)	موضوع الرسالة:
A Portrait of the American Businessman as Reflected in Selected Plays by David Mamet (1947 - 0)	
كلية الآداب - قسم اللغة الإنجليزية	الكلية والقسم:
٢٩/٩/٢٠٠٢ م «ماجستير»	تاريخ المصمم:
د / أبو طالب محمود أحمد	لجنة الإشراف:
د / نادية أمين جاد الله	

ملخص الرسالة

تناول الباحث ، في الفصل الأول ، الإسهام الأدبي لديفيد مامت ، وناقش موضوعات مسرحيات الكاتب وسمات شخصياته ، كما أشار إلى الكتاب الذين أثر أو في مامت ، وألقى ضوءاً على أسلوبه ولغته ، وختم الفصل بفكرة عن الرأسمالية والحلم الأمريكي . وطوال الفصل الثاني والثالث والرابع ، قدم الباحث تصويراً قاتماً لرجل الأعمال الأمريكي ، فالخيانة تلعب دوراً لاغنى عنه في حياته ، وهو يرى أن الصداقة لا تتفق مع العمل التجاري ، وهو يحصل على صفقاته التجارية عن طريق تشويه صورة الآخرين ، ويتميز بالعنف اللفظي والبدني واللغة البذيئة ، كما أنه يستخدم اللغة الماكرة كوسيلة لخداع الآخرين . وبالتالي ، تدمرت علاقاته الاجتماعية ، وغالباً يلجأ إلى الجريمة ليسائر ضغوط مجتمعه المادية . كما صور الباحث السلوك الفاسد لرجل الأعمال في هليوود ، الذي يجعل من تحقيق المال فقط هدفاً لأفلامه و بين أيضاً انعدام الثقة بين رجال الأعمال .

Summary of Thesis

In chapter one, the researcher traced David Mamet's literary contribution. He discussed the themes of Mamet's plays and the features of his characters. He also referred to the writers, who affected Mamet's imagination. He shed much light on his style and language as well. The chapter was concluded by referring to an idea about the nature of capitalism and the American dream myth. Throughout the remaining three chapters, the researcher presented a dark vision of the American businessman. Betrayal plays an integral part in his life. He argues that there is a contradiction between business and friendship. He gets his business deals through staining others' images. Verbal and physical violence in addition to obscene language characterize him. The businessman also uses cunning language to deceive others. Consequently, his social relationships are ruined. He often resorts to crime to cope with the material pressures of his society. The researcher portrayed the corrupt behavior of Hollywood businessman, who considers only making money as the aim of his films. He also showed lack of trust among the businessmen.

قسم

اللغة الفرنسية

مقدم الرسالة:	شرين حسن أحمد رشوان
موضوع الرسالة:	قرأ نسوا موريلال / جنتريركس ترجمة إلى اللغة العربية ودراسة أدبية ولفوية François Mauriac: Genitrix Translation into Arabic and a Literang and Linguistic Study
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم اللغة الفرنسية
تاريخ المنع:	٢٠٠٢ / ٩ / ٢٩ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / درية حافظ نجم أ.د / أحمد فؤاد عبد المجيد

ملخص الرسالة

تدخل هذه الرسالة في نطاق الترجمة الأدبية ، وهي تعد بذلك إسهاما في تطوير وتنشيط حركة الترجمة في مصر . فبالى جانب أنها تقدم للقارئ العربى أحد رواد الثقافة الفرنسية فرانسوا موريلال الذى حصل على جائزة نوبل فى الأدب عام ١٩٥٢ م ، فترجمة مثل هذا العمل تنقل القارئ إلى عالم آخر، إلى عالم لا تفصله عنه فقط الحدود لكن أيضا اللغة والثقافة والتاريخ والدين والعادات والتقاليد . الرسالة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء . يتضمن الجزء الأول الترجمة التى حاولنا أن تكون صادقة ومعبرة عن أفكار الكاتب وعن كل ما أراد قوله من خلال روايته . حرصنا أيضا على أن نسبق الترجمة بنبذة باللغة العربية عن الكاتب وأهم أعماله فى محاولة لتقديمه للقارئ العربى . يتناول الجزء الثانى من الرسالة دراسة أدبية للرواية . ينقسم هذا الجزء إلى أربعة فصول . يتناول الفصل الأول بناء الرواية ، ويقدم الفصل الثانى دراسة تفصيلية للأفكار والموضوعات التى طرحها الكاتب من خلال الرواية . يتناول الفصل الثالث دراسة تحليلية لشخصيات الرواية . أما الفصل الرابع فهو يلقي الضوء على فن وأسلوب

الكاتب . يشتمل الجزء الثالث على دراسة لغوية للرواية المترجمة ، وهو ينقسم إلى فصلين يسبقهما نبذة عن المفردات التى أثار الكاتب استخدامها . نطرح من خلال الفصل الأول المشكلات والصعوبات التى واجهتنا أثناء عملية الترجمة . أما الفصل الثانى فيتناول بالتفصيل بناء الجملة عند مورياك فى روايته جنيتريكس .

Summary of Thesis

This thesis deals with literary translation. It is considered as a contribution in developing and activating the trend of translation in A.R.E. Besides providing the Arab reader with knowledge about one of the pioneers of French culture; Fransoi Moriac who won Nobel prize of literature in 1952, the translation of this work transfers the reader to another world. It is a world which the reader is far away because of the limits, language, culture, history, religion, customs and traditions. The thesis is divided into three parts: the first part contains the translation. In it we tried to make it true and all what he wanted to say in his novel. The translation is preceded with Arabic preview on the writer and his works so as to present him to the Arab reader. The second part deals with a literary study to the novel. This part is divided into four chapters. The first chapter deals with the construction of the novel. The second presents a detailed study to the ideas and subjects which the writer dealt with in the novel. The fourth sheds the light on the art and technique of the writer. The third part is a linguistic study to the translated novel. It is divided into two

chapters preceded with a preview on the vocabulary used by the writer. The first chapter deals with the problems and difficulties which we faced during translation. The second chapter deals, in details, with the construction of sentences of Moriac in his novel *Genitrix*.

قسم

التاريخ

مقدم الرسالة:	رشاد رمضان عبد السلام عثمان
موضوع الرسالة:	"النشاط اليهودي في مصر من عام (١٨٩٧ - ١٩٢٢ م)" The Jewish Activity in Egypt from (1897 - 1922)
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم التاريخ
تاريخ المنسم:	٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د / عادل حسن غنيم د / تهاني محمود شوقي

ملخص الرسالة

تناول الرسالة أوضاع اليهود في مصر من حيث أعدادهم ، وطوائفهم ، ومجموعاتهم ، ومؤسساتهم وأسباب تعلق اليهود بالجنسيات الأجنبية ، وعلاقات اليهود مع الدولة العثمانية والحكومة المصرية والطوائف غير اليهودية ، وتناولت الدراسة النشاط الصهيوني في مصر ، وموقف الصحافة المصرية من هذا النشاط ، وموقف يهود مصر من الحركة الصهيونية ، وعرضت الدراسة النشاط الاقتصادي لليهود في مصر وأبرزت السيطرة اليهودية على الاقتصاد المصري ، وعرض المظاهر الإيجابية والسلبية لهذا النشاط . كما تناولت الدراسة النشاط الاجتماعي لليهود في مصر من حيث تكوين الأسرة اليهودية وممارستهم اليومية ، ومؤسساتهم الاجتماعية والخيرية ، وزيارة الأضرحة اليهودية ، وأخلاق اليهود في مصر وأثرها على المجتمع المصري . كما عرضت الدراسة النشاط الثقافي والرياضي لليهود في مصر من حيث اهتمام الطائفة بتعليم أبنائهم واشهر المثقفين اليهود في مصر ، وإنشاء المكتبات والصحف والدور البارز لليهود في مجال الفن ، واهتمامهم بالرياضة البدنية ، ودور اليهود في نشر الأنشطة الهدامة في مصر . وقد أثبتت الدراسة أن النشاط الصهيوني المبكر في مصر يعود إلى عام ١٨٩٦ أي قبل انعقاد مؤتمر " بال " كما كشفت الدراسة عن مشرو:

إنشاء مستعمرة يهودية في منطقة العريش شمال سيناء على مساحة ٣٠.٠٠٠ فدان .
وأثبتت الدراسة محاولات اليهود من أجل الحصول على موافقة السلطان عبد الحميد
ورفض السلطان لهذه المحاولات ، وأثبتت الدراسة أن الصحافة المصرية كانت على
علم بالنشاط الصهيوني وأهدافه منذ بدايته غير أنها كانت تعزف عن الخوض في
الممالة الصهيونية وتركت ذلك للكتاب من خارجها . وأثبتت الدراسة تغفل اليهود في
مختلف مجالات النشاط الاقتصادي في مصر والسيطرة على جوانب هامة فيه .

Summary of Thesis

The research is about the description of the Jewish in Egypt concerning their numbers their religious groups, allies, firms and the canse of relating Jewish to other nationalities, the relation of the Jewish with the Osmani empire and the Egyptian government and other allies other than Jewish. The research also discusses the activities of Zionism in Egypt and the attitude of the Egyptian press towards them. The attitude of the Egyptian Jewish towards the Zionism movement. It also discusses the economic activity of the Jewish in Egypt and the Jewish detonation on the Egyptian economy positively and negatively. It also discussed the social Jewish activities in Egypt. The from of the families, their everyday life their charity and social institutions, the manners of Jewish in Egypt and the effects on the Egyptian society. Tne research also discussed the cultural and sports activities in Egypt concerning caring about the children education, the most famous Jewish cultured in Egypt, establishing

libraries, journals and the Jewish role in Arts and their role in spreading destructive activities in Egypt. Jewish activity in Egypt returns to the year 1869 before holding Ball conference and the project of establishing a Jewish colony in Al-Arish north Sinai over an area of about 30.000 fedčans, and the trial of the Jewish to make sultan Abd El-Hamid agree on that but he refused. The research has proved that the Egyptian press was aware of all these activities and their aims from the very beginning but in spite of this they let other writers write about these activities. The research has also proved that the Jewish have involved in different fields of economy in Egypt and their demonation on the important fields of it.

مقدم الرسالة:	مبارك رمضان ابو زيد
موضوع الرسالة:	علاقة البويهيين بالدول الكردية في بلاد الديلم وكردستان (٣٣٤-٤٤٧هـ / ٩٤٥ - ١٠٥٥م)
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم التاريخ
تاريخ المزمع:	٢٧/١٠/٢٠٠٢م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ. د / محمد أحمد محمد د / أسامة محمد فهمي

ملخص الرسالة

ترجع أهمية الموضوع إلى أنه يلقي الضوء على الدولة البويهية وعلاقتها بالدول الكردية في بلاد الديلم كردستان خلال فترة القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجريين / العاشر والحادي عشر الميلاديين؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن ما كتب عن الدول الكردية في حقل الدراسات التاريخية قليل للغاية ومن هنا أثرت على اختيار هذا الموضوع ، كذلك انتشرت الحركات الانفصالية عند الأكراد وكونوا دولا مستقلة عن الخلافة العباسية ومنها الدولة الحسنية والدولة الكاكية والإمارة العازية في كردستان والدولة السالارية في أذربيجان والمروانية في الجزيرة وديار بكر والتي لا ترتبط بها إلا رباط اسميا تدين فيه بالولاء والطاعة ، في الوقت الذي ارتبط فيه الأكراد بعلاقات ودية وصداقة حيناً وعدائية حيناً آخر مع البويهيين الذين تسلطوا على الخلافة العباسية . وتناولت الدراسة علاقة البويهيين بالدول الكردية في بلاد الديلم كردستان فترة (٣٣٤ - ٤٤٧ هـ / ٩٤٥ - ١٠٥٥م) وقد قمت في بحثي للعلاقات السياسية والحضارية بين البويهيين والأكراد ، وقسمته إلى تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة . وخصصت الباب الأول لدراسة علاقة البويهيين بالدول الكردية في كردستان ، وفي

الباب الثاني فقد تناولت الدراسة علاقة البويهيين بالدول الكردية في أذربيجان و
الجزيرة وديار بكر . وفي الباب الثالث تناولت الدراسة العلاقات البويهية الكردية في
مجال الحضارة ويشمل النشاط الاقتصادي ودراسة الحياة الاجتماعية والثقافية .

Summary of Thesis

This research is very important because it gives a spot light to the Bouhic country and its relationship with the Kordic countries in Daylam and Kordestan in the fourth century and the beginning of the fifth century of Hegra (the Tenth and the Eleventh centuries after birth), on the other hand it is considered that what is written about the Kordic countries is so little and not specified. So I choose this research to discuss. Also the movement separatism spread with Kordic, they made independent countries away from the Abasian Kelafa. These countries were like the Hasounian country, Kakoian, country, and the Anazian principality in Kordestan and the Salarian country in Azerbdgan, the Madwanian in Jazeera and Bakr Homès which was not belong to it - except by name -and it was under the loyalty of it. At the time when the Akrad made sometimes-good relationships and bad ones in another time with the Bohic who predominated over the Abasian Kelafa. I discussed in my research the relationship of the Bohic with Kordic countries in Daylam and Kordestan countries, which spread between 334- 447 of Hegra and 945-1055 ads. I produce in my research a study of the civilized and

political relationship between Bohic and Kordish and I divided it into four chapters and a conclusion, which I began it with a warm up. I Specified in the First Chapter for studying the Bohic relationship with the Kordic in the Daylam and in Kordstan. The Second chapter is about the study about the relationship between the Bohic with the Salarians country in Az bidgan and the Marwanians country in Gazeera and in Diar Bakr. In the Third chapter I dealt with the study of the Bohic Kordish relationships in the civilization field.

قسم

علم الاجتماع

مقدم الرسالة:	سيف الدين ياسين قفري
موضوع الرسالة:	"التغير البنائي والنظام العائلي في مجتمع محلي حضر" The Structural Chang and Family System in an Urban Community
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم علم الاجتماع
تاريخ الـنـمـس:	٣ / ٣ / ٢٠٠٢ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / عبد الهادي أحمد الجوهري أ. د / محمود عبد الحميد حسين

ملخص الرسالة

تقوم الدراسة على تساؤل رئيسي، مؤداه: هل يؤثر التغير البنائي على النظام العائلي في المجتمع المحلي الحضري؟ وللتحقيق من التساؤل استخدم الباحث العديد من المناهج والأدوات منها: المنهج الأنثروبولوجي، ومنهج دراسة الحالة، وعن أدوات الدراسة تتمثل في الملاحظة بالمشاركة، والمقابلة، ودليل العمل الميداني، كما أعتمد على الإخباريين وبعض الأدوات المساعدة له في إجراء البحث. تنقسم الدراسة إلى بابين: الأول ويحتوى على أربعة فصول هي: الفصل الأول: التغير البنائي في الأسرة رؤية تحليلية، والفصل الثاني جاء بعنوان البناء العائلي والنظم الاجتماعية، في حين أن الفصل الثالث جاء بعنوان البناء العائلي رؤية نظرية تحليلية، والفصل الرابع يشمل الدراسات السابقة، أما الباب الثاني: الدراسة الميدانية: ويشمل الفصل الخامس وجاء بعنوان إطار الدراسة وإجراءاتها المنهجية، والفصل السادس يشمل تقارير دراسة الحالة، والفصل السابع تحليل حالات الدراسة ومناقشة تساؤلاتها، أما الفصل الثامن النتائج والتوصيات، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أوضحت الدراسة أن التغير البنائي أدى إلى تحول نمط الأسرة الممتدة إلى نمط الأسرة النواة.

كذلك كشفت الدراسة أن التغيرات البنائية كان لها أثرها الواضح على العلاقات الأسرية وعلى عملية اتخاذ القرار في الأسرة . كما كشفت الدراسة أن التغيرات البنائية تؤدي بالضرورة إلى تغير في أدوار أعضاء الأسرة .

Summary of Thesis

In this study, the researcher investigates the structural change and family system in an urban community, the researcher used many of methods in his study included Anthropological method and case study method, and about the tools of study, he used participant observation, interview, and the evidence of field work, also he depended on informers. The study divided into two parts, the first contained four chapters, first chapter: The structural change in family analytical vision, the second chapter: The structure of family and social systems, third chapter: Structure of family theoretical analysis vision, forth chapter: Previous researches. The second part: Field study in chapter five: Framework of the study and methodology. chapter six: Case study reports, chapter seven analysis of study cases and discussion of its questions, chapter eight: Discussion and conclusion. Generally, the result of this study were summarized as follow: The study show that the structural change caused the conversion of extended family framework to nuclear family framework also, the study showed that the structural change clearly affected on family relationships. On the other hand, the study showed that the structural changes caused the changes in the roles of family members.

مقدم الرسالة :	جهد يوسف عثمان محمد
موضوع الرسالة :	'التحضر وأثره على تغير بعض القيم المجتمعية ودراسة ميدانية بمحافظة سوهاج' Urbanization and its Effects on Changing some Societal Values Field Study in Sohag Governorate
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم علم الاجتماع
تاريخ المزمع :	٢٨ / ٤ / ٢٠٠٢ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / عبد الهادي أحمد الجوهري أ.د / رفيه عبد اللاه محمد

ملخص الرسالة

اشتملت الرسالة على دراسة المداخل النظرية في دراسة القيم المجتمعية والتغير القيمي ومدى تأثره بعوامل التحضر ومشكلات التحضر في ضوء القيم المتغيرة. ومن أهم نتائج الدراسة وتوصياتها، أن النسق القيمي في أى مجتمع لا يظل ثابتاً، ولكنه يتأثر بالظروف التى يمر بها المجتمع، كما يتأثر بالتغيرات التى تطرأ على الأنساق الاجتماعية الأخرى، وإن التغير القيمي لا يسير بكيفية واحدة فى كل المجتمعات، ولكنه يختلف من حيث الدرجة والسرعة من مجتمع إلى آخر، أن القيم تتبع أساساً من المجتمع ووفقاً لأهدافه وحاجاته ورغبات أفراد وأنشطة الحياة اليومية فيه والعلاقات الاجتماعية السائدة فيه. يحدث التغير القيمي فى أى مجتمع نتيجة لعدة عوامل، قد تكون داخلية مثل تغير الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة فى المجتمع، وقد تكون خارجية نتيجة احتكاك المجتمع بالمجتمعات الأخرى وما ينتج عن ذلك من تبادل ثقافى. تعرض النسق القيمي فى مجتمع الدراسة لعدة تغيرات أهمها: تغير بعض الأنماط والأساليب الاستهلاكية والادخارية والاستثمارية لدى أفراد المجتمع وتغيرت

نظرة أفراد المجتمع عن العمل الزراعي نتيجة ظهور مهنة سرعة الكسب وظهور العديد من التغيرات في أنماط وأساليب التفكير لدى أفراد المجتمع . ويظهر أبناء الريف تفوقاً ملحوظاً في القيم المتصلة بالتعاون والمشاركة وعدم السلبية عن أبناء الحضر والحضر ريفيين ويظهر أبناء الحضر تفوقاً ملحوظاً في القيم المتصلة بعدم الاعتقاد في الخرافات والقدرية عن أبناء الريف والحضر ريفيين ويظهر أبناء الريف تفوقاً ملحوظاً في القيم المتصلة بملكية الأرض عن أبناء الحضر والحضر ريفيين ويظهر أبناء الحضر تفوقاً ملحوظاً في القيم المتصلة بالادخار والاستثمار عن أبناء الريف والحضر ريفيين ويؤثر التحضر بشكل واضح على قيم أبناء الريف الذين انتقلوا إلى الحضر وتوجد علاقة ارتباط سلبية وقوية جداً بين التحضر وتغير القيم الاجتماعية وتوجد علاقة ارتباط إيجابية وقوية جداً بين التحضر وتغير القيم الاقتصادية .

Summary of Thesis

The study deal with theoretical approaches in studying societal values, values change and the urbanization factors effects, urbanization problems in relation to the changing values. The result of the theoretical study: The Values system in any society is not still stable but it is affected by the conditions which the society pass with, as it is affected by the changes which come on the other social systems. The values change doesn't go on at the same degree in all societies but, it differs according to the degree, and the speed from a society to another. Values emerge basically from the society and according to its goals, needs the individual desires, the everyday life's activities and the prevailing social relations in it. The values change

in any society takes place as a result of several factors which may be inner as changing the political, economical, social systems prevailing in the society, and it may be exterior as a result of the relation between the society and the other societies, and the outcome of cultural exchange. The values system in the study's community was exposed to several changes. The important result of the field study: The rural shows excel in the values of co-operation , participation and non-negativism than the urbans and the urban-rurals. The urbans shows excel in the values of not thinking of superstitions and fatalism than the rural and the urban-rurals. Urbanism affects clearly on the values of the rurals who moved to the urban community. There is a very strong negative relationship between urbanization and changing the social values. There is a very strong positive relationship between urbanization and changing the economic values.

قسم

الاعلام

مقدم الرسالة:	سماح جمال محمد أحمد
موضوع الرسالة:	الأساليب المستحدثة فى التغطية الإخبارية / دراسة مقارنة بين جريدتى الأهرام المصرية والهيرالد تريبيون الأمريكية خلال عام ١٩٩٩م The Innovated Methods in News Coverage: A Comperative Study Between Al-Ahram Newspaper of Egypt and the International Herald Tribune Newspaper of United States of America
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم الإعلام
تاريخ المضم:	٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / ليلي محمد عبد المجيد

ملخص الرسالة

تناولت هذه الدراسة موضوع الأساليب المستحدثة فى التغطية الإخبارية وذلك بهدف التعرف على مظاهر الاتفاق والاختلاف بين عناصر التغطية الإخبارية فى الدول المتقدمة والدول النامية وكيفية استفادة الدول النامية مما أحرزته الدول المتقدمة فى هذا المجال وهذه الدراسة دراسة وصفية وتسعى للإجابة على بعض التساؤلات التى تم بلورتها فى الآتى: الوقوف على آخر التطورات التقنية التى لحقت بعملية التغطية الصحفية ورصد الوضع التقنى الراهن فى الصحافة اليومية المصرية ممثلة لها جريدة الأهرام والصحافة اليومية الأمريكية ممثلة لها جريدة أنترناشيونال هيرالد تريبيون ودراسة مدى نجاح كل منهما فى تحقيق الاستغلال الأمثل لما استحدث لديها من تقنية متقدمة ، من خلال رصد وتحليل وتفسير الأساليب التى اعتمدت عليها كل من الجريدتين فى مجال التغطية الإخبارية فى مراحلها الثلاثة وهى مرحلة جمع المعلومات والحصول

على الأخبار ومرحلة نقل الأخبار وتوصيلها إلى الجريدة ومرحلة كتابة المواد الإخبارية وصياغتها وإلى أى مدى تتأثر عملية التغطية الإخبارية بالمتغيرات الأخرى مثل النظام الصحفي والتقدم التكنولوجي والإمكانيات المادية والبشرية واعتمدت الدراسة على منهج المسح الإعلامي ، توصلت الدراسة إلى اعتماد جريدة الأهرام المصادر التقليدية للحصول على الأخبار والمتمثلة بشكل أساسي ، فى شبكة المندوبين الموزعين على الهيئات والمصالح الحكومية ثم وكالات الأنباء العالمية [رويتر واسوشيتد برس ووكالة الأنباء الفرنسية] وتوصلت الدراسة إلى تفوق جريدة هيرالد تريبيون فى استخدام أساليب مستحدثة لنقل الأخبار ، وفى عمق المعالجة للموضوعات الصحفية وفى نشر الأشكال الإخبارية ذات الطابع التفسيري (وأهمها التقرير الإخباري والتحليل الإخباري ، وفى الطرق المستحدثة فى الكتابة الصحفية وهذا يؤكد على تغيير المفهوم التقليدي للتغطية الإخبارية لدى المسئولين بالصحيفة ووضعها فى إطار أشمل وربط الأحداث بالواقع المجتمعي.

Summary of Thesis

The present study has sought to deal with the innovated methods in news coverage with the identifying the points of similarities and differences between the advanced countries and the developing ones regarding the elements of news coverage, and how far the developing countries have made use of what the advanced countries have achieved in this respect. Being a descriptive kind of study, the study attempts to find answers to some questions that tries to: Identifying the latest technological developments in the news coverage process,

and how far the Egyptian daily newspapers as represented in Al-Ahram newspaper, and the American daily ones, as represented in the International herald tribune newspaper. Identifying how far both of the two newspapers have made full use of such technological advancements now available to them both. This could possible be achieved throughout Identifying, analyzing and interpreting the methods that both the two newspaper depend on along the three stages of news coverage which include news information collecting, transmitting news to the paper and the find stage of writing down the news materials. The study came to the conclusion that Al-Ahram newspaper still depends on traditional methods news collecting. The study also found that the International herald tribune newspaper does proceeds Al-Ahram newspaper in utilizing the innovated methods in news coverage and in the depth of treatment. This stresses the need to change the traditional concepts of news coverage followed in the newspaper, and visualizing them in a more comprehensive frame work and relating the events with the community's daily life.

مقدم الرسالة :	على سيد على محمد
موضوع الرسالة :	'علاقة الانتماء الحزبى فى مصر بالتعرض للمواد السياسية فى الراديو والتليفزيون 'دراسة ميدانية' The Relationship Between Party's Belonging in Egypt and the Exposure to Political Programs in Radio & Television "A Field Study"
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم الإعلام
تاريخ المضم:	٢٧/١٠/٢٠٠٢م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / عدلى سيد على محمد رضا

ملخص الرسالة

سعت هذه الدراسة إلى إختبار علاقة الانتماء الحزبى فى مصر بالتعرض للمواد السياسية فى الراديو والتليفزيون المصرى ، ومعرفة أثر هذا الانتماء ومستواه على حجم التعرض للمواد السياسية وذلك مقارنة بين المنتمين وغير المنتمين حزبيا ، و ربط هذه العلاقة بمجموعة من المتغيرات الهامة ، كنوع الحزب الذى ينتمى إليه المبحوث ومستوى المنصب الذى يشغله وعدد سنوات عضويته ، إضافة إلى مستوى إهتمامه السياسى ، ومستوى فاعليته السياسية ، وطبيعة اتجاهه نحو السلطة ، مع مراعاة متغيراته الديموجرافية (النوع والعمر والتعليم والمستوى الاجتماعى الاقتصادى) ، وذلك فى إطار إختبار فرضيات نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام والتعرف على ما يحققه المبحوثون من اعتمادهم على وسيلة بعينها للحصول على المعلومات السياسية ، والآثار الناجمة عن هذا الاعتماد ، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع مستوى الانتماء الحزبى لدى المنتمين الحزبيين فى الأحزاب المختلفة ، وعلى أرائهم نحو طبيعة الحياة الحزبية فى مصر. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث منهج المسح بالعينة

على مائتى مفردة من المنتمين حزبا (١٠٠ مفردة من الحزب الوطنى ، و ٥٠ مفردة من حزب الوفد ، ومثلها من حزب التجمع) ، ومائتى مفردة من غير المنتمين (من خلال عينة عشوائية طبقية باستخدام اسلوب التوزيع المتناسب من أحياء السيدة زينب وحدائق القبة ومصر الجديدة) وقد تضمنت هذه الدراسة تسعة فصول وخاتمة وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

Summary of Thesis

This study seeks to test the relationship between party's belonging in Egypt and the Exposure to political programs by the Egyptian Radio and television, it also examines, the effect of the level of this Belonging on the level of exposure to political programs by holding a comparison between partisans and non- partisans. At the same time the study attempts to link this relation to several of intervening variables such as party kind to which the individual belongs, the occupation level, membership's years, and political interest, political efficiency, attitudes towards, and demographic variables as (sex, age, education, socioeconomic statues) as well. The study aims at investigating the hypotheses of media dependency theory and what the respondents achieve from dependency on certain source to get political information, and the effects that result from this dependency. This study investigates the level of party's belonging between partisans in various parties and there view- points towards

the nature of party's life in Egypt. In order to achieve the aims of the study the researcher has adopted field survey method through a questionnaire which was carried out on a sample of 200 respondents from Parisians (100 respondents from al watany party, 50 respondents from al wafd party and another 50 from tagamoea party) and 200 respondents from non-partisans (through stratified random sample based on proportional distribution from el sayda zienab, Hadiak el koba, and masr el gadida counties. The study consists of nine chapters and a conclusion. It has reached several findings and recommendations.

قسم

الوثائق

والبحوث

والملفوظات

عصام محمد على على عبيد	مقدم الرسالة:
'مكتبات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بمحافظة الإسكندرية' 'دراسة ميدانية لواقعها ومستقبلها' Non-profit Associations and Special Institutions Libraries in Alexandria: A Field Study	موضوع الرسالة:
كلية الآداب - قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات	الكلية والقسم:
٢٠٠٢/٣/٢١ م «ماجستير»	تاريخ المقدم:
أ.د / شعبان عبد العزيز خليفة	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تحتل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بمصر في الآونة الأخيرة بأهمية بالغة في مساندة الدور الذى تقوم به الحكومة من مشروعات وخدمات محلية أو قومية. لذا كان من الضروري دراسة بعض التغيرات التى طرأت على المجتمع فى ظل ثورة المعلومات والاتصالات التى تعيشها مصر حالياً من أجل تطوير الخدمة المكتبية بالجمعيات الأهلية. بالإضافة إلى دراسة الواقع لهذه المكتبات والتخطيط المستقبلي لها لتلبية كل ما يستجد من احتياجات المستفيدين منها وتعطى إشارة البدء فى تطوير مكتبات الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ووضعها على الخريطة عند إشهار الجمعيات. واعتمد الباحث على المنهج الميداني لمكتبات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة وقد استطاع الباحث بوضع مجموعة من المعايير تم على أساسها اختيار المكتبات وبناء على بعض معايير لمكتبات متخصصة أخرى غير مكتبات الجمعيات الأهلية حسب رؤية الباحث لتطبيق الدراسة العلمية لهذه المكتبات وهذه المعايير كما يلي: مكتبات الجمعيات التى لديها مقر مخصص لمكتبه ومكتبات الجمعيات التى لديها أخصائي مكتبة متفرغ للعمل بها ومكتبات الجمعيات التى تفوق بمجموعات

مقتنياتها الألف كتاب وقد تناول الباحث منهج الدراسة في جزءين • الجزء الأول: نظري ويتناول نشأة الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة وتطورها حتى وقتنا الحاضر وذلك من خلال الإنتاج الفكري العربي والأجنبي في ذلك الموضوع ويخدم هذا الجزء الجانب الميداني للدراسة • والجزء الثاني: عملي حيث يتطلب هذا البحث الميداني الحصول على معلومات ميدانية غير موجودة في مصادر أخرى وغير مدونة في سجلات سابقة فكانت الدراسة الميدانية هي المصدر الرئيسي للمعلومات والحقائق • ومن أهم نتائج الدراسة: عدم مناسبة موقع المكتبات بالجمعية وتعدد الجهات الإشرافية على عمل المكتبات والنقص الحاد في عدد العاملين المتخصصين فنياً وقلة الدعم المالي لمكتبات الجمعية وعدم توازن المجموعات بالمكتبات وارتباطها بنشاط الجمعية وعدم وجود أدوات عمل فنية وقصور خدمات المعلومات •

Summary of Thesis

Non-profit associations and special institutions in Egypt have a great significance in supporting the government projects and the national or local services. That's why it was necessary to study the changes that occurred to society in the light of the information & communications revolution in Egypt nowadays in order to develop the library service in the Non- profit societies. In addition, a field study of these libraries is a very important field to plan to the future for all the new needs of the associations that are affiliated to the Ministry of Social Affairs and to put it on map when declaring those associations. The thesis depended on the field structure of the associations and

special institutions libraries, the researcher was able to put a group of standards on which was the choice of the libraries and on the basis of other libraries standards according to his prospective in order to apply the scientific study to these libraries. The standards are as follows:

1- Associations libraries that have a certain separate place for a library
2- Association libraries that have a librarian who is completely devoted to work in it. 3- Associations libraries that have exceeded 1000 books. The researcher divides the study into two parts: Part one: Theoretical: It discusses the foundation of Non- profit associations and special institutions and its development until our present time. This is done through the Arabic / Foreign intellectual production in respect to this subject. The field structure side of the study contributes to the previous meaning. Part two: Practical: Since this field research requires obtaining field information that doesn't exist in other resources and is not written down in any previous records, the field study was the main resource to the information and the facts. The most important results in the study are:- 1- The inconvenient position for the libraries in the associations. 2- There are several associations that supervise the libraries work. 3- The acute shortage of the technical specialists. 4- The insufficient financial support of the association libraries. 5- The imbalance of the groups in the libraries and its relation with the associations activities. 6- The lack of technical work tools. 7- The inefficiency of information services.

مقدم الرسالة:	منصور سعيد محمد منصور
موضوع الرسالة:	<p>"الميول القرائية لدى طلبة الفرقة الرابعة بكلّيات العلوم الإنسانية بجامعة أسيوط"</p> <p>Reading Interests for the Students of the Fourth Grade in Colleges of Humanity Sciences in Assiut University</p>
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات
تاريخ النسخ:	٢٠٠٢ / ٣ / ٣١ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	<p>أ.د / شعبان عبد العزيز خليفة</p> <p>أ.د / محمود السيد أبو النيل</p>

ملخص الرسالة

يتسم العصر الحالي بالتنوع في مجالات ومواد المعلومات فضلاً عن أن التعليم الجامعي مازال يركز على الطرق التقليدية في المناهج والمقررات من شرح وتلقين وكتاب مقرر ، ويهمل ميول الطلبة القرائية الذي ينتج عنه تقليص دور المكتبة ، بالإضافة إلى زيادة وقت فراغ الشباب ولا يعرفون الطريقة المثالية في استثماره . ولا سبيل لمحاولة مواكبة عصر المعلومات ، وتغيير مناهج وطرق التدريس بالتعليم الجامعي ، وإبراز دور المكتبة الجامعية ، وإرشاد الطلبة إلى استثمار وقت فراغهم إلا بالقراءة وتنمية ميولهم ، وتدعيم عاداتهم القرائية وهذا موضوع الدراسة . هدف الدراسة: إلى التعرف على واقع الميول القرائية لدى الطلبة ، والكشف عن العلاقة بين ملاحظتهم الشخصية وبين طبيعة ومحتوى الإنتاج الفكري الذي يفضلونه . مجال الدراسة: أ- المجال الموضوعي: الموضوعات المفضلة لدى الطلبة وأهم عاداتهم القرائية وأسباب عزوفهم عن القراءة . ب- المجال النوعي: طلبة كليات العلوم

الإنسانية بجامعة أسبوط. ج- المكاني: كليات العلوم الإنسانية بجامعة أسبوط د- الزمني: العام الدراسي ٢٠٠١/٢٠٠٠ م منهج وعينة الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الميداني في الحصول على معلومات حول الميول القرائية لطلبة الفرقة الرابعة وذلك باستخدام استبيان طبق على ٣٠٢ طالب وطالبة من كليات الحقوق ، والتربية والتجارة والأدب والخدمة الاجتماعية والتربية النوعية والتربية الرياضية . فصول الدراسة: تكونت الدراسة من مقدمة وبابين ، حيث تناولت المقدمة خطة الدراسة أما البابين فأحدهما إطار نظري ويعرف بالباب الأول ويتكون من أربعة فصول من الأول إلى الرابع ، والباب الثاني فهو الدراسة العملية ونتائجها ويتكون من خمسة فصول من الخامس إلى التاسع . النتائج: ١- يقرأ الطلبة بغرض الثقافة العامة ، والتسلية وقضاء وقت الفراغ ، وفهم المسائل الدينية والحصول على معلومات جديدة ، والدراسة والبحث ، والتدقيق الأدبي ، وحل مشاكلهم . ٢- لا يجد الطلبة التشجيع المناسب من الأسرة ، حيث يغلب عليه التشجيع المعنوي وذلك لضعف ميزانية القراءة ٣- يفضل الطلبة القراءة في المنزل أثناء الليل ، ويقضون من ساعة إلى ساعتين فيها ، وهذه المدة تزيد عن الإثبات عن الذكور ، وعند الريفيين عن الحضريين . ٤- هناك اتجاه إيجابي من الطلبة نحو الإقبال على قراءة المواد ، ويفضلون الموضوعات السياسية والرياضية بالصحف والمجلات ، ويفضلون الموضوعات الدينية والأدبية والسياسية بالكتب العامة ، أما القصص يفضلون منها القصة الدينية والواقعية وقصص المغامرات ٥ - أكثر العناصر جذباً لقراءة المواد هو الموضوع ، وهو أكثر العناصر في عزوف الطلبة عن القراءة إذا كان لا يتناسب مع ميولهم . ٦- يوجد اتجاه إيجابي من الطلبة نحو استخدام المكتبة الجامعية بنسبة ٨٧% ، هذا الاتجاه يزيد عند الإثبات عن الذكور ، وعند الحضريين عن الريفيين ٧- جاءت القراءة في المرتبة الثالثة بعد مشاهدة التلفزيون وسماع الراديو من بين الأنشطة التي يمارسها الطلبة يوميا . ٨- جاءت في المرتبة الثالثة بعد مشاهدة التلفزيون وسماع الراديو من بين الأنشطة التي يمارسها الطلبة

يوميًا. ٩- الراديو من أكثر الوسائل المشجعة على القراءة والتليفزيون من الوسائل المقللة من القراءة، والمبينما غير مشجعة على القراءة أما المسرح فلا يعرف الطلبة مدى تأثيره على القراءة.

Summary of Thesis

There is no doubt that the present age merits the variety in fields and way of information. In addition to the University education still concentrates on traditional ways in curricula that depend on explanation, dictation and decided book. In the same time this system neglects reading interests of students. The result of this is decrease of the role of the library, as well as increasing the spare time of the youth who don't know the ideal way to invest it well. There is no way to convoy the data age, changing curricula and methods of teaching in university education, clearing the role of university library guiding students for investment their free time except reading and development of its interests with students, consolidating their Reading habits this is the subject of the thesis. aim of the thesis: - This thesis aims at knowing the state of Reading interests with students and revealing the relation between their personal features and nature and content of thoughtful literature production which they prefer. Filed of the thesis: A- The subject filed: The preferable subjects with students and the best of their Reading habits, and the reasons of neglecting reading. B- The specific field: Students of humanity sciences colleges

in Assiut University. C- Locative field: Colleges of humanity sciences in Assiut University. D- Time Field: studying year 2000/2001.

Method and sample of the thesis: The thesis has depended on the practical method in getting information about Reading interests for students of the fourth grade by using questionnaire applied to 302 students from colleges of law, education, education, commerce, Art, social sciences variety education and sporting education. Content of the thesis: The thesis has consisted of introduction and two chapters one of them is a theoretical framework which is known as the first chapter which consists of four sections from the first to the fourth. The second chapter is practical studying and its results and consisted of five sections from the fifth to the ninth. Results:- students read for the purpose of common culture entertainment, spending spare time, understanding of religious matters, getting new information, study and research, literary taste and solving the or problems. 1- Students don't find suitable encouragement from the family, but psychological encouragement because of the decrease of family budget. 2- Students prefer reading at home during the night spending one or two hours, the period increases with females more than males and villagers more than civilians. 3- There is a positive attitude from students towards Reading subjects, they prefer political and sport subjects in newspapers and magazines. They also prefer the religious, literary and political subjects in public books, but stories, They prefer religious story and adventurous stories. 4- The most attractive elements for

reading matters is the object. 5- There's positive attitude for students to USA University library 87% this attitude in females is more than males and civilians are more than villagers. 6- University library encourages students for reading percentage 65% by saving readable and suit able time doing cultural competitions and advertising on subjects. 7- Reading has come in the third step after watching television and listening to the radio among and activities that students practice daily. 8- Radio is one of the most courageous means for Reading, Television is one of the means which helps decreasing of reading, the cinema doesn't encourage reading and students don't know the effect of the theatre on reading.

مقدم الرسالة :	عبد الحميد محمود محمد ندا
موضوع الرسالة :	"وثائق شبكات الهيئة القومية للاتصالات بالقاهرة أساليب اختزانها واسترجاعها حاضرها ومستقبلها" National Telecommunications Organization Archives
الكلية والقسم:	كلية الآداب - قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات
تاريخ المنع:	٢٠٠٢/١٢/٢٩ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د / شعبان عبد العزيز خليفة أ.د / محمود عباس محمود

ملخص الرسالة

تتكون الرسالة من مجلدين أشتمل المجلد الأول على التطور التاريخي للجهات التي تولت مرفق الاتصالات في جمهورية مصر العربية وفئات ووثائق شبكات الاتصالات ومراحل الدورة المستندية والواقع الفعلي لأساليب اختزان واسترجاع ووثائق الشبكات وحفظ واسترجاع ووثائق الشبكات باستخدام التصوير المصغر (الميكرو فيلم) ومقترحات التطوير والتحديث بشأن تقنين وتوحيد النظم الفنية واقتراح إنشاء قطاع لمعلومات ووثائق الشبكات والنظام الآلى المقترح لاختزان واسترجاع ووثائق شبكات الاتصالات فضلا عن المقدمة والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع. والمجلد الثانى يتكن من عشرة ملاحق هي: ١- قائمة المراجعة ، ٢- القرارات والقوانين والمذكرات والخطابات ، ٣- الهياكل التنظيمية وبطاقات وصف الوظائف ، ٤- الموصافات الفنية ومخططات الشبكات ، ٥- النماذج ، ٦- أدوات استرجاع ملفات مشروعات ومخططات الشبكات ، ٧- خطة التصنيف ، ٨- الكشافات ، ٩- النظام الآلى لاختزان واسترجاع ووثائق الشبكات ، ١٠- لائحة محفوظات هيئة المواصلات السلوكية واللاسلكية.

Summary of Thesis

The thesis consists of two volumes: Volume one is devoted to the text of the study; Volume two is devoted to the supplements and appendices. The main volume deals with historical background of the organization and its organizational chart. Also it deals with procedures of producing of archives; kinds of these archives; storage and retrieval of archives; preservation and archival services. The scholar planned for a future information system of storage and retrieval and making use of these archives. Volume two contains several appendices as follows:- 1- Check- list. 2 – Decrees, laws, explanatory notes and messages. 3 – Organizational structures and job descriptions. 4 – Technical specifications, norms and standards. 5 – Samples. 6- Retrieval tools of files of networks. 7 – Classification scheme. 8 – Indexes of networks, charts and project contracts. 9 – A proposed automation system 10 – By – laws and legislations of telecommunications organization.

معهد دراسات


وبحوث تكنولوجيا

صناعة السكر

**يان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير
بمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠٢**

درجة الماجستير			البيان
أجمالي	طالبة	طالب	
١	٠٠	١	الشعبة الزراعية
١	٠٠	١	الإجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر
جامعة أسيوط عن عام ٢٠٠٢



قسم

الطب الزراعي

مقدم الرسالة :	حسين عبد القادر حسين العذل
موضوع الرسالة :	استجابة محصول بنجر السكر من حيث المحصول والجودة لإضافة الكبريت المحسن لصفات التربة فى مركز الحامول - محافظة كفر الشيخ Yield and Quality of Sugar Beet as Influenced by Sulphur Applied as a Soil Amendment in El-Hamoul, Kafr El-Sheikh, Egypt
الكلية والقسم:	معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر - قسم الشعبة الزراعية
تاريخ المزمع:	٢٠٠٢ / ٧ / ٢٨ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ د / حسانين جمعة حسنين د / حازم احمد فريد الشريف د / حسين محمد على راغب

ملخص الرسالة


الهدف الرئيسى من هذا الدراسة هو محاولة استخدام بعض المواد والمركبات التى يمكن من خلالها علاج مشاكل ملحية وقلوية التربة وتقييم مدى قدرتها على زيادة المحصول وتحسين صفات جودة جذور البنجر وبالتالي التحكم فى عملية فقد السكر مع المولاس ، كما شملت الدراسة أيضاً تقييم الأثر المباشر لهذه المواد وكذلك الأثر المتبقى لها على النمو والمحصول وصفات الجودة للنباتات بنجر السكر وكذلك على تحسين بعض خواص التربة . وقد أجريت ثلاثة تجارب حقلية متتابعة خلال ثلاث مواسم للسنة فى مزرعة شركة الدلتا للسكر بمنطقة الزاوية بمركز الحامول - محافظة كفر الشيخ خلال الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠م . وقد توصل الباحث إلى نتائج هامة يمكن تلخيص أهمها فى الآتى: تأثير إضافة المعاملات على التربة: - كانت أفضل النتائج

بالنسبة لمحتوى التربة من المادة العضوية والنيتروجين الكلى تحت ظروف معاملة سماد التكاملية العضوى بينما كانت أفضل النتائج فى زيادة محتوى التربة من الفسفور والبوتاسيوم الميسر للنبات تحت ظروف المعاملة رقم (٧) تأثير المعاملات على قياسات النمو: كانت أفضل المعاملات هي المعاملة رقم (٧) حيث أدت إلى زيادة معنوية فى متوسط مساحة الأوراق ومتوسط الوزن الطازج والجاف للأوراق والجذور وعدد الأوراق للنبات وانخفاض محتوى الجذور من الصوديوم (موسم ٨٩/٩٩) بينما كانت هناك زيادة معنوية فى محتواها من الكالسيوم والمغنسيوم والكبريتات وكانت أفضل النتائج تحت ظروف المعاملة رقم (٧) أدى تكرار إضافة المعاملات (موسم ٩٩/٢٠٠٠) إلى تأكيد التأثير على صفات النمو والمحصول وصفات الجودة ونساج السكر فى محصول البنجر وأيضاً على صفات التربة وكانت أفضل النتائج تحت ظروف المعاملة رقم (٧) بالمقارنة بمعاملات التأثير المتبقى (بدون إضافة) .

Summary of Thesis

The main objective of this study was to evaluate the effect of some soil amendments used to reclaim the salinity and alkalinity conditions of the soil, and how much it could improve beet yield, quality and control sucrose losses to molasses. The direct as well as the residual effect of the applied amendments on growth, yield and quality of beet crop were evaluated. The most important results obtained in this study could be concluded in the following: Soil (pH) and exchangeable sodium percentage (ESP) were gradually decreased however soil salinity and sulphate contents in the soil were gradually increased with increasing the rate of elemental sulphur application,

the highest decrease of soil pH and ESP was observed with treatment. Organic matter and Nitrogen content were the highest with Tacamolia fertilizer , meanwhile available P and K were greatly increased with treatment 7. average leaf area, fresh and dry weight of beet leaves, number of leaves per plant and fresh and dry weight of beet roots gave a significant increase with treatment7. Sodium contents of beet roots (98/99) were decreased, however Ca, Mg and SO_4 % were significantly increased with treatment7. Sucrose losses to molasses were the maximum with Tacamolia and flow able sulphur, while it was the minimum with one ton elemental sulphur. The second application of treatments accentuated its effect over the residual effects in most of the investigated parameters of beet growth, root yield, quality and sugar yield. The highest increase was observed with treatment.




كلية التربية بالمواصي الجديد

**بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير
بكلية التربية بالوادي الجديد جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠٢**

درجة الدكتوراه			البيان
أجمالي	طالبة	طالب	القسم
٢	١	١	مناهج وطرق تدريس
٢	١	١	الإجمالي

بيان يحدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية التربية بالوادي الجديد
جامعة أسيوط من عام ٢٠٠٢



قسم

مناهج وطرق

تدريس

مقدم الرسالة :	صفاء محمد على محمد أحمد
موضوع الرسالة :	<p>* أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تدريس الدراسات الاجتماعية على التحصيل وتنمية القيم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي</p> <p>The Effect of Using Cooperative Learning in Teaching Social Studies on Achievement and Values Development of Fourth Year Elementary School Pupils</p>
الكلية والقسم:	كلية التربية بالوادي الجديد - قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ المزم:	٢٠٠٢/٤/٢٨ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د / امام مختار حميدة د / فائزة أحمد أحمد

ملخص الرسالة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تدريس الدراسات الاجتماعية على التحصيل وتنمية القيم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي .

عينة الدراسة : تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بمدرسة صلاح الدين الابتدائية المشتركة - الخارجية - الوادي الجديد ، إجراءات الدراسة : اختبار بعض وحدات الدراسات الاجتماعية المقررة على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وإعادة صياغتها بما يتناسب وأسلوب التعلم التعاوني معاً ، إعداد أدوات الدراسة كالتالي : - إعداد كتاب للتنميد ودليل للمعلم ليتم استخدامها في التدريس للمجموعة التجريبية - إعداد اختبار تحصيلي وتحديد صدقه وثباته - إعداد مقياس للقيم الاجتماعية وتحديد صدقه وثباته وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء تلاميذ المجموعة التجريبية وأداء تلاميذ المجموعة الضابطة عند مستوى (٠,٠١) في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي ولمقياس القيم الاجتماعية لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية ، مع

وجود ارتباط دال إحصائيا بين تحصيل التلاميذ ونمو القيم الاجتماعية لديهم عند مستوى (٠,٠١) لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية وذلك في وجود البحث وفي ضوء النتائج تم التوصل إلى التوصيات والمقترحات .

Summary of Thesis

This study aims to identify the effect of using cooperative learning in teaching social studies on achievement and values development of fourth year elementary school pupils. Salah Aldeen Co – education elementary school, El -Kharga – New valley . Procedures of the study : Selected of some units from the social studies book for the fourth year elementary school pupils and adapted them according to cooperative learning (learning together technique) . Prepared tools of the study : Prepared the teacher's guide and pupils book to use in teaching the experimental group . Prepared the achievement test and making sure of its reliability and validity . Prepared the social values scale and making sure of its reliability and validity . Results of the study : After implementing the study, the researcher found that there were statistically significant differences at (0.01) level between the performance of the experimental group and control group in the post application of the achievement test and social values scale favoring the experimental group and there were statistically significant correlation at (0.01) level between pupils achievement and social values development favoring the experimental group in the limited of the study and so in presence of these results we can introduce the suggestions and recommendation .

مقدم الرسالة :	ماهر محمد صالح
موضوع الرسالة :	<p>* كفاءة معلم الرياضيات الصفية وعلاقتها بتحصيل تلاميذ الصف الأول الإعدادي واتجاهاتها نحو مادة الرياضيات *</p> <p>The Class Efficiency of Math Teacher and its Relation With 1st Prep School Students Achievement and Their Trends Toward Maths</p>
الكلية والقسم:	كلية التربية بالوادي الجديد - قسم المناهج وطرق التدريس
تاريخ المنح:	٢٠٠٢/٦/٣٠ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	د / حمدي محمد مرسى د / ماهر عبد القادر حسونة

ملخص الرسالة

يمثل الاتجاه الإيجابي بعداً خاصاً داخل الأهداف الرئيسية لتعليم وتعلم الرياضيات على مر العصور وبما أن هذا الاتجاه يعبر ويتنبأ بعلاقة التلميذ بالرياضيات سواء من ناحية حب المادة والميل نحوها أو الارتباط بها كدراسة وتخصص فيما بعد كما أنه يكاد يكون مؤشراً للتحصيل الدراسي في المادة ولما كان الاتجاه نحو الرياضيات يرتبط بطريقة المعلم وأسلوب تدريسه داخل الفصل وأدائه وإدارته له وصفاته المهنية والشخصية بما يعبر عن كفاءته وحيث أن العزوف عن المادة والابتعاد عن دراستها بدا واضحاً لدى التلاميذ فسعى وراء تحسين هذا الاتجاه والخروج بمستوى تحصيل مرتفع للتلميذ فقد اتجهت الدراسة الحالية للتعرف على " كفاءة نظم الرياضيات الصفية وعلاقتها باتجاه تلاميذ الصف الإعدادي نحو مادة الرياضيات وتحصيلهم فيها ويقع تقرير الدراسة في خمسة فصول. وكان الفصل الأول : للإطار العام للدراسة : وتضمن الفصل الثاني : مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية التي استفادت منها الدراسة

الحالية موضحين أوجه الاستفادة ونواحي الاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية أما الفصل الثالث : فقد كان للإطار النظري للدراسة وقد جاء في محورين الأول عن الكفاءة الصفية للمعلم وأبعادها والثاني عن الإحاطة نحو مادة الرياضيات وطرق قياسه . بينما خصص الفصل الرابع : لعرض إجراءات الدراسة من إعداد للأدوات واختيار مجموعة الدراسة وتطبيق الأدوات ورصد النتائج . ثم كان الفصل الخامس : والذي تضمن عرض لنتائج الدراسة في صورة الإجابة عن أسئلة الدراسة واختتم الفصل بتقديم بعض التوجيهات وبعض الدراسات المقترحة في ضوء النتائج .

Summary of Thesis

The positive attitude represents a very important dimension of main objectives in teaching and learning mathematics . This attitude expresses and predicts the relationship between the students and mathematics, also it expresses their tendency toward learning and achievement . As the attitude toward mathematics is related with the teaching method teacher's professional and personal features, which express his efficiency and as students have a negative attitude. This study tries to investigate the relationship between the teacher's competence and the attitude of his students toward learning math and to improve and change the students negative attitude . The research report includes five chapters, Chapter one is the outline of the study . Chapter two includes the review of related literature, and general . Comment . Chapter three includes the theoretical frame work of the study it is divided into two dimensions, the first one is concerned with

teacher classroom efficiency, the second is devoted to the attitude toward math and its measures . Chapter four represents the study procedures, sample and results . Chapter five include the results recommendation and suggestions for future studies .





رقم الإيداع ٢٠٩٦٦ / ٢٠٠٣

الترقيم الدولي

I.S.B.N

977-246-052-I



Bibliotheca Alexandrina



0499632